

$\forall(s1 : \alpha \rightarrow \text{bool}) (s2 : \alpha \rightarrow \text{bool}). s1 \subset s2 \Leftrightarrow s1 \subseteq s2 \wedge \neg(s2 \subseteq s1)$
$\forall(p : \text{num} \rightarrow \text{bool}). (\exists(n : \text{num}). p n) \Leftrightarrow p (\$LEAST p) \wedge \forall(n : \text{num}). n < \$LEAST p \Rightarrow \neg p n$
$\forall(f : \beta \rightarrow \gamma) (g : \alpha \rightarrow \beta) (l : \alpha \text{ list}). \text{MAP } f (\text{MAP } g l) = \text{MAP } (f \circ g) l$
$(x : \alpha) \in \text{RDOM } ((R : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}) \setminus (k : \alpha)) \Leftrightarrow x \in \text{RDOM } R \wedge x \neq k$
$\text{WF } (R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) \Rightarrow \text{antisymmetric } R$
$\forall(P : \alpha \text{ option} \rightarrow \text{bool}). (\forall(a : \alpha). P (\text{SOME } a)) \wedge P (\text{NONE} : \alpha \text{ option}) \Rightarrow \forall(x : \alpha \text{ option}). P x$
$\text{PROD_SET } (\emptyset : \text{num} \rightarrow \text{bool}) = (1 : \text{num})$
$(p : \text{bool}) \wedge (q : \text{bool}) \Rightarrow p$
$\forall(R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) (P : \alpha \rightarrow \text{bool}). (\forall(x : \alpha). (\forall(y : \alpha). R y x \Rightarrow P y) \Rightarrow P x) \Rightarrow \forall(x : \alpha). \text{WFP } R x \Rightarrow P x$
$\forall(t : \text{bool}). t \wedge T \Leftrightarrow t$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \alpha \rightarrow \text{bool}) (x : \alpha). x \in s \text{ DIFF } t \Leftrightarrow x \in s \wedge x \notin t$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \alpha \rightarrow \text{bool}) (x : \alpha). (s \text{ DELETE } x) \cap t = s \cap t \text{ DELETE } x$
$\forall(a : \alpha \rightarrow \text{bool}) (b : \alpha \rightarrow \text{bool}) (c : \beta \rightarrow \text{bool}) (d : \beta \rightarrow \text{bool}). a \subseteq b \wedge c \subseteq d \Rightarrow a \times c \subseteq b \times d$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (n : \text{num}). s \text{ HAS_SIZE } n \Rightarrow \text{CARD } s = n$
$\forall(f : \alpha \rightarrow \beta) (x : \alpha \text{ option}) (y : \beta). \text{OPTION_MAP } f x = \text{SOME } y \Leftrightarrow \exists(z : \alpha). x = \text{SOME } z \wedge y = f z$
$\forall(x : \text{num} \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) (y : \text{num} \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{mk_rec } x = \text{mk_rec } y \Rightarrow \text{ZRECSpace } x \wedge \text{ZRECSpace } y \Rightarrow x = y$
$((p : \text{bool}) \Leftrightarrow (q : \text{bool})) \vee (r : \text{bool}) \Leftrightarrow (p \vee \neg q) \wedge (p \vee \neg r) \wedge (q \vee r \vee \neg p)$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}). (\exists(f : \text{num} \rightarrow \alpha). \text{BIJ } f \mathbb{U}(:\text{num}) s) \Leftrightarrow \text{BIJ } (\text{enumerate } s) \mathbb{U}(:\text{num}) s$
$\text{LENGTH } (\text{TAKE } (n : \text{num}) (xs : \alpha \text{ list})) = \text{if } n \leq \text{LENGTH } xs \text{ then } n \text{ else } \text{LENGTH } xs$
$(\forall(x : \alpha) (y : \alpha) (z : \alpha). (R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) x y \wedge R y z \Rightarrow R x z) \Rightarrow \forall(x : \alpha \text{ list}) (y : \alpha \text{ list}) (z : \alpha \text{ list}). \text{LIST_REL } R x y \wedge \text{LIST_REL } R y z \Rightarrow \text{LIST_REL } R x z$
$\forall(h1 : \alpha) (h2 : \alpha). h1 = h2 \Rightarrow \forall(l1 : \alpha \text{ list}) (l2 : \alpha \text{ list}). l1 = l2 \Rightarrow h1 :: l1 = h2 :: l2$
$(\$SUBSET : (\alpha \rightarrow \text{bool}) \rightarrow (\alpha \rightarrow \text{bool}) \rightarrow \text{bool})^* = (\$SUBSET : (\alpha \rightarrow \text{bool}) \rightarrow (\alpha \rightarrow \text{bool}) \rightarrow \text{bool})$
$(\forall(x : \alpha). x \in (s : \alpha \rightarrow \text{bool})) \Leftrightarrow s = \mathbb{U}(:\alpha)$
$\forall(n : \text{num}). \text{count } (\text{SUC } n) = n \text{ INSERT } \text{count } n$
$\forall(xs : \alpha \text{ list}) (x : \alpha) (y : \alpha) (ys : \alpha \text{ list}). \text{LUPDATE } x (\text{LENGTH } xs) (xs ++ y :: ys) = xs ++ x :: ys$
$\forall(f : \alpha \rightarrow \beta) (s : \beta \rightarrow \text{bool}) (t : \beta \rightarrow \text{bool}). \text{PREIMAGE } f (s \cup t) = \text{PREIMAGE } f s \cup \text{PREIMAGE } f t$
$\forall(l : \alpha \text{ list}) (m : \text{num}). m = \text{LENGTH } l \Rightarrow \text{TAKE } m l = l$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}). s \subseteq s$
$(f : \delta \rightarrow \gamma) \circ \text{UNCURRY } (g : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \delta) = \text{UNCURRY } ((\$o f : (\beta \rightarrow \delta) \rightarrow \beta \rightarrow \gamma) \circ g)$
$\forall(t : \text{bool}). F \Rightarrow t \Leftrightarrow T$
$\forall(s : \text{num} \rightarrow \text{bool}). s \neq (\emptyset : \text{num} \rightarrow \text{bool}) \wedge \text{FINITE } s \Rightarrow \text{MIN_SET } s \leq \text{MAX_SET } s$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{SURJ } (\lambda(x : \alpha). x) s s$
$\forall(x : \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{BIGUNION } \{x\} = x$
$\forall(f : \beta \rightarrow \gamma) (g : \alpha \rightarrow \beta) (s : \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{IMAGE } (f \circ g) s = \text{IMAGE } f (\text{IMAGE } g s)$
$\forall(R1 : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}) (R2 : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}). R1 \subseteq_r R2 \wedge R2 \subseteq_r R1 \Rightarrow R1 = R2$
$\$! (\text{UNCURRY } (\lambda(x : \alpha). (P : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}) x)) \Leftrightarrow \forall(x : \alpha). \$! (P x)$
$\forall(x : \alpha) (y : \alpha) (s : \alpha \rightarrow \text{bool}). (y \text{ INSERT } s) x \Leftrightarrow x = y \vee x \in s$
$\forall(l : \alpha \text{ list}) (x : \alpha). \text{BUTLASTN } (\text{LENGTH } l) (x :: l) = [x]$
$\text{SING } ((x : \alpha) \text{ INSERT } (s : \alpha \rightarrow \text{bool})) \Leftrightarrow s = (\emptyset : \alpha \rightarrow \text{bool}) \vee s = \{x\}$

$\neg \text{LLEX } (R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) (l : \alpha \text{ list}) ([] : \alpha \text{ list})$
$\forall (P : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}) (Q : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}) (l1 : \alpha \text{ list}) (l2 : \beta \text{ list}). (\forall (x : \alpha \# \beta). \text{MEM } x (\text{ZIP } (l1, l2)) \wedge \text{UNCURRY } P x \Rightarrow \text{UNCURRY } Q x) \wedge \text{LIST_REL } P l1 l2 \Rightarrow \text{LIST_REL } Q l1 l2$
$\forall (P : \alpha \rightarrow \text{bool}) (l : \alpha \text{ list}). \text{EXISTS } P (\text{REVERSE } l) \Leftrightarrow \text{EXISTS } P l$
$(l1 : \alpha \text{ list}) ++ (l2 : \alpha \text{ list}) = (h : \alpha) :: (t : \alpha \text{ list}) \Leftrightarrow l1 = ([] : \alpha \text{ list}) \wedge l2 = h :: t \vee \exists (lt : \alpha \text{ list}). l1 = h :: lt \wedge t = lt ++ l2$
$(([] : \alpha \text{ list}) \leqslant (l : \alpha \text{ list}) \Leftrightarrow T) \wedge ((h : \alpha) :: (t : \alpha \text{ list}) \leqslant ([] : \alpha \text{ list}) \Leftrightarrow F) \wedge ((h1 : \alpha) :: (t1 : \alpha \text{ list}) \leqslant (h2 : \alpha) :: (t2 : \alpha \text{ list}) \Leftrightarrow h1 = h2 \wedge t1 \leqslant t2)$
$\neg((A : \text{bool}) \vee (B : \text{bool})) \Rightarrow F \Leftrightarrow \neg A \Rightarrow \neg B \Rightarrow F$
$\forall (f : \alpha \rightarrow \text{bool}) (l : \alpha \text{ list}). \text{FILTER } f (\text{FILTER } f l) = \text{FILTER } f l$
$\forall (P : \alpha \rightarrow \text{bool}) (l : \alpha \text{ list}). \text{EXISTS } P l \Leftrightarrow \text{FOLDR } \$ \vee F (\text{MAP } P l)$
$\forall (R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{irreflexive } R \wedge \text{transitive } R \Rightarrow \text{antisymmetric } R$
$(\forall (s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \alpha \rightarrow \text{bool}). s \subseteq s \cup t) \wedge \forall (s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \alpha \rightarrow \text{bool}). s \subseteq t \cup s$
$\text{countable } \mathbb{U}(:\text{num})$
$\forall (a : \alpha \text{ list}) (b : \alpha \text{ list}) (c : \alpha \text{ list}). a ++ b \leqslant c \Rightarrow a \leqslant c$
$\forall (r1 : \alpha \rightarrow \beta \text{ option}) (r2 : \alpha \rightarrow \beta \text{ option}) (\text{rows1} : (\alpha \rightarrow \beta \text{ option}) \text{ list}) (\text{rows2} : (\alpha \rightarrow \beta \text{ option}) \text{ list}) (\text{rows3} : (\alpha \rightarrow \beta \text{ option}) \text{ list}) (v : \alpha). (\text{IS_SOME } (r2 v) \Rightarrow \text{IS_SOME } (r1 v)) \Rightarrow \text{PMATCH } v (\text{rows1} ++ r1 :: \text{rows2} ++ r2 :: \text{rows3}) = \text{PMATCH } v (\text{rows1} ++ r1 :: \text{rows2} ++ \text{rows3})$
$\text{INVOL } (\text{relinv} : (\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) \rightarrow \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool})$
$\forall (p : \alpha \rightarrow \beta) (g : \alpha \rightarrow \text{bool}) (i : \beta). (\forall (x1 : \alpha) (x2 : \alpha). g x1 \wedge g x2 \wedge p x1 = p x2 \Rightarrow x1 = x2) \Rightarrow \forall (x : \alpha). \text{PMATCH_ROW_COND } p g i x \Rightarrow (@(y : \alpha). \text{PMATCH_ROW_COND } p g i y) = x$
$\forall (f : \text{num} \rightarrow \alpha) (s : \text{num} \rightarrow \text{bool}). \text{countable } (\text{IMAGE } f s)$
$\forall (f : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \alpha) (e : \alpha) (l : \beta \text{ list}). \text{LENGTH } (\text{SCANL } f e l) = \text{SUC } (\text{LENGTH } l)$
$\forall (x : \alpha) (s : \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{REST } s x \Leftrightarrow x \in s \wedge x \neq \text{CHOICE } s$
$(\forall (x : \alpha) (y : \alpha). (R1 : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) x y \Rightarrow (R2 : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) x y) \wedge (\forall (x : \beta) (y : \beta). (R3 : \beta \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}) x y \Rightarrow (R4 : \beta \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}) x y) \Rightarrow (R1 \text{ LEX } R3) (x : \alpha \# \beta) (y : \alpha \# \beta) \Rightarrow (R2 \text{ LEX } R4) x y$
$\forall (s : \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{FINITE } s \Rightarrow \forall (t : \alpha \rightarrow \text{bool}). t \subset s \Rightarrow \text{FINITE } t$
$\forall (r : \alpha \rightarrow \text{bool}) (s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \alpha \rightarrow \text{bool}). r \subseteq s \Rightarrow r \text{ DIFF } s \cap t = r \text{ DIFF } t$
$\forall (R : \beta \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}) (f : \alpha \rightarrow \beta) (x : \alpha) (y : \alpha). \text{inv_image } R f x y \Leftrightarrow R (f x) (f y)$
$\text{COMPL } ((s : \alpha \rightarrow \text{bool}) \cup (t : \alpha \rightarrow \text{bool})) = \text{COMPL } s \cap \text{COMPL } t$
$\forall (s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (x : \alpha) (y : \alpha). (s \text{ DELETE } y) x \Leftrightarrow x \in s \wedge x \neq y$
$\forall (y : \beta) (s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (f : \alpha \rightarrow \beta). y \in \text{IMAGE } f s \Leftrightarrow \exists (x : \alpha). y = f x \wedge x \in s$
$(x : \alpha) \in \text{RDOM } (R : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}) \Leftrightarrow \exists (y : \beta). R x y$
$\forall (R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) (x : \alpha) (y : \alpha). R^* x y \Leftrightarrow x = y \vee R^+ x y$
$\forall (l1 : \alpha \text{ list}) (l2 : \alpha \text{ list}) (P : \alpha \rightarrow \text{bool}) (P' : \alpha \rightarrow \text{bool}). l1 = l2 \wedge (\forall (x : \alpha). \text{MEM } x l2 \Rightarrow (P x \Leftrightarrow P' x)) \Rightarrow (\text{EVERY } P l1 \Leftrightarrow \text{EVERY } P' l2)$
$\forall (m : \text{num}) (n : \text{num}). m < n \Rightarrow \text{EL } m (\text{COUNT_LIST } n) = m$
$\forall (c : \text{bool}) (x : \text{bool}). (\text{if } c \text{ then } T \text{ else } x) \Leftrightarrow \neg c \Rightarrow x$
$\text{TAKE } (0 : \text{num}) (l : \alpha \text{ list}) = ([] : \alpha \text{ list})$
$\forall (f : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \beta) (e : \beta) (x : \alpha). \text{FOLDR } f e [x] = f x e$
$\forall (l : \alpha \text{ list}). \text{DROP } (\text{LENGTH } l) l = ([] : \alpha \text{ list})$
$\forall (e : \alpha) (s1 : \alpha \rightarrow \text{bool}) (s2 : \alpha \rightarrow \text{bool}). s1 \subseteq s2 \Rightarrow s1 \subseteq e \text{ INSERT } s2$
$\forall (P : \alpha \text{ list} \rightarrow \text{bool}). P ([] : \alpha \text{ list}) \wedge (\forall (t : \alpha \text{ list}). P t \Rightarrow \forall (h : \alpha). P (h :: t)) \Rightarrow \forall (l : \alpha \text{ list}). P l$

$\neg T \Leftrightarrow F$	
$(R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool})^+ (x : \alpha) (z : \alpha) \Leftrightarrow R x z \vee \exists (y : \alpha). R^+ x y \wedge R y z$	
$\forall (s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \alpha \rightarrow \text{bool}) (u : \alpha \rightarrow \text{bool}). s \subset t \wedge t \subseteq u \Rightarrow s \subset u$	
$\text{RC} (\$PSUBSET : (\alpha \rightarrow \text{bool}) \rightarrow (\alpha \rightarrow \text{bool}) \rightarrow \text{bool}) = (\$SUBSET : (\alpha \rightarrow \text{bool}) \rightarrow (\alpha \rightarrow \text{bool}) \rightarrow \text{bool})$	
$\forall (x : \text{bool}) (x' : \text{bool}) (y : \text{bool}) (y' : \text{bool}). (\neg y \Rightarrow x \Rightarrow x') \wedge (\neg x' \Rightarrow y \Rightarrow y') \Rightarrow x \vee y \Rightarrow x' \vee y'$	
$\forall (e : \alpha) (s : \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{POW} (e \text{ INSERT } s) = \text{IMAGE} (\$INSERT e) (\text{POW } s) \cup \text{POW } s$	
$\forall (s : \alpha \rightarrow \text{bool}). s \text{ DIFF } s = (\emptyset : \alpha \rightarrow \text{bool})$	
$\forall (x : \text{bool}) (x' : \text{bool}) (y : \text{bool}) (y' : \text{bool}). (x' \Rightarrow x \Rightarrow x') \wedge (x' \Rightarrow y \Rightarrow y') \Rightarrow (x \Rightarrow y) \Rightarrow x' \Rightarrow y'$	
$\forall (x : \alpha) (l : \alpha \text{ list}). \text{REVERSE} (\text{SNOC } x l) = x :: \text{REVERSE } l$	
$(\forall (x : \alpha). (P : \alpha \rightarrow \text{bool}) x \Rightarrow (P' : \alpha \rightarrow \text{bool}) x) \Rightarrow \text{OPTION_ALL } P (\text{opt} : \alpha \text{ option}) \Rightarrow \text{OPTION_ALL } P' \text{ opt}$	
$\forall (x : \alpha) (P : \alpha \rightarrow \text{bool}). x \in (\lambda(x : \alpha). P x) \Leftrightarrow P x$	
$(\text{tri} (n : \text{num}) = (0 : \text{num}) \Leftrightarrow n = (0 : \text{num})) \wedge ((0 : \text{num}) = \text{tri } n \Leftrightarrow n = (0 : \text{num}))$	
$\text{REVERSE} ([] : \beta \text{ list}) = ([] : \beta \text{ list}) \wedge \forall (x : \alpha) (l : \alpha \text{ list}). \text{REVERSE} (x :: l) = \text{SNOC } x (\text{REVERSE } l)$	
$\forall (l1 : \alpha \text{ list}) (l2 : \alpha \text{ list}). \neg \text{NULL } l1 \Rightarrow \text{ELL} (\text{LENGTH } l2) (l1 ++ l2) = \text{LAST } l1$	
$\forall (x : \alpha) (l : \alpha \text{ list}). \text{LENGTH} (\text{SNOC } x l) = \text{SUC} (\text{LENGTH } l)$	
$(\forall (f : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \gamma). \text{MAP2 } f ([] : \alpha \text{ list}) ([] : \beta \text{ list}) = ([] : \gamma \text{ list})) \wedge \forall (f : \delta \rightarrow \varepsilon \rightarrow \zeta) (h1 : \delta) (t1 : \delta \text{ list}) (h2 : \varepsilon) (t2 : \varepsilon \text{ list}). \text{MAP2 } f (h1 :: t1) (h2 :: t2) = f h1 h2 :: \text{MAP2 } f t1 t2$	
$\forall (s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \beta \rightarrow \text{bool}) (f : \alpha \rightarrow \beta) (x : \alpha). f \in \text{FUNSET } s t \wedge x \in s \Rightarrow f x \in t$	
$\forall (s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \alpha \rightarrow \text{bool}). s \subseteq t \Leftrightarrow s \cup t = t$	
$\text{RC} (R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) = R \cup_r (\$= : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool})$	
$\forall (f : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \gamma). \text{UNCURRY } f = (\lambda(x : \alpha \# \beta). f (\text{FST } x) (\text{SND } x))$	
$\forall (l : \text{bool list}). \text{OR_EL } l \Leftrightarrow \text{FOLDR } \$ \vee F l$	
$\forall (l1 : \alpha \text{ list}) (l2 : \alpha \text{ list}). \text{LENGTH } l1 = \text{LENGTH } l2 \wedge (\forall (x : \text{num}). x < \text{LENGTH } l1 \Rightarrow \text{EL } x l1 = \text{EL } x l2) \Rightarrow l1 = l2$	
$\forall (x : \alpha) (s : \alpha \rightarrow \text{bool}). x \in s \Rightarrow x \text{ INSERT } s = s$	
$\forall (P : \text{num} \rightarrow \text{bool}) (Q : \text{num} \rightarrow \text{bool}). \text{FINITE } P \wedge (P = (\emptyset : \text{num} \rightarrow \text{bool}) \Rightarrow Q (0 : \text{num})) \wedge (\forall (x : \text{num}). (\forall (y : \text{num}). y \in P \Rightarrow y \leq x) \wedge x \in P \Rightarrow Q x) \Rightarrow Q (\text{MAX_SET } P)$	
$\forall (e : \alpha) (l : \alpha \text{ list}). \text{MEM} (\text{LAST} (e :: l)) (e :: l)$	
$\forall (R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}). R^{\diamond \diamond} = R^{\diamond}$	
$\neg((p : \text{bool}) \Rightarrow (q : \text{bool})) \Rightarrow \neg q$	
$\forall (n : \text{num}) (ls : \alpha \text{ list}). n < \text{LENGTH } ls \Rightarrow \text{UPDATE} (\text{EL } n ls) n ls = ls$	
$\forall (y : \text{bool}) (x : \text{bool}). \text{ASM_MARKER } y x \Leftrightarrow x$	
$\forall (x : \text{num}) (l : \text{num list}). \text{SUM} (\text{SNOC } x l) = \text{SUM } l + x$	
$\forall (R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{StrongOrder } R \Rightarrow \text{STRORD} (\text{RC } R) = R$	
$\forall (l1 : \alpha \text{ list}) (l2 : \alpha \text{ list}) (l3 : \alpha \text{ list}). (\forall (n : \text{num}). n < \text{LENGTH } l1 \wedge (R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) (\text{EL } n l1) (\text{EL } n l2) \wedge R (\text{EL } n l2) (\text{EL } n l3) \Rightarrow R (\text{EL } n l1) (\text{EL } n l3)) \wedge \text{LIST_REL } R l1 l2 \wedge \text{LIST_REL } R l2 l3 \Rightarrow \text{LIST_REL } R l1 l3$	
$\forall (P : \alpha \rightarrow \beta) (v : \gamma). P (\text{PMATCH } v ([] : (\gamma \rightarrow \alpha \text{ option}) \text{ list})) = P (\text{ARB} : \alpha)$	
$\forall (s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{INFINITE } s \wedge \text{FINITE } t \Rightarrow \exists (x : \alpha). x \in s \wedge x \notin t$	
$\forall (v : \alpha) (\text{rows} : (\alpha \rightarrow \beta \text{ option}) \text{ list}) (n : \text{num}). n < \text{LENGTH } \text{rows} \wedge \text{IS_SOME} (\text{EL } n \text{ rows } v) \Rightarrow \text{PMATCH } v \text{ rows} = \text{PMATCH } v (\text{TAKE} (\text{SUC } n) \text{ rows})$	

$\forall(f : \alpha \rightarrow \beta) (\text{ls} : \alpha \text{ list}). \text{ALL_DISTINCT}(\text{MAP } f \text{ ls}) \Rightarrow \text{ALL_DISTINCT ls}$
$(\forall(x : \alpha). \text{LAST}[x] = x) \wedge \forall(h1 : \beta) (h2 : \beta) (t : \beta \text{ list}). \text{LAST}(h1 :: h2 :: t) = \text{LAST}(h2 :: t)$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{FINITE}(\text{REST } s) \Leftrightarrow \text{FINITE } s$
$\forall(x : \text{bool}) (x' : \text{bool}) (y : \text{bool}) (y' : \text{bool}). (\neg y \Rightarrow x' \Rightarrow x) \wedge (\neg x' \Rightarrow y' \Rightarrow y) \Rightarrow x' \vee y' \Rightarrow x \vee y$
$\text{PMATCH_ROW_COND}(\text{pat} : \alpha \rightarrow \beta) (\text{guard} : \alpha \rightarrow \text{bool}) (\text{inp} : \beta) (v : \alpha) \Leftrightarrow \text{inp} = \text{pat } v \wedge \text{guard } v$
$\forall(l : \alpha \text{ list}). \text{NULL } l \Leftrightarrow \text{FOLDR}(\lambda(x : \alpha). (l' : \text{bool}), F) T I$
$(0 : \text{num}) < (n : \text{num}) \Rightarrow \text{TAKE } n ((x : \alpha) :: (xs : \alpha \text{ list})) = x :: \text{TAKE}(n - (1 : \text{num})) xs$
$\text{COUNT_LIST}(0 : \text{num}) = ([] : \text{num list}) \wedge \forall(n : \text{num}). \text{COUNT_LIST}(\text{SUC } n) = \text{SNOC } n (\text{COUNT_LIST } n)$
$\forall(x : \alpha) (l : \alpha \text{ list}). ([] : \alpha \text{ list}) \neq \text{SNOC } x $
$\text{IDEM}(\text{RTC} : (\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) \rightarrow \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool})$
$\forall(v_{\text{old}} : \alpha) (v_{\text{new}} : \beta). \text{PMATCH } v_{\text{old}} ([] : (\alpha \rightarrow \gamma \text{ option}) \text{ list}) = \text{PMATCH } v_{\text{new}} ([] : (\beta \rightarrow \gamma \text{ option}) \text{ list})$
$\text{OPTION_GUARD}(b : \text{bool}) = \text{if } b \text{ then SOME } () \text{ else (NONE :unit option)}$
$(\forall(\text{opt} : \alpha \text{ option}). (\text{P} : \alpha \text{ option} \rightarrow \text{bool}) \text{ opt}) \Leftrightarrow \text{P}(\text{NONE} : \alpha \text{ option}) \wedge \forall(x : \alpha). \text{P}(\text{SOME } x)$
$\forall(x : \alpha) (y : \alpha) (s : \alpha \rightarrow \text{bool}). x \text{ INSERT } y \text{ INSERT } s = y \text{ INSERT } x \text{ INSERT } s$
$\forall(f : \alpha \rightarrow \beta) (s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \beta \rightarrow \text{bool}). \text{BIJ } f \text{ s } t \wedge \text{FINITE } s \Rightarrow \text{FINITE } t$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}). (\emptyset : \alpha \rightarrow \text{bool}) \text{ DIFF } s = (\emptyset : \alpha \rightarrow \text{bool})$
$\forall(M : \alpha \text{ list}) (N : \alpha \text{ list}) (f : \alpha \rightarrow \text{num}) (f' : \alpha \rightarrow \text{num}). M = N \wedge (\forall(x : \alpha). \text{MEM } x \text{ N} \Rightarrow f x = f' x) \Rightarrow \text{list_size } f M = \text{list_size } f' N$
$\forall(m : \text{num}) (l : \alpha \text{ list}). m \leq \text{LENGTH } l \Rightarrow \forall(n : \text{num}). n \leq m \Rightarrow \text{TAKE } n (\text{TAKE } m l) = \text{TAKE } n l$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \alpha \rightarrow \text{bool}). s \subseteq t \Rightarrow \forall(f : \alpha \rightarrow \beta). \text{IMAGE } f s \subseteq \text{IMAGE } f t$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \beta \rightarrow \text{bool}). (\exists(f : \alpha \rightarrow \beta). \text{SURJ } f s t) \Rightarrow \exists(g : \beta \rightarrow \alpha). \text{INJ } g t s$
$\forall(f : \text{num} \rightarrow \alpha) (n : \text{num}). \text{LENGTH}(\text{GENLIST } f n) = n$
$\text{IDEM}(\text{TC} : (\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) \rightarrow \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool})$
$\forall(f : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \alpha). \text{ASSOC } f \Rightarrow \forall(e : \alpha). \text{LEFT_ID } f e \Rightarrow \forall(l : \alpha \text{ list list}). \text{FOLDR } f e (\text{FLAT } l) = \text{FOLDR } f e (\text{MAP}(\text{FOLDR } f e) l)$
$\forall(l : \alpha \text{ list}). \text{IS_SUFFIX } l l$
$\forall(h1 : \alpha) (h2 : \alpha). h1 \neq h2 \Rightarrow \forall(l1 : \alpha \text{ list}) (l2 : \alpha \text{ list}). h1 :: l1 \neq h2 :: l2$
$\forall(P : \beta \rightarrow \text{bool}) (f : \alpha \rightarrow \beta) (l : \alpha \text{ list}). \text{EVERY } P (\text{MAP } f l) \Leftrightarrow \text{EVERY}(\lambda(x : \alpha). P(f x)) l$
$\forall(l1 : \alpha \text{ list}) (l2 : \alpha \text{ list}) (n : \text{num}) (x : \alpha). \text{LENGTH } l1 \leq n \Rightarrow \text{LUPDATE } x n (l1 ++ l2) = l1 ++ \text{LUPDATE } x (n - \text{LENGTH } l1) l2$
$\{x \mid (P : \alpha \rightarrow \text{bool}) x\} = P$
$\forall(x : \alpha) (s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \alpha \rightarrow \text{bool}). x \text{ INSERT } s \subseteq t \Leftrightarrow x \in t \wedge s \subseteq t$
$\forall(t : \text{bool}). t \Rightarrow T$
$(\forall(x : \alpha) (y : \beta). (R1 : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}) x y \Rightarrow (R2 : \beta \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) y x) \Rightarrow \forall(x : \alpha \text{ list}) (y : \beta \text{ list}). \text{LIST_REL } R1 x y \Rightarrow \text{LIST_REL } R2 y x$
$\forall(l : \alpha \text{ list}). \neg \text{NULL } l \Rightarrow \text{ELL}(0 : \text{num}) l = \text{LAST } l$
$\forall(v : \alpha) (\text{rows} : (\alpha \rightarrow \beta \text{ option}) \text{ list}) (i : \text{num}). i < \text{LENGTH } \text{rows} \Rightarrow (\text{EL } i (\text{STRONGEST_REDUNDANT_ROWS_INFO } v \text{ rows}) = \text{EVERY}(\lambda(r : \alpha \rightarrow \beta \text{ option}). r v = (\text{NONE} : \beta \text{ option})) (\text{TAKE } i \text{ rows}) \Rightarrow \text{EL } i \text{ rows } v = (\text{NONE} : \beta \text{ option}))$
$\text{UNCURRY}(f : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \gamma) = \text{UNCURRY}(g : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \gamma) \Leftrightarrow f = g$

$\text{PMATCH_ROW_COND_NOT_EX_OR_EQ} (i : \alpha) (r : \alpha \rightarrow \beta \text{ option}) ([] : (\alpha \rightarrow \beta \text{ option}) \text{ list}) \Leftrightarrow r \\ i \neq (\text{NONE} : \beta \text{ option}) \Rightarrow F$
$\forall (s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \alpha \rightarrow \text{bool}) (u : \alpha \rightarrow \text{bool}). s \subseteq t \cap u \Leftrightarrow s \subseteq t \wedge s \subseteq u$
$\forall (P : \alpha \rightarrow \text{bool}) (v : \beta) (\text{rows} : (\beta \rightarrow \alpha \text{ option}) \text{ list}). P (\text{PMATCH } v \text{ rows}) \Leftrightarrow \\ \text{PMATCH_EXPAND_PRED } P \text{ v } ([] : (\beta \rightarrow \alpha \text{ option}) \text{ list}) \text{ rows}$
$\text{nsnd} (0 : \text{num}) = (0 : \text{num})$
$\forall (l : \alpha \text{ list}) (m : \text{num}). m = \text{LENGTH } l \Rightarrow \text{DROP } m \text{ l} = ([] : \alpha \text{ list})$
$\forall (x : \alpha) (s : \alpha \rightarrow \text{bool}). x \in s \wedge (\forall (y : \alpha). y \in s \Rightarrow x = y) \Leftrightarrow s = \{x\}$
$(\exists (p : \alpha \# \beta). (P : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}) (\text{FST } p) (\text{SND } p)) \Leftrightarrow \exists (p1 : \alpha) (p2 : \beta). P \text{ p1 p2}$
$([] : \alpha \text{ list}) \in \text{common_prefixes} (s : \alpha \text{ list} \rightarrow \text{bool})$
$\forall (P : \beta \rightarrow \text{bool}) (f : \alpha \rightarrow \beta) (l : \alpha \text{ list}). \text{EXISTS } P (\text{MAP } f \text{ l}) \Leftrightarrow \text{EXISTS } (\lambda (x : \alpha). P (f x)) \text{ l}$
$\forall (x : \alpha). (\text{NONE} : \alpha \text{ option}) \neq \text{SOME } x$
$\forall (f : \alpha \rightarrow \beta) (R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) (y : \alpha) (z : \alpha). R \text{ y z} \Rightarrow \text{RESTRICT } f \text{ R z y} = f \text{ y}$
$\forall (x : \alpha) (y : \alpha). \text{SOME } x = \text{SOME } y \Leftrightarrow x = y$
$\forall (s : \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{DISJOINT} (\emptyset : \alpha \rightarrow \text{bool}) s \wedge \text{DISJOINT} s (\emptyset : \alpha \rightarrow \text{bool})$
$(\forall (s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \alpha \rightarrow \text{bool}). s \cup (t \text{ DIFF } s) = s \cup t) \wedge \forall (s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \alpha \rightarrow \text{bool}). t \text{ DIFF } s \cup s = t \cup s$
$\text{DATATYPE} ((\text{option} : \alpha \text{ option} \rightarrow (\alpha \rightarrow \alpha \text{ option}) \rightarrow \beta) (\text{NONE} : \alpha \text{ option}) (\text{SOME} : \alpha \rightarrow \alpha \text{ option}))$
$\forall (s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \alpha \rightarrow \text{bool}). s \subseteq t \wedge t \subseteq s \Rightarrow s = t$
$\forall (s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \alpha \rightarrow \text{bool}) (u : \alpha \rightarrow \text{bool}). s \cup t \cap u = (s \cup t) \cap (s \cup u)$
$\forall (l : \alpha \text{ list}). (0 : \text{num}) < \text{LENGTH } l \Leftrightarrow \neg \text{NULL } l$
$\forall (P : \alpha \rightarrow \text{bool}) (Q : \alpha \rightarrow \text{bool}). (\forall (x : \alpha). P x \Rightarrow Q x) \Rightarrow \forall (l : \alpha \text{ list}). \text{EVERY } P \text{ l} \Rightarrow \text{EVERY } Q \text{ l}$
$\forall (p : \text{num} \rightarrow \text{bool}). (\exists (n : \text{num}). p n) \Rightarrow p (\$LEAST p) \wedge \forall (n : \text{num}). n < \$LEAST p \Rightarrow \neg p n$
$\forall (s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \alpha \rightarrow \text{bool}) (u : \alpha \rightarrow \text{bool}). (\text{DISJOINT} (s \cup t) u \Leftrightarrow \text{DISJOINT} s u \wedge \text{DISJOINT} t u) \wedge (\text{DISJOINT} u (s \cup t) \Leftrightarrow \text{DISJOINT} s u \wedge \text{DISJOINT} t u)$
$\forall (xs : \alpha \text{ list}) (h : \alpha) (i : \text{num}). (P : \alpha \rightarrow \text{bool}) h \wedge \text{EVERY } P \text{ xs} \Rightarrow \text{EVERY } P (\text{UPDATE } h \text{ i } xs)$
$\forall (P : (\alpha \rightarrow \text{bool}) \rightarrow \text{bool}). (\text{BIGUNION } P = (\emptyset : \alpha \rightarrow \text{bool}) \Leftrightarrow P = (\emptyset : (\alpha \rightarrow \text{bool}) \rightarrow \text{bool}) \vee P = \{(\emptyset : \alpha \rightarrow \text{bool})\}) \wedge ((\emptyset : \alpha \rightarrow \text{bool}) = \text{BIGUNION } P \Leftrightarrow P = (\emptyset : (\alpha \rightarrow \text{bool}) \rightarrow \text{bool}) \vee P = \{(\emptyset : \alpha \rightarrow \text{bool})\})$
$(x : \alpha \rightarrow \text{bool}) \cap \text{COMPL } x = (\emptyset : \alpha \rightarrow \text{bool}) \wedge \text{COMPL } x \cap x = (\emptyset : \alpha \rightarrow \text{bool})$
$\text{TAKE} (n : \text{num}) (l : \alpha \text{ list}) = ([] : \alpha \text{ list}) \Leftrightarrow n = (0 : \text{num}) \vee l = ([] : \alpha \text{ list})$
$\text{APPLY_REDUNDANT_ROWS_INFO} ([] : \text{bool list}) ([] : \alpha \text{ list}) = ([] : \alpha \text{ list}) \wedge (\forall (is : \text{bool list}) (x : \beta) (xs : \beta \text{ list}). \text{APPLY_REDUNDANT_ROWS_INFO} (T::is) (x::xs) = \text{APPLY_REDUNDANT_ROWS_INFO} is xs) \wedge \forall (is : \text{bool list}) (x : \gamma) (xs : \gamma \text{ list}). \text{APPLY_REDUNDANT_ROWS_INFO} (F::is) (x::xs) = x::\text{APPLY_REDUNDANT_ROWS_INFO} is xs)$
$\forall (s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \alpha \rightarrow \text{bool}) (u : \alpha \rightarrow \text{bool}). s \cap (t \cup u) = s \cap t \cup s \cap u$
$\forall (n : \text{num}) (f : \text{num} \rightarrow \alpha) (m : \text{num}). n < m \Rightarrow \text{EL } n (\text{MAP } f (\text{COUNT_LIST } m)) = f n$
$\forall (x : \alpha + \beta). \neg \text{ISR } x \Leftrightarrow \text{ISL } x$
$\forall (R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) (x : \alpha) (y : \alpha). R x y \Rightarrow R^{\wedge} x y$
$\forall (l : \alpha \text{ list}) (n : \text{num}). \text{LENGTH } l \leq n \Rightarrow \text{TAKE } n \text{ l} = l$
$\forall (R : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}). R^T T = R$
$\forall (R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}). R^{++} = R^+$

$\forall(x:\alpha)(f:\alpha \rightarrow \text{num} \rightarrow \alpha). \text{PRIM_REC } x f (0:\text{num}) = x \wedge \forall(m:\text{num}). \text{PRIM_REC } x f (\text{SUC } m) = f(\text{PRIM_REC } x f m) m$
$\forall(l1:\alpha \text{ list})(l2:\alpha \text{ list})(l:\alpha \text{ list}). \text{IS_SUFFIX } l2 \mid l \Rightarrow \text{IS_SUFFIX } (l1 ++ l2) \mid l$
$\forall(x:\alpha)(f:\beta \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool})(s:\beta \rightarrow \text{bool}). x \in \text{BIGINTER } (\text{IMAGE } f s) \Leftrightarrow \forall(y:\beta). y \in s \Rightarrow x \in f y$
$\forall(x:\alpha). x \text{ INSERT } \mathbb{U}(:\alpha) = \mathbb{U}(:\alpha)$
$\text{OPTION_MAP2 } (f:\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \gamma)(o1:\alpha \text{ option})(o2:\beta \text{ option}) = \text{SOME } (v:\gamma) \Leftrightarrow \exists(x1:\alpha)(x2:\beta). o1 = \text{SOME } x1 \wedge o2 = \text{SOME } x2 \wedge v = f x1 x2$
$(\forall(s:\alpha). (P:\alpha \rightarrow \text{bool}) s \Leftrightarrow (Q:\alpha \rightarrow \text{bool}) s) \Rightarrow ((\exists(s:\alpha). P s) \Leftrightarrow \exists(s:\alpha). Q s)$
$\text{reflexive } (R:\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool})^{\wedge=}$
$\forall(f:\alpha \rightarrow \beta)(ls:\alpha \text{ list})(a:\beta \text{ list}). \text{FOLDR } (\lambda(x:\alpha)(y:\beta \text{ list}). f x :: y) a ls = \text{MAP } f ls ++ a$
$\text{INJ } (f:\alpha \rightarrow \beta)(s:\alpha \rightarrow \text{bool})(t:\beta \rightarrow \text{bool}) \Leftrightarrow (\forall(x:\alpha). x \in s \Rightarrow f x \in t) \wedge \forall(x:\alpha)(y:\alpha). x \in s \wedge y \in s \Rightarrow (f x = f y \Leftrightarrow x = y)$
$\forall(s:\alpha \rightarrow \text{bool}). \text{IMAGE } (\lambda(x:\alpha). x) s = s$
$(R:\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool})^{\diamond} (x:\alpha) x$
$\forall(l:\alpha \text{ list})(l':\alpha \text{ list})(b:\beta)(b':\beta)(f:\beta \rightarrow \alpha \rightarrow \beta)(f':\beta \rightarrow \alpha \rightarrow \beta). l = l' \wedge b = b' \wedge (\forall(x:\alpha)(a:\beta). \text{MEM } x l' \Rightarrow f a x = f' a x) \Rightarrow \text{FOLDL } f b l = \text{FOLDL } f' b' l'$
$\forall(x:\alpha)(f:\alpha \rightarrow \alpha)(g1:\text{num} \rightarrow \alpha)(g2:\text{num} \rightarrow \alpha)(m1:\text{num})(m2:\text{num}). \text{SIMP_REC_REL } g1 x f m1 \wedge \text{SIMP_REC_REL } g2 x f m2 \Rightarrow \forall(n:\text{num}). n < m1 \wedge n < m2 \Rightarrow g1 n = g2 n$
$\forall(P:\alpha \rightarrow \text{bool})(l:\alpha \text{ list list}). \text{FILTER } P (\text{FLAT } l) = \text{FLAT } (\text{MAP } (\text{FILTER } P) l)$
$\forall(s:\alpha \text{ list})(h:\alpha)(t:\alpha \text{ list}). \text{IS_SUFFIX } s(h::t) \Rightarrow \text{IS_SUFFIX } s t$
$\forall(P:\alpha \rightarrow \text{bool})(s:(\alpha \rightarrow \text{bool}) \rightarrow \text{bool}). (\forall(x:\alpha). x \in \text{BIGUNION } s \Rightarrow P x) \Leftrightarrow \forall(t:\alpha \rightarrow \text{bool})(x:\alpha). t \in s \wedge x \in t \Rightarrow P x$
$\forall(t:\text{bool}). F \wedge t \Leftrightarrow F$
$\forall(P:\alpha \rightarrow \text{bool})(l:\alpha \text{ list}). \text{FILTER } P l \neq l \Leftrightarrow \exists(x:\alpha). \text{MEM } x l \wedge \neg P x$
$(x:\alpha \text{ list}) \neq ([]:\alpha \text{ list}) \Leftrightarrow (0:\text{num}) < \text{LENGTH } x$
$\forall(y:\alpha)(x:\alpha)(l:\alpha \text{ list}). \text{MEM } y (\text{SNOC } x l) \Leftrightarrow y = x \vee \text{MEM } y l$
$\text{SUM_SET } (\emptyset:\text{num} \rightarrow \text{bool}) = (0:\text{num})$
$\text{MAP } (\lambda(x:\alpha). x)(l:\alpha \text{ list}) = l \wedge \text{MAP } (l:\alpha \rightarrow \alpha) l = l$
$\forall(s:\alpha \rightarrow \text{bool})(t:\alpha \rightarrow \text{bool}). s \subseteq t \wedge \text{countable } t \Rightarrow \text{countable } s$
$\{x \mid F\} = (\emptyset:\alpha \rightarrow \text{bool})$
$\forall(f:\alpha \rightarrow \beta)(s:\alpha \rightarrow \text{bool}). s \subseteq \text{PREIMAGE } f (\text{IMAGE } f s)$
$\forall(x:\alpha)(s:\alpha \rightarrow \text{bool})(t:\alpha \rightarrow \text{bool}). \text{DISJOINT } t (x \text{ INSERT } s) \Leftrightarrow \text{DISJOINT } t s \wedge x \notin t$
$\forall(x:\alpha)(s:\alpha \rightarrow \text{bool})(t:\alpha \rightarrow \text{bool}). (x \text{ INSERT } s) \cup t = \text{if } x \in t \text{ then } s \cup t \text{ else } x \text{ INSERT } s \cup t$
$\forall(R:\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}). (\forall(x:\alpha). R^{\diamond} x x) \wedge \forall(x:\alpha)(y:\alpha)(z:\alpha). R^{\diamond} x y \wedge R y z \Rightarrow R^{\diamond} x z$
$\forall(s:\text{num} \rightarrow \text{bool})(t:\text{num} \rightarrow \text{bool}). \text{FINITE } t \wedge s \subseteq t \Rightarrow \text{SUM_SET } s \leq \text{SUM_SET } t$
$\forall(x:\alpha \text{ list})(l:\alpha \text{ list list}). \text{FLAT } (\text{SNOC } x l) = \text{FLAT } l ++ x$
$\forall(f:\alpha \rightarrow \beta)(P:\alpha \rightarrow \text{bool})(Q:\beta \rightarrow \text{bool}). f \in \text{FUNSET } P Q \Leftrightarrow \forall(x:\alpha). x \in P \Rightarrow f x \in Q$
$\forall(v:\alpha)(\text{rows1}:(\alpha \rightarrow \beta \text{ option}) \text{ list})(\text{rows2}:(\alpha \rightarrow \beta \text{ option}) \text{ list})(\text{rows3}:(\alpha \rightarrow \beta \text{ option}) \text{ list}). \text{PMATCH_EQUIV_ROWS } v \text{ rows1 } \text{ rows2} \Rightarrow \text{PMATCH_EQUIV_ROWS } v \text{ rows2 } \text{ rows3} \Rightarrow \text{PMATCH_EQUIV_ROWS } v \text{ rows1 } \text{ rows3}$
$\forall(l1:\alpha \text{ list})(l2:\beta \text{ list})(f:\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}). \text{LIST_REL } f l1 l2 \Leftrightarrow \text{LENGTH } l1 = \text{LENGTH } l2 \wedge \text{EVERY } (\text{UNCURRY } f) (\text{ZIP } (l1, l2))$
$(\forall(s:\alpha + \beta). (P:\alpha + \beta \rightarrow \text{bool}) s) \Leftrightarrow (\forall(x:\alpha). P (\text{INL } x:\alpha + \beta)) \wedge \forall(y:\beta). P (\text{INR } y:\alpha + \beta)$

$\forall(P : \alpha \# \beta \rightarrow \gamma). (\lambda(p : \alpha \# \beta). P p) = (\lambda((p1 : \alpha), (p2 : \beta)). P (p1, p2))$
$\forall(n : \text{num}). \text{count}(n + (1 : \text{num})) = n \text{ INSERT } \text{count } n$
$\forall(P : \alpha \rightarrow \text{bool}) (l : \alpha \text{ list}). \text{FILTER } P l = \text{FOLDL } (\lambda(x : \alpha) (l' : \alpha \text{ list}). \text{if } P x \text{ then } x :: l' \text{ else } l') ([] : \alpha \text{ list}) l$
$\forall(l : (\alpha \# \beta) \text{ list}). \text{LENGTH } (\text{UNZIP_FST } l) = \text{LENGTH } l$
$\forall(R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{WeakOrder } R \Rightarrow \forall(y : \alpha) (z : \alpha). y = z \Leftrightarrow R y z \wedge R z y$
$\forall(\text{opt} : \alpha \text{ option}). \text{OPTION_BIND } \text{opt} (\text{SOME} : \alpha \rightarrow \alpha \text{ option}) = \text{opt}$
$((p : \text{bool}) \Leftrightarrow (q : \text{bool}) \wedge (r : \text{bool})) \Leftrightarrow (p \vee \neg q \vee \neg r) \wedge (q \vee \neg p) \wedge (r \vee \neg p)$
$\text{LIST_REL } (\lambda(a : \alpha) (b : \beta). (P : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}) a b \wedge (Q : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}) a b) (l1 : \alpha \text{ list}) (l2 : \beta \text{ list}) \Leftrightarrow \text{LIST_REL } (\lambda(a : \alpha) (b : \beta). P a b) l1 l2 \wedge \text{LIST_REL } (\lambda(a : \alpha) (b : \beta). Q a b) l1 l2$
$\forall(n : \text{num}) (m : \text{num}) (l : \alpha \text{ list}). \text{TAKE}(n + m) l = \text{TAKE } n l ++ \text{TAKE } m (\text{DROP } n l)$
$\text{MAX}(0 : \text{num}) (x : \text{num}) = x \wedge \text{MAX } x (0 : \text{num}) = x \wedge \text{MAX } (\text{NUMERAL } x) (\text{NUMERAL } (y : \text{num})) = \text{NUMERAL } (\text{if } x < y \text{ then } y \text{ else } x)$
$\forall(R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{transitive } R \Rightarrow R^+ = R$
$(\text{OPTION_GUARD } (b : \text{bool}) = \text{SOME} () \Leftrightarrow b) \wedge (\text{OPTION_GUARD } b = (\text{NONE} : \text{unit option}) \Leftrightarrow \neg b)$
$\forall(f : \alpha \rightarrow \beta) (s : \beta \rightarrow \text{bool}). \text{PREIMAGE } f s = s \circ f$
$\forall(l1 : \alpha \text{ list}) (l2 : \alpha \text{ list}) (P : \alpha \rightarrow \text{bool}) (P' : \alpha \rightarrow \text{bool}). l1 = l2 \wedge (\forall(x : \alpha). \text{MEM } x l2 \Rightarrow (P x \Leftrightarrow P' x)) \Rightarrow (\text{EXISTS } P l1 \Leftrightarrow \text{EXISTS } P' l2)$
$\text{flip } (\text{UNCURRY } (f : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \delta \rightarrow \gamma)) (x : \delta) = \text{UNCURRY } (\text{flip } ((\text{flip } : (\beta \rightarrow \delta \rightarrow \gamma) \rightarrow \delta \rightarrow \beta \rightarrow \gamma) \circ f) x)$
$\forall(P1 : \alpha \rightarrow \text{bool}) (P2 : \alpha \rightarrow \text{bool}) (l : \alpha \text{ list}). \text{EVERY } P1 l \Rightarrow \text{EVERY } P1 (\text{FILTER } P2 l)$
$\forall(p : \alpha \rightarrow \beta) (g : \alpha \rightarrow \text{bool}) (r : \alpha \rightarrow \gamma) (v : \beta) (\text{rows} : (\beta \rightarrow \gamma \text{ option}) \text{ list}). (\forall(x : \alpha). r x = (\text{ARB} : \gamma)) \Rightarrow \text{PMATCH } v (\text{SNOC } (\text{PMATCH_ROW } p g r) \text{ rows}) = \text{PMATCH } v \text{ rows}$
$\forall(x : \alpha) (l : \alpha \text{ list}). \text{MEM } x l \Leftrightarrow \text{EXISTS } (\$= x) l$
$\neg(\neg(A : \text{bool}) \vee (B : \text{bool})) \Rightarrow F \Leftrightarrow A \Rightarrow \neg B \Rightarrow F$
$\forall(R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{SC } (\text{RC } R) = \text{RC } (\text{SC } R) \wedge \text{RC } (\text{RC } R) = \text{RC } R \wedge (\text{RC } R)^+ = \text{RC } R^+$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}). (\emptyset : \alpha \rightarrow \text{bool}) \subseteq s$
$\forall(l : \alpha \text{ list}). \text{NULL } l \Leftrightarrow \text{LENGTH } l = (0 : \text{num})$
$\forall(P : \alpha \# \beta \rightarrow \text{bool}). (\forall(p_1 : \alpha) (p_2 : \beta). P (p_1, p_2)) \Rightarrow \forall(p : \alpha \# \beta). P p$
$\text{WF } (R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) \Rightarrow R^+ (x : \alpha) (y : \alpha) \Rightarrow x \neq y$
$\forall(f : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \alpha) (e : \alpha) (g : \gamma \rightarrow \beta) (l : \gamma \text{ list}). \text{FOLDL } f e (\text{MAP } g l) = \text{FOLDL } (\lambda(x : \alpha) (y : \gamma). f x (g y)) e l$
$\forall(f : \alpha \rightarrow \beta) (s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \beta \rightarrow \text{bool}). \text{INJ } f s t \Rightarrow \text{IMAGE } f s \subseteq t$
$\forall(\text{opt} : \alpha \text{ option}). \text{opt} = (\text{NONE} : \alpha \text{ option}) \vee \exists(x : \alpha). \text{opt} = \text{SOME } x$
$(\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}). (\emptyset : \alpha \rightarrow \text{bool}) \cap s = (\emptyset : \alpha \rightarrow \text{bool})) \wedge \forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}). s \cap (\emptyset : \alpha \rightarrow \text{bool}) = (\emptyset : \alpha \rightarrow \text{bool})$
$\text{OPTION_MAP } (l : \alpha \rightarrow \alpha) (x : \alpha \text{ option}) = x \wedge \text{OPTION_MAP } (\lambda(x : \alpha). x) x = x$
$(\text{pair_CASE } (p : \beta \# \gamma) (f : \beta \rightarrow \gamma \rightarrow \alpha) : \alpha) = (v : \alpha) \Leftrightarrow \exists(x : \beta) (y : \gamma). p = (x, y) \wedge f x y = v$
$\text{WF } (R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) \Rightarrow \text{irreflexive } R$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{FINITE } s \wedge t \subseteq s \Rightarrow \text{FINITE } t$
$\forall(f : \alpha \rightarrow \beta) (R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) (P : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}) (M : (\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \alpha \rightarrow \beta) (x : \alpha). f = \text{WFREC } R M \wedge \text{WF } R \wedge \text{INDUCTIVE_INVARIANT } R P M \Rightarrow P x (f x)$
$\forall(R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{symmetric } (\text{RC } R) \Leftrightarrow \text{symmetric } R$

$\forall(n:\text{num})(x:\alpha)(y:\alpha). \text{MEM } y (\text{REPLICATE } n x) \Leftrightarrow x = y \wedge (0:\text{num}) < n$
$\forall(P:\alpha \rightarrow \text{bool})(ls:\alpha \text{ list}). \text{NULL } (\text{FILTER } P ls) \Leftrightarrow \forall(x:\alpha). \text{MEM } x ls \Rightarrow \neg P x$
$\text{SING } (\emptyset:\alpha \rightarrow \text{bool}) \Leftrightarrow F$
$\neg((p:\text{bool}) \vee (q:\text{bool})) \Rightarrow \neg q$
$(([(f:\beta \rightarrow \alpha)] <^* [(x:\beta)]) : \alpha \text{ list}) = [f x]$
$\forall(f:\alpha \rightarrow \beta)(s:\beta \rightarrow \text{bool})(x:\alpha). x \in \text{PREIMAGE } f s \Leftrightarrow f x \in s$
$\forall(f:\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \alpha)(e:\alpha)(x:\beta). \text{FOLDL } f e [x] = f e x$
$\forall(P:\alpha \rightarrow \text{bool})(Q:\beta \rightarrow \text{bool})(x:\alpha). (x \text{ INSERT } P) \times Q = \{x\} \times Q \cup P \times Q$
$(n:\text{num}) = \text{LENGTH } (l1:\alpha \text{ list}) \Rightarrow \text{ZIP } (l1, \text{COUNT_LIST } n) = \text{GENLIST } (\lambda(n:\text{num}). (\text{EL } n l1, n)) (\text{LENGTH } l1)$
$(\forall(x:\alpha). \text{MEM } x (ls:\alpha \text{ list}) \Rightarrow (R:\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) x x) \Rightarrow \text{LIST_REL } R ls ls$
$\text{LAST } ((h:\alpha) :: (t:\alpha \text{ list})) = \text{if } t = ([]:\alpha \text{ list}) \text{ then } h \text{ else LAST } t$
$\forall(s:\alpha \rightarrow \text{bool}). s \subseteq (\emptyset:\alpha \rightarrow \text{bool}) \Leftrightarrow s = (\emptyset:\alpha \rightarrow \text{bool})$
$\text{SET_TO_LIST } \{(x:\alpha)\} = [x]$
$\forall(s:\alpha \rightarrow \text{bool})(t:\alpha \rightarrow \text{bool})(x:\alpha). (s \text{ DIFF } t) x \Leftrightarrow x \in s \wedge x \notin t$
$\forall(n:\text{num})(k:\text{num}). \text{SUM } (\text{REPLICATE } n k) = n * k$
$\forall(P:\alpha \rightarrow \text{bool}). \text{INFINITE } P \Rightarrow \exists(x:\alpha). x \in P$
$(n:\text{num}) \leq \text{tri } n$
$(\forall(x:\alpha)(y:\alpha). (R:\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) x y \Rightarrow R ((f:\alpha \rightarrow \alpha) x) (f y)) \Rightarrow \forall(x:\alpha)(y:\alpha). R^\diamond x y \Rightarrow R^\diamond (f x) (f y)$
$\forall(l:\alpha \text{ list})(f:\alpha \rightarrow \beta). \text{LENGTH } (\text{MAP } f l) = \text{LENGTH } l$
$\text{INJ } (f:\alpha \rightarrow \beta)(s:\alpha \rightarrow \text{bool})(t:\beta \rightarrow \text{bool}) \Rightarrow \forall(x:\alpha)(y:\beta). \text{LINV_OPT } f s y = \text{SOME } x \Leftrightarrow y = f x \wedge x \in s \wedge y \in t$
$\text{MAP } (\lambda((x:\alpha),(y:\beta),(z:\gamma)). x) (\text{fun } s:(\alpha \# \beta \# \gamma) \text{ list}) = \text{MAP } (\text{FST } :\alpha \# \beta \# \gamma \rightarrow \alpha) \text{ fun } s$
$\forall(l:(\alpha \# \beta) \text{ list}). \text{LENGTH } (\text{UNZIP_ SND } l) = \text{LENGTH } l$
$\text{Order } (R:\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) \Leftrightarrow \text{WeakOrder } (\text{RC } R)$
$\forall(l:\alpha \text{ list})(l':\alpha \text{ list})(b:\beta)(b':\beta)(f:\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \beta)(f':\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \beta). l = l' \wedge b = b' \wedge (\forall(x:\alpha)(a:\beta). \text{MEM } x l' \Rightarrow f x a = f' x a) \Rightarrow \text{FOLDR } f b l = \text{FOLDR } f' b' l'$
$\forall(f:\alpha \rightarrow \alpha)(s:\alpha \rightarrow \text{bool}). (x:\alpha) \in \text{schroeder_close } f s \Leftrightarrow \exists(n:\text{num}). x \in \text{FUNPOW } (\text{IMAGE } f) n s$
$\forall(R:\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool})(s:\alpha \rightarrow \text{bool})(t:\alpha \rightarrow \text{bool}). t \in \text{partition } R s \Rightarrow t \subseteq s$
$\forall(M:(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \alpha \rightarrow \beta)(R:\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool})(f:\alpha \rightarrow \beta). f = \text{WFREC } R M \Rightarrow \text{WF } R \Rightarrow \forall(x:\alpha). f x = M (\text{RESTRICT } f R x) x$
$\forall(n:\text{num}). \neg(n < (0:\text{num}))$
$\forall(S:\alpha \rightarrow \text{bool}). \text{FINITE } S \Rightarrow \forall(t:\beta \rightarrow \text{bool})(f:\alpha \rightarrow \beta). \text{BIJ } f S t \wedge \text{FINITE } t \Rightarrow \text{CARD } S = \text{CARD } t$
$((x:\alpha),(y:\beta)) \in \{(x,y) \mid (P:\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}) x y\} \Leftrightarrow P x y$
$\forall(ls:\alpha \text{ list})(f:\beta \rightarrow \alpha \# \alpha \rightarrow \beta)(e:\beta). \text{FOLDL } f e (\text{ZIP } (ls, ls)) = \text{FOLDL } (\lambda(x:\beta)(y:\alpha). f x (y, y)) e ls$
$\forall(t:\text{bool}). \neg\neg t \Leftrightarrow t$
$\forall(s:\alpha \rightarrow \text{bool})(t:\alpha \rightarrow \text{bool})(x:\alpha). (x \text{ INSERT } s) \text{ DIFF } t = \text{if } x \in t \text{ then } s \text{ DIFF } t \text{ else } x \text{ INSERT } s \text{ DIFF } t$
$\forall(\text{set}:\alpha \rightarrow \text{bool})(e:\alpha \rightarrow \text{bool}). \text{POW set } e \Leftrightarrow e \subseteq \text{set}$
$(\forall(x:\alpha)(y:\alpha). (R:\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) x y \Rightarrow (R':\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) x y) \Rightarrow R^\wedge = (x:\alpha)(y:\alpha) \Rightarrow R'^\wedge = x y$

$\text{nfst} (0 : \text{num}) = (0 : \text{num})$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}). s \cup s = s$
$(\forall(l : \alpha \text{ list}). \text{TAKE} (0 : \text{num}) l = ([] : \alpha \text{ list})) \wedge \forall(n : \text{num}) (x : \alpha) (l : \alpha \text{ list}). \text{TAKE} (\text{SUC } n) (x :: l) = x :: \text{TAKE } n \ l$
$\forall(l : \alpha \text{ list}). \text{NULL } l \Leftrightarrow l = ([] : \alpha \text{ list})$
$\forall(x : \alpha \rightarrow \text{bool}) (y : \beta \rightarrow \text{bool}). \text{FUNSET } x \ y = \text{DFUNSET } x (K \ y : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool})$
$\forall(A : \text{bool}). \neg A \wedge A \Leftrightarrow F$
$\forall(x : \alpha) (y : \beta). (\text{INL } x : \alpha + \beta) \neq (\text{INR } y : \alpha + \beta)$
$\forall(ls : \alpha \text{ list}) (n : \text{num}). \text{DROP } n \ ls = ([] : \alpha \text{ list}) \Leftrightarrow \text{LENGTH } ls \leq n$
$\text{DIV2} (\text{BIT1 } (x : \text{num})) = x$
$\forall(R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) (P : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}). (\forall(x : \alpha). P \ x \ x) \wedge (\forall(x : \alpha) (y : \alpha) (z : \alpha). R \ x \ y \wedge P \ y \ z \Rightarrow P \ x \ z) \Rightarrow \forall(x : \alpha) (y : \alpha). R^* \ x \ y \Rightarrow P \ x \ y$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (x : \alpha). x \ \text{INSERT} \ s = \{x\} \cup s$
$\text{BIJ} (f : \alpha \rightarrow \beta) \ \mathbb{U}(\alpha) \ \mathbb{U}(\beta) \Rightarrow \forall(x : \alpha) (y : \alpha). f \ x = f \ y \Leftrightarrow x = y$
$\forall(l : \alpha \text{ list}) (f : \alpha \rightarrow \beta). \text{MAP } f (TL \ l) = TL (\text{MAP } f \ l)$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (f : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \beta) (b : \beta). \text{FINITE } s \Rightarrow \text{ITSET } f \ s \ b = \text{if } s = (\emptyset : \alpha \rightarrow \text{bool}) \text{ then } b \text{ else ITSET } f (\text{REST } s) (f (\text{CHOICE } s) b)$
$\forall(x : \alpha) (l : \alpha \text{ list}). \text{ALL_DISTINCT } (\text{SNOC } x \ l) \Leftrightarrow \neg \text{MEM } x \ l \wedge \text{ALL_DISTINCT } l$
$\forall(p : \text{bool}) (q : \text{bool}) (m : \text{bool}). (\text{stmarker } m \vee p \Leftrightarrow p \vee \text{stmarker } m) \wedge (p \vee q \vee \text{stmarker } m \Leftrightarrow (p \vee q) \vee \text{stmarker } m) \wedge ((p \vee \text{stmarker } m) \vee q \Leftrightarrow (p \vee q) \vee \text{stmarker } m)$
$\forall(x : \alpha). \{x\} \neq (\emptyset : \alpha \rightarrow \text{bool})$
$S(f : \alpha \# \beta \rightarrow \delta \rightarrow \gamma) (\text{UNCURRY } (g : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \delta)) = \text{UNCURRY } (S((S : (\beta \rightarrow \delta \rightarrow \gamma) \rightarrow (\beta \rightarrow \delta) \rightarrow \beta \rightarrow \gamma) \circ (\$ \circ f : (\beta \rightarrow \alpha \# \beta) \rightarrow \beta \rightarrow \delta \rightarrow \gamma) \circ (\$, : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \alpha \# \beta)) g)$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}). s \ \text{DIFF} \ (\emptyset : \alpha \rightarrow \text{bool}) = s$
$\forall(x : \alpha) (s : \alpha \rightarrow \text{bool}). x \in s \Leftrightarrow x \ \text{INSERT} \ s = s$
$\forall(f : \alpha \rightarrow \beta) (P : \alpha \rightarrow \text{bool}) (Q : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}). \text{DFUNSET } P \ Q \ f \Leftrightarrow \forall(x : \alpha). x \in P \Rightarrow f \ x \in Q \ x$
$\forall(R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) (P : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}). (\forall(x : \alpha). P \ x \ x) \wedge (\forall(x : \alpha) (y : \alpha) (z : \alpha). R \ x \ y \wedge R^* \ y \ z \wedge P \ y \ z \Rightarrow P \ x \ z) \Rightarrow \forall(x : \alpha) (y : \alpha). R^* \ x \ y \Rightarrow P \ x \ y$
$\forall(f : \alpha \rightarrow \beta). (\forall(s : \beta \rightarrow \text{bool}). \text{SURJ } f (\emptyset : \alpha \rightarrow \text{bool}) s \Leftrightarrow s = (\emptyset : \beta \rightarrow \text{bool})) \wedge \forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{SURJ } f s (\emptyset : \beta \rightarrow \text{bool}) \Leftrightarrow s = (\emptyset : \alpha \rightarrow \text{bool})$
$\forall(P : \alpha \rightarrow \text{bool}) (f : \beta \rightarrow \alpha) (l : \beta \text{ list}). \text{EVERY } P (\text{MAP } f \ l) \Leftrightarrow \text{EVERY } (P \circ f) \ l$
$\forall(n1 : \text{num}) (n2 : \text{num}). (\text{ind_type\$INJN } n1 : \text{num} \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) = (\text{ind_type\$INJN } n2 : \text{num} \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) \Leftrightarrow n1 = n2$
$\forall(x : \alpha \text{ list}) (y : \alpha \text{ list}) (z : \alpha \text{ list}). y \leqslant x \wedge z \leqslant y \Rightarrow z \leqslant x$
$\forall(P : \alpha \rightarrow \text{bool}) (x : \alpha) (l : \alpha \text{ list}). \text{EVERY } P (\text{SNOC } x \ l) \Leftrightarrow \text{EVERY } P \ l \wedge P \ x$
$(\forall(x : \alpha) (y : \alpha). (R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) x \ y \Rightarrow (f : \alpha \rightarrow \beta) x = f \ y) \Rightarrow \forall(x : \alpha) (y : \alpha). \text{SC } R \ x \ y \Rightarrow f \ x = f \ y$
$\forall(R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) (f : \beta \rightarrow \alpha). \text{transitive } R \Rightarrow \text{transitive } (\text{inv_image } R \ f)$
$\forall(n : \text{num}) (l : \alpha \text{ list}). n < \text{LENGTH } l \Rightarrow \text{SEG} (1 : \text{num}) n \ l = [\text{EL } n \ l]$
$(\forall(a : \alpha \text{ list}) (c : \alpha \text{ list}). (d : \alpha \text{ list}) \neq a ++ [(b : \alpha)] ++ c) \Leftrightarrow \neg \text{MEM } b \ d$
$\forall(a : \alpha \text{ list}) (b : \alpha \text{ list}) (c : \alpha \text{ list}). a ++ b \leqslant a ++ c \Leftrightarrow b \leqslant c$
$\text{countable } \mathbb{U}(\alpha \# \beta) \Leftrightarrow \text{countable } \mathbb{U}(\alpha) \wedge \text{countable } \mathbb{U}(\beta)$
$\forall(l1 : \alpha \text{ list}) (l2 : \alpha \text{ list}) (e : \alpha). \text{FRONT} (l1 ++ e :: l2) = l1 ++ \text{FRONT} (e :: l2)$

$\forall(v:\alpha) (\text{rows_old}:(\alpha \rightarrow \beta \text{ option}) \text{ list}) (\text{rows_new}:(\alpha \rightarrow \beta \text{ option}) \text{ list}) (r:\alpha \rightarrow \beta \text{ option}).$
$\text{PMATCH } v \text{ rows_old} = \text{PMATCH } v \text{ rows_new} \Rightarrow \text{PMATCH } v \text{ (r::rows_old)} = \text{PMATCH } v \text{ (r::rows_new)}$
$\forall(R:\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) (Q:\alpha \rightarrow \text{bool}) (a:\alpha). Q a \wedge (\forall(y:\alpha) (z:\alpha). Q y \wedge R y z \Rightarrow Q z) \Rightarrow \forall(z:\alpha).$
$R^* a z \Rightarrow Q z$
$\forall(n:\text{num}) (l:\alpha \text{ list}). \text{LENGTH } (\text{DROP } n \text{ l}) = \text{LENGTH } l - n$
$(\forall(l1:\alpha \text{ list}) (l2:\alpha \text{ list}). ([]:\alpha \text{ list}) = l1 ++ l2 \Leftrightarrow l1 = ([]:\alpha \text{ list}) \wedge l2 = ([]:\alpha \text{ list})) \wedge \forall(l1:\alpha \text{ list})$
$(l2:\alpha \text{ list}), l1 ++ l2 = ([]:\alpha \text{ list}) \Leftrightarrow l1 = ([]:\alpha \text{ list}) \wedge l2 = ([]:\alpha \text{ list})$
$\forall(P:\alpha \text{ option} \rightarrow \text{bool}). P(\text{NONE}:\alpha \text{ option}) \wedge (\forall(a:\alpha). P(\text{SOME } a)) \Rightarrow \forall(x:\alpha \text{ option}). P x$
$\forall(R:\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{WF } R \Rightarrow \forall(P:\alpha \rightarrow \text{bool}). (\forall(x:\alpha). (\forall(y:\alpha). R y x \Rightarrow P y) \Rightarrow P x) \Rightarrow \forall(x:\alpha). P x$
$\forall(s:\alpha \rightarrow \text{bool}). \text{INFINITE } s \Rightarrow \text{INFINITE } (\text{REST } s)$
$\text{transitive } (R1:\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) \wedge \text{transitive } (R2:\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) \Rightarrow \text{transitive } (R1 \cap, R2)$
$\forall(l:\alpha \text{ list}) (m:\text{num}) (x:\alpha). \text{MEM } x (\text{TAKE } m \text{ l}) \Rightarrow \text{MEM } x \text{ l}$
$\forall(x:\alpha) (s:\alpha \rightarrow \text{bool}). x \notin s \Rightarrow \forall(t:\alpha \rightarrow \text{bool}). s \subseteq x \text{ INSERT } t \Leftrightarrow s \subseteq t$
$\forall(m:\text{num}) (n:\text{num}). m \leq n \Rightarrow \text{count } m \subseteq \text{count } n$
$\forall(R:\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) (f:\beta \rightarrow \alpha). \text{reflexive } R \Rightarrow \text{reflexive } (\text{inv_image } R f)$
$\forall(R:\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) (P:\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}). (\forall(x:\alpha) (y:\alpha). R x y \Rightarrow P x y) \wedge (\forall(x:\alpha) (y:\alpha) (z:\alpha). P x y \wedge P y z \Rightarrow P x z) \Rightarrow \forall(u:\alpha) (v:\alpha). R^+ u v \Rightarrow P u v$
$\text{LIST_BIND } [(x:\beta)] (f:\beta \rightarrow \alpha \text{ list}) = f x$
$(\forall(x:\alpha) (y:\alpha). (R:\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) x y \Rightarrow (Q:\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) x y) \Rightarrow R^+ (x:\alpha) (y:\alpha) \Rightarrow Q^+ x y$
$\forall(X:\alpha \rightarrow \text{bool}) (P:(\alpha \rightarrow \text{bool}) \rightarrow \text{bool}). X \subseteq \text{BIGINTER } P \Leftrightarrow \forall(Y:\alpha \rightarrow \text{bool}). Y \in P \Rightarrow X \subseteq Y$
$\forall(P:\alpha \rightarrow \text{bool}) (Q:\beta \rightarrow \text{bool}) (x:\alpha \# \beta). x \in P \times Q \Leftrightarrow \text{FST } x \in P \wedge \text{SND } x \in Q$
$\forall(f:\alpha \rightarrow \beta) (x:\alpha) (s:\alpha \rightarrow \text{bool}) (t:\beta \rightarrow \text{bool}). \text{INJ } f (x \text{ INSERT } s) t \Leftrightarrow \text{INJ } f s t \wedge f x \in t \wedge \forall(y:\alpha). y \in s \wedge f x = f y \Rightarrow x = y$
$\text{FINITE } (s:\alpha \rightarrow \text{bool}) \wedge \text{FINITE } (t:\alpha \rightarrow \text{bool}) \Rightarrow \text{CARD } (s \cup t) \leq \text{CARD } s + \text{CARD } t$
$\forall(l:\alpha \text{ list}) (f:\alpha \rightarrow \beta). l \neq ([]:\alpha \text{ list}) \Rightarrow \text{LAST } (\text{MAP } f l) = f (\text{LAST } l)$
$\forall(m:\text{num}). m < \text{SUC } m \wedge m < \text{SUC } (\text{SUC } m)$
$\forall(s:\alpha \rightarrow \text{bool}). \neg(s \subset s)$
$\forall(l1:\alpha \text{ list}) (n:\text{num}). \text{LENGTH } l1 \leq n \Rightarrow \forall(l2:\alpha \text{ list}). \text{EL } n (l1 ++ l2) = \text{EL } (n - \text{LENGTH } l1) l2$
$\text{LINV_OPT } (f:\alpha \rightarrow \beta) (s:\alpha \rightarrow \text{bool}) (y:\beta) = \text{SOME } (x:\alpha) \Rightarrow x \in s \wedge f x = y$
$\forall(P:\alpha \rightarrow \text{bool}) (l:\alpha \text{ list}). \text{EVERY } P (\text{REVERSE } l) \Leftrightarrow \text{EVERY } P l$
$\forall(x:\alpha) (s:\alpha \rightarrow \text{bool}) (t:\alpha \rightarrow \text{bool}). \text{DISJOINT } (x \text{ INSERT } s) t \Leftrightarrow \text{DISJOINT } s t \wedge x \notin t$
$\forall(l:\text{num list}). \text{SUM } (\text{REVERSE } l) = \text{SUM } l$
$\mathbb{U}(:\alpha \# \beta) = \mathbb{U}(:\alpha) \times \mathbb{U}(:\beta)$
$\forall(ll:\alpha \text{ list}). ll = ([]:\alpha \text{ list}) \vee \exists(x:\alpha) (l:\alpha \text{ list}). ll = \text{SNOC } x l$
$\forall(P:\alpha + \beta \rightarrow \text{bool}). (\exists(s:\alpha + \beta). P s) \Leftrightarrow (\exists(x:\alpha). P (\text{INL } x:\alpha + \beta)) \vee \exists(y:\beta). P (\text{INR } y:\alpha + \beta)$
$\forall(R:\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{reflexive } R \Rightarrow \text{reflexive } R^+$
$\forall(p:\text{bool}) (q:\text{bool}) (m:\text{bool}). (p \vee \text{stmarker } m \Leftrightarrow \text{stmarker } m \vee p) \wedge ((\text{stmarker } m \vee p) \vee q \Leftrightarrow \text{stmarker } m \vee p \vee q) \wedge (p \vee \text{stmarker } m \vee q \Leftrightarrow \text{stmarker } m \vee p \vee q)$
$\forall(l1:\alpha \text{ list}) (l2:\alpha \text{ list}) (f:\alpha \rightarrow \beta) (f':\alpha \rightarrow \beta). l1 = l2 \wedge (\forall(x:\alpha). \text{MEM } x l2 \Rightarrow f x = f' x) \Rightarrow \text{MAP } f l1 = \text{MAP } f' l2$
$(\forall(x:\alpha) (y:\alpha). (R:\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) x y \Rightarrow (Q:\beta \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}) ((f:\alpha \rightarrow \beta) x) (f y)) \wedge \text{reflexive } Q \wedge \text{transitive } Q \Rightarrow \forall(x:\alpha) (y:\alpha). R^* x y \Rightarrow Q (f x) (f y)$

$\forall(s:\alpha \rightarrow \text{bool})(t:\alpha \rightarrow \text{bool})(u:\alpha \rightarrow \text{bool}). s \subseteq t \wedge t \subseteq u \Rightarrow s \subseteq u$
$\forall(p:\alpha \# \beta)(q:\alpha \# \beta). p = q \Leftrightarrow \text{FST } p = \text{FST } q \wedge \text{SND } p = \text{SND } q$
$\forall(n:\text{num}). \text{EL } n(l:\alpha \text{ list}) = \text{if } n = (0:\text{num}) \text{ then HD } l \text{ else EL } (\text{PRE } n)(\text{TL } l)$
$\forall(s:\alpha \rightarrow \text{bool})(t:\alpha \rightarrow \text{bool})(x:\alpha). x \in s \cup t \Leftrightarrow x \in s \vee x \in t$
$\forall(l1:\text{num list})(l2:\text{num list}). \text{SUM } (l1 ++ l2) = \text{SUM } l1 + \text{SUM } l2$
$\forall(M:\alpha + \beta)(M':\alpha + \beta)(f:\alpha \rightarrow \gamma)(f1:\beta \rightarrow \gamma). M = M' \wedge (\forall(x:\alpha). M' = (\text{INL } x:\alpha + \beta) \Rightarrow f x = (f' : \alpha \rightarrow \gamma) x) \wedge (\forall(y:\beta). M' = (\text{INR } y:\alpha + \beta) \Rightarrow f1 y = (f1' : \beta \rightarrow \gamma) y) \Rightarrow (\text{sum_CASE } M f f1 : \gamma) = (\text{sum_CASE } M' f' f1' : \gamma)$
$\text{REVERSE } (l:\alpha \text{ list}) = ([]:\alpha \text{ list}) \Leftrightarrow l = ([]:\alpha \text{ list})$
$\forall(l:\alpha \text{ list}). \text{FOLDR } (\text{CONS } :\alpha \rightarrow \alpha \text{ list} \rightarrow \alpha \text{ list})([]:\alpha \text{ list}) l = l$
$\forall(f:\alpha \rightarrow \beta)(x:\alpha)(s:\alpha \rightarrow \text{bool}). x \notin s \Rightarrow \text{IMAGE } f(s \text{ DELETE } x) = \text{IMAGE } f s$
$\forall(c:\text{bool})(x:\text{bool}). (\text{if } c \text{ then } F \text{ else } x) \Leftrightarrow \neg c \wedge x$
$\text{OPTION_CHOICE } (m1:\alpha \text{ option})(\text{NONE } :\alpha \text{ option}) = m1$
$(\forall(x:\alpha)(y:\alpha). (R:\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) x y \Rightarrow (f:\alpha \rightarrow \beta) x = f y) \Rightarrow \forall(x:\alpha)(y:\alpha). \text{RC } R x y \Rightarrow f x = f y$
$\forall(c:\text{bool})(l:\alpha \text{ list}). \text{EXISTS } (\lambda(x:\alpha). c) l \Leftrightarrow l \neq ([]:\alpha \text{ list}) \wedge c$
$\forall(x:\alpha \text{ list})(y:\alpha \text{ list}). x \leqslant y \wedge \text{LENGTH } x = \text{LENGTH } y \Leftrightarrow x = y$
$((\text{SOME } (f:\beta \rightarrow \alpha) <*> \text{SOME } (x:\beta)):\alpha \text{ option}) = \text{SOME } (f x)$
$\forall(l:\alpha \text{ list}). \text{LENGTH } l = (0:\text{num}) \Leftrightarrow l = ([]:\alpha \text{ list})$
$(R:\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) \text{ equiv_on } (s:\alpha \rightarrow \text{bool}) \Rightarrow \forall(t1:\alpha \rightarrow \text{bool})(t2:\alpha \rightarrow \text{bool}). t1 \in \text{partition } R s \wedge t2 \in \text{partition } R s \wedge t1 \neq t2 \Rightarrow \text{DISJOINT } t1 t2$
$\forall(L:\alpha \text{ list}). \text{LENGTH } L = \text{LEN } L(0:\text{num})$
$\forall(R:\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool})(x:\alpha)(z:\alpha). R^+ x z \Rightarrow R x z \vee \exists(y:\alpha). R x y \wedge R^+ y z$
$\forall(l1:\alpha \text{ list})(l2:\alpha \text{ list}). \text{REVERSE } (l1 ++ l2) = \text{REVERSE } l2 ++ \text{REVERSE } l1$
$\text{total } (R1:\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) \wedge \text{total } (R2:\beta \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}) \Rightarrow \text{total } (R1 \text{ LEX } R2)$
$(\forall(y:\alpha)(x:\alpha). (\text{INL } x:\alpha + \beta) = (\text{INL } y:\alpha + \beta) \Leftrightarrow x = y) \wedge \forall(y:\beta)(x:\beta). (\text{INR } x:\alpha + \beta) = (\text{INR } y:\alpha + \beta) \Leftrightarrow x = y$
$\forall(s:\alpha \rightarrow \text{bool}). \text{POW } s \neq (\emptyset:(\alpha \rightarrow \text{bool}) \rightarrow \text{bool})$
$\forall(l:\alpha \text{ list}). l \neq ([]:\alpha \text{ list}) \Rightarrow \text{EL } (\text{PRE } (\text{LENGTH } l)) l = \text{LAST } l$
$\forall(x:\alpha \rightarrow \text{bool})(y:\alpha \rightarrow \text{bool}). x \cup y \text{ DIFF } x = y \text{ DIFF } x \wedge x \cup y \text{ DIFF } y = x \text{ DIFF } y$
$\forall(P:\alpha \rightarrow \text{bool})(Q:\beta \rightarrow \text{bool})(x:\alpha \# \beta). (P \times Q) x \Leftrightarrow \text{FST } x \in P \wedge \text{SND } x \in Q$
$\forall(n:\text{num}). \text{SUC } n \neq n$
$\forall(x:\alpha). x \notin (\emptyset:\alpha \rightarrow \text{bool})$
$(\forall(m:\text{num}). m < (n:\text{num}) \Rightarrow (f1:\text{num} \rightarrow \alpha) m = (f2:\text{num} \rightarrow \alpha) m) \Rightarrow \text{GENLIST } f1 n = \text{GENLIST } f2 n$
$\forall(f:\alpha \rightarrow \beta)(l1:\alpha \text{ list})(l2:\alpha \text{ list}). \text{INJ } f(\text{set } l1 \cup \text{set } l2) \mathbb{U}(:\beta) \Rightarrow (\text{MAP } f l1 = \text{MAP } f l2 \Leftrightarrow l1 = l2)$
$\forall(R:\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool})(x:\alpha). (\forall(y:\alpha). R y x \Rightarrow \text{WFP } R y) \Rightarrow \text{WFP } R x$
$\forall(l2:\alpha \text{ list})(l1:\alpha \text{ list}). \text{LASTN } (\text{LENGTH } l2)(l1 ++ l2) = l2$
$\forall(l:\alpha \text{ list}). (0:\text{num}) < \text{LENGTH } l \Rightarrow \text{LENGTH } (\text{TL } l) = \text{LENGTH } l - (1:\text{num})$
$\forall(s:\alpha \rightarrow \text{bool})(t:\beta \rightarrow \text{bool})(f:\alpha \rightarrow \beta). \text{BIJ } f s t \Rightarrow \forall(e:\alpha). e \in s \Rightarrow \text{BIJ } f(s \text{ DELETE } e)(t \text{ DELETE } f e)$
$\forall(n:\text{num})(x:\alpha). \text{LENGTH } (\text{REPLICATE } n x) = n$
$\text{IMAGE } (l:\alpha \rightarrow \alpha)(s:\alpha \rightarrow \text{bool}) = s$

antisymmetric (\$RSUBSET :($\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}$) \rightarrow ($\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}$) \rightarrow bool)
$\forall(l : \alpha \text{ list}). \text{LASTN}(\text{LENGTH } l)l = l$
$\forall(R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{equivalence } R \Leftrightarrow \forall(x : \alpha)(y : \alpha). R x y \Leftrightarrow R x = R y$
$\forall(l : \alpha \text{ list})(x : \alpha). \text{ELL}(\text{LENGTH } l)(\text{SNOCK } x \mid l) = \text{if } \text{NULL } l \text{ then } x \text{ else } \text{HD } l$
$\forall(l : \alpha \text{ list})(m : \text{num})(P : \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{EXISTS } P(\text{DROP } m \mid l) \Rightarrow \text{EXISTS } P \mid l$
$\forall(m : \text{num})(n : \text{num}). (\lambda(x : \text{num})(y : \text{num}). y = \text{SUC } x)^+ m (\text{SUC } n) \Leftrightarrow (\lambda(x : \text{num})(y : \text{num}). y = \text{SUC } x)^* m n$
$\forall(P : \gamma \rightarrow \delta)(M : \alpha \# \beta)(N : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \gamma). P(\text{let } ((x : \alpha), (y : \beta)) = M \text{ in } N x y) = (\text{let } ((x : \alpha), (y : \beta)) = M \text{ in } P(N x y))$
$\forall(R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{rcdiamond } R \Leftrightarrow \text{diamond } (\text{RC } R)$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}). \neg(\mathbb{U}(:\alpha) \subset s)$
$\forall(l : (\alpha \# \beta) \text{ list}). \text{ZIP } (\text{UNZIP } l) = l$
$\forall(P : \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{BIGINTER } \{P\} = P$
$\forall(M : 'a1 \# 'a2)(N : 'a1 \rightarrow 'a2 \rightarrow \beta \rightarrow \gamma)(b : \beta). (\text{let } ((x : 'a1), (y : 'a2)) = M \text{ in } N x y) b = (\text{let } ((x : 'a1), (y : 'a2)) = M \text{ in } N x y b)$
$(\forall(x : \alpha). x \in (s : \alpha \rightarrow \text{bool}) \Rightarrow (\text{INR } x : \beta + \alpha) \in (t : \beta + \alpha \rightarrow \text{bool})) \Rightarrow \text{INJ } (\text{INR } : \alpha \rightarrow \beta + \alpha) s t$
$\forall(n : \text{num})(m : \text{num}). n < m \Rightarrow \text{tri } n < \text{tri } m$
$\forall(m : \text{num})(n : \text{num}). \text{SUC } m < n \Rightarrow m < n$
transitive ($R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}$) $\wedge=$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool})(t : \alpha \rightarrow \text{bool}). s = t \Rightarrow s \subseteq t \wedge t \subseteq s$
$\forall(l : \alpha \text{ list})(n : \text{num}). n < \text{LENGTH } (\text{FRONT } l) \wedge \neg \text{NULL } l \Rightarrow \text{EL } n (\text{FRONT } l) = \text{EL } n \mid l$
$(s0 : \alpha \rightarrow \text{bool}) \subseteq (s : \alpha \rightarrow \text{bool}) \wedge \text{INJ } (f : \alpha \rightarrow \beta) s (t : \beta \rightarrow \text{bool}) \Rightarrow \text{BIJ } f s0 (\text{IMAGE } f s0)$
$\forall(n : \text{num}). \text{LENGTH } (l1 : \alpha \text{ list}) < n \Rightarrow \text{TAKE } n (l1 ++ (l2 : \alpha \text{ list})) = l1 ++ \text{TAKE } (n - \text{LENGTH } l1) l2$
$\forall(x : \alpha + \beta). \text{ISL } x \Rightarrow (\text{INL } (\text{OUTL } x) : \alpha + \beta) = x$
$\forall(s : \text{num} \rightarrow \text{bool}). \text{FINITE } s \Rightarrow \forall(e : \text{num}). \text{SUM_SET } (s \text{ DELETE } e) = \text{if } e \in s \text{ then } \text{SUM_SET } s - e \text{ else } \text{SUM_SET } s$
$\forall(f : \alpha \rightarrow \beta). \text{IMAGE } f (\emptyset : \alpha \rightarrow \text{bool}) = (\emptyset : \beta \rightarrow \text{bool})$
$\forall(m : \text{num})(n : \text{num}). n \leq n \otimes m$
$\forall(l : \alpha \text{ list})(x : \alpha). \text{MEM } x (\text{TL } l) \Rightarrow \text{MEM } x \mid l$
$\forall(R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool})(s : \alpha \rightarrow \text{bool})(t : \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{pairwise } R t \wedge s \subseteq t \Rightarrow \text{pairwise } R s$
$\neg\neg(p : \text{bool}) \Rightarrow p$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}). (\emptyset : \alpha \rightarrow \text{bool}) \in \text{POW } s$
$\forall(l : \alpha \text{ list}). \neg \text{NULL } l \Rightarrow \text{HD } l :: \text{TL } l = l$
$\forall(x : \alpha)(y : \alpha \text{ list}). \text{FRONT } (x :: y) \leqslant x :: y$
$\$! (\text{UNCURRY } (f : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool})) \Leftrightarrow \$! ((\$! : (\beta \rightarrow \text{bool}) \rightarrow \text{bool}) \circ f)$
$\forall(n : \text{num})(l : \alpha \text{ list}). n \leq \text{LENGTH } l \Rightarrow \forall(x : \alpha). \text{LASTN } n (x :: l) = \text{LASTN } n \mid l$
$\forall(x : \alpha). \text{SOME } x \neq (\text{NONE} : \alpha \text{ option})$
$\forall(R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{symmetric } (\text{SC } R)$
$\forall(l1 : \alpha \text{ list})(l1' : \alpha \text{ list})(l2 : \beta \text{ list})(l2' : \beta \text{ list})(P : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool})(P' : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}). l1 = l1' \wedge l2 = l2' \wedge (\forall(x : \alpha)(y : \beta). \text{MEM } x \mid l1' \wedge \text{MEM } y \mid l2' \Rightarrow (P x y \Leftrightarrow P' x y)) \Rightarrow (\text{LIST_REL } P \mid l1 \mid l2 \Leftrightarrow \text{LIST_REL } P' \mid l1' \mid l2')$
$\forall(p : \alpha \# \beta)(f : \alpha \rightarrow \gamma)(g : \beta \rightarrow \delta). \text{SND } ((f \# g) p) = g (\text{SND } p)$

$\text{ind_type\$ISO } (f : \alpha \rightarrow \gamma) (f' : \gamma \rightarrow \alpha) \wedge \text{ind_type\$ISO } (g : \beta \rightarrow \delta) (g' : \delta \rightarrow \beta) \Rightarrow \text{ind_type\$ISO } (\lambda(h : \alpha \rightarrow \beta) (a' : \gamma). g(h(f'a'))) (\lambda(h : \gamma \rightarrow \delta) (a : \alpha). g'(h(f a)))$
$\forall(R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{symmetric } R \Rightarrow R^T = R$
$\forall(l1 : \alpha \text{ list}) (n : \text{num}). \text{LENGTH } l1 \leq n \Rightarrow \forall(l2 : \alpha \text{ list}). \text{DROP } n (l1 ++ l2) = \text{DROP } (n - \text{LENGTH } l1) l2$
$\forall(n : \text{num}) (l1 : \alpha \text{ list}). n \leq \text{LENGTH } l1 \Rightarrow \forall(l2 : \alpha \text{ list}). \text{TAKE } n (l1 ++ l2) = \text{TAKE } n l1$
$\forall(l1 : \alpha \text{ list}) (l2 : \alpha \text{ list}). \text{LENGTH } (l1 ++ l2) = \text{LENGTH } l1 + \text{LENGTH } l2$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \alpha \rightarrow \text{bool}). s \subseteq t \Leftrightarrow \forall(x : \alpha). s x \Rightarrow t x$
$\forall(P : \alpha \rightarrow \text{bool}) (l : \alpha \text{ list}). \text{EVERY } P l \Leftrightarrow \text{FOLDL } \$/\backslash T (\text{MAP } P l)$
$\forall(l1 : \alpha \text{ list}) (l2 : \alpha \text{ list}). \text{DROP } (\text{LENGTH } l1) (l1 ++ l2) = l2$
$\forall(f : 'z \rightarrow 'z). \text{INVOL } f \Leftrightarrow \forall(x : 'z). f(f x) = x$
$\forall(R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{antisymmetric } R^T \Leftrightarrow \text{antisymmetric } R$
$\forall(P : \alpha \rightarrow \text{bool}). P \times (\emptyset : \beta \rightarrow \text{bool}) = (\emptyset : \alpha \# \beta \rightarrow \text{bool}) \wedge (\emptyset : \gamma \rightarrow \text{bool}) \times P = (\emptyset : \gamma \# \alpha \rightarrow \text{bool})$
$\forall(P : \alpha \rightarrow \text{bool}) (l : \alpha \text{ list}). \text{EVERY } P l \Leftrightarrow \text{FOLDL } (\lambda(x : \alpha) (l' : \text{bool}). P x \wedge l') T l$
$\neg \text{NULL } (l2 : \alpha \text{ list}) \wedge (n : \text{num}) = \text{LENGTH } (l1 : \alpha \text{ list}) \Rightarrow \text{EL } n (l1 ++ l2) = \text{HD } l2$
$(r1 : \alpha) = (r2 : \alpha) \Rightarrow (\text{Abbrev } ((v : \alpha) = r1) \Leftrightarrow \text{Abbrev } (v = r2))$
$\text{MAP2 } (f : \beta \rightarrow \gamma \rightarrow \alpha) (x : \beta \text{ list}) ([] : \gamma \text{ list}) = ([] : \alpha \text{ list})$
$\forall(c : \alpha \text{ list}) (a : \alpha \text{ list}). a \leqslant a ++ c$
$\forall(P : \alpha \rightarrow \text{bool}) (Q : \alpha \rightarrow \text{bool}) (l : \alpha \text{ list}). (\text{EXISTS } (\lambda(x : \alpha). P x \vee Q x) l \Leftrightarrow \text{EXISTS } P l) \vee \text{EXISTS } Q l$
$\forall(x : \alpha \text{ option}). \neg \text{IS_SOME } x \Leftrightarrow x = (\text{NONE} : \alpha \text{ option})$
$\text{OPTION_MAP2 } (f : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \gamma) (o1 : \alpha \text{ option}) (o2 : \beta \text{ option}) = (\text{NONE} : \gamma \text{ option}) \Leftrightarrow o1 = (\text{NONE} : \alpha \text{ option}) \vee o2 = (\text{NONE} : \beta \text{ option})$
$\forall(l1 : \alpha \text{ list}) (l2 : \alpha \text{ list}). \text{REVERSE } l1 = l2 \Leftrightarrow l1 = \text{REVERSE } l2$
$\forall(s : \text{num} \rightarrow \text{bool}). \text{countable } s$
$\forall(P : \alpha \rightarrow \text{bool}) (l : \alpha \text{ list}). \text{EXISTS } P l \Leftrightarrow \exists(e : \alpha). \text{MEM } e l \wedge P e$
$\forall(x : \alpha) (l : \alpha \text{ list}). \text{MEM } x l \Leftrightarrow \text{FOLDL } \$\vee F (\text{MAP } (\$= x) l)$
$\text{symmetric } (R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) \Leftrightarrow R^T \subseteq_r R$
$\text{OPTION_IGNORE_BIND } (\text{NONE} : \beta \text{ option}) (m : \alpha \text{ option}) = (\text{NONE} : \alpha \text{ option}) \wedge \text{OPTION_IGNORE_BIND } (\text{SOME } (v : \gamma)) m = m$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \alpha \rightarrow \text{bool}). s \cap t = t \cap s$
$\forall(p : \text{bool}) (q : \text{bool}) (m : \text{bool}). (p \wedge \text{stmarker } m \Leftrightarrow \text{stmarker } m \wedge p) \wedge ((\text{stmarker } m \wedge p) \wedge q \Leftrightarrow \text{stmarker } m \wedge p \wedge q) \wedge (p \wedge \text{stmarker } m \wedge q \Leftrightarrow \text{stmarker } m \wedge p \wedge q)$
$\forall(x : \alpha) (l : \alpha \text{ list}). \text{SNOC } x l = \text{REVERSE } (x :: \text{REVERSE } l)$
$\text{SURJ } (f : \alpha \rightarrow \beta) (s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (\text{IMAGE } f s)$
$\text{PMATCH_ROW } (p : \beta \rightarrow \gamma) (g : \beta \rightarrow \text{bool}) (r : \beta \rightarrow \alpha) (i : \gamma) = \text{SOME } (y : \alpha) \Rightarrow \exists(x : \beta).$
$\text{PMATCH_ROW_COND } p g i x \wedge y = r x$
$\forall(x : \alpha) (\text{sos} : (\alpha \rightarrow \text{bool}) \rightarrow \text{bool}). \text{BIGUNION } \text{sos } x \Leftrightarrow \exists(s : \alpha \rightarrow \text{bool}). x \in s \wedge s \in \text{sos}$
$(\forall(p : \alpha \# \beta). (P : \alpha \# \beta \rightarrow \text{bool}) p) \Leftrightarrow \forall(p_1 : \alpha) (p_2 : \beta). P(p_1, p_2)$
$\forall(f : \alpha \rightarrow \beta) (s : \beta \rightarrow \text{bool}) (t : \beta \rightarrow \text{bool}). \text{PREIMAGE } f (s \cap t) = \text{PREIMAGE } f s \cap \text{PREIMAGE } f t$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}). (\exists(x : \alpha). x \in s) \Leftrightarrow s \neq (\emptyset : \alpha \rightarrow \text{bool})$
$(\text{diag } (A : \alpha \rightarrow \text{bool}))^T = \text{diag } A$
$\forall(f : \alpha \rightarrow \text{bool}) (n : \text{num}) (x : \alpha). \text{EVERY } f (\text{REPLICATE } n x) \Leftrightarrow n = (0 : \text{num}) \vee f x$

$\{x \mid x = (y : \alpha)\} = \{y\}$
transitive (\$PSUBSET : (\alpha \rightarrow \text{bool}) \rightarrow (\alpha \rightarrow \text{bool}) \rightarrow \text{bool})
$\forall(f : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \gamma). \text{CURRY } (\text{UNCURRY } f) = f$
$\forall(e : \alpha) (\forall(l1 : \alpha \text{ list}) (\forall(l2 : \alpha \text{ list}). \text{MEM } e (l1 ++ l2) \Leftrightarrow \text{MEM } e l1 \vee \text{MEM } e l2))$
$\forall(x : \alpha \text{ list}) (y : \alpha \text{ list}). x \leqslant y \wedge y \leqslant x \Rightarrow x = y$
$\forall(P : \alpha \rightarrow \text{bool}) (\forall(L : \alpha \text{ list}) (\forall(M : \alpha \text{ list}). \text{FILTER } P (L ++ M) = \text{FILTER } P L ++ \text{FILTER } P M))$
$(\forall(x : \alpha) (y : \alpha). (R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) x y \Rightarrow (Q : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) x y) \Rightarrow \text{SC } R (x : \alpha) (y : \alpha) \Rightarrow \text{SC } Q x y$
$\forall(P : \alpha \rightarrow \text{bool}) (\forall(l : \alpha \text{ list}). \neg \text{EXISTS } P l \Leftrightarrow \text{EVERY } (\neg \circ P) l)$
$\forall(x : \text{bool}) (x' : \text{bool}) (y : \text{bool}) (y' : \text{bool}). (x \Rightarrow x') \wedge (x' \Rightarrow y' \Rightarrow y) \Rightarrow (x' \Rightarrow y') \Rightarrow x \Rightarrow y$
$\forall(l : \alpha \text{ list}) (e : \alpha) (y : \alpha). \text{MEM } y (\text{FRONT } (e :: l)) \Rightarrow \text{MEM } y (e :: l)$
$(\forall(l1 : \alpha \text{ list}) (l2 : \alpha \text{ list}). l1 ++ l2 = l1 \Leftrightarrow l2 = ([] : \alpha \text{ list})) \wedge (\forall(l1 : \alpha \text{ list}) (l2 : \alpha \text{ list}). l1 ++ l2 = l2 \Leftrightarrow l1 = ([] : \alpha \text{ list})) \wedge (\forall(l1 : \alpha \text{ list}) (l2 : \alpha \text{ list}). l1 = l1 ++ l2 \Leftrightarrow l2 = ([] : \alpha \text{ list})) \wedge \forall(l1 : \alpha \text{ list}) (l2 : \alpha \text{ list}). l2 = l1 ++ l2 \Leftrightarrow l1 = ([] : \alpha \text{ list})$
$\forall(x : \alpha). \text{ALL_DISTINCT } [x]$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{FINITE } s \Rightarrow \forall(x : \alpha). \text{CARD } (x \text{ INSERT } s) = \text{if } x \in s \text{ then } \text{CARD } s \text{ else } \text{SUC } (\text{CARD } s)$
$\forall(m : \text{num}) (n : \text{num}). m \leq n \otimes m$
$\forall(l : \alpha \text{ list}) (\forall(l1 : \alpha \text{ list}) (\forall(l2 : \alpha \text{ list}). l1 \leqslant l \wedge l2 \leqslant l \Rightarrow l1 \leqslant l2 \vee l2 \leqslant l1))$
$\forall(A : \text{bool}). A \Rightarrow \neg A \Rightarrow F$
$\forall(f : \alpha \rightarrow \beta) (\forall(l : \alpha \text{ list}). \text{set } (\text{MAP } f l) = \text{IMAGE } f (\text{set } l))$
$\forall(x : \alpha) (s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \alpha \rightarrow \text{bool}). (x \text{ INSERT } s) \cap t = \text{if } x \in t \text{ then } x \text{ INSERT } s \cap t \text{ else } s \cap t$
$\forall(ls : \alpha \text{ list}) (n : \text{num}). n < \text{LENGTH } ls \Rightarrow \text{TAKE } (n + (1 : \text{num})) ls = \text{SNOC } (\text{EL } n ls) (\text{TAKE } n ls)$
$\text{OPTION_MAP2 } (f : \beta \rightarrow \gamma \rightarrow \alpha) (\text{SOME } (x : \beta)) (\text{SOME } (y : \gamma)) = \text{SOME } (f x y) \wedge \text{OPTION_MAP2 } f (\text{SOME } x) (\text{NONE } : \gamma \text{ option}) = (\text{NONE } : \alpha \text{ option}) \wedge \text{OPTION_MAP2 } f (\text{NONE } : \beta \text{ option}) (\text{SOME } y) = (\text{NONE } : \alpha \text{ option}) \wedge \text{OPTION_MAP2 } f (\text{NONE } : \beta \text{ option}) (\text{NONE } : \gamma \text{ option}) = (\text{NONE } : \alpha \text{ option})$
$\forall(R1 : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) (R2 : \beta \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}) (v1 : \alpha \# \beta) (v2 : \alpha \# \beta) (R1' : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) (R2' : \beta \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}) (v1' : \alpha \# \beta) (v2' : \alpha \# \beta). v1 = v1' \wedge v2 = v2' \wedge (\forall(a : \alpha) (b : \beta) (c : \alpha) (d : \beta). v1' = (a, b) \wedge v2' = (c, d) \Rightarrow (R1 a c \Leftrightarrow R1' a c)) \wedge (\forall(a : \alpha) (b : \beta) (c : \alpha) (d : \beta). v1' = (a, b) \wedge v2' = (c, d) \wedge a = c \Rightarrow (R2 b d \Leftrightarrow R2' b d)) \Rightarrow ((R1 \text{ LEX } R2) v1 v2 \Leftrightarrow (R1' \text{ LEX } R2') v1' v2')$
$\forall(f : \alpha \rightarrow \beta) (R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) (D : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}) (P : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}) (M : (\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \alpha \rightarrow \beta) (x : \alpha). f = \text{WFREC } R M \wedge \text{WF } R \wedge \text{INDUCTIVE_INVARIANT_ON } R D P M \wedge D x \Rightarrow P x (f x)$
$\forall(x : \text{bool}) (y : \alpha \rightarrow \text{bool}). (K x : \alpha \rightarrow \text{bool}) \subseteq y \Leftrightarrow \neg x \vee \text{U}(: \alpha) \subseteq y$
$(\text{OPTREL } (R : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}) (\text{SOME } (x : \alpha)) (\text{NONE } : \beta \text{ option}) \Leftrightarrow F) \wedge (\text{OPTREL } R (\text{NONE } : \alpha \text{ option}) (\text{SOME } (y : \beta)) \Leftrightarrow F) \wedge (\text{OPTREL } R (\text{NONE } : \alpha \text{ option}) (\text{NONE } : \beta \text{ option}) \Leftrightarrow T) \wedge (\text{OPTREL } R (\text{SOME } x) (\text{SOME } y) \Leftrightarrow R x y)$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{SING } s \Rightarrow \text{FINITE } s$
$\forall(s : \alpha + \beta) (s' : \alpha + \beta) (P : \alpha \rightarrow \text{bool}) (P' : \alpha \rightarrow \text{bool}) (Q : \beta \rightarrow \text{bool}) (Q' : \beta \rightarrow \text{bool}). s = s' \wedge (\forall(a : \alpha). s' = (\text{INL } a : \alpha + \beta) \Rightarrow (P a \Leftrightarrow P' a)) \wedge (\forall(b : \beta). s' = (\text{INR } b : \alpha + \beta) \Rightarrow (Q b \Leftrightarrow Q' b)) \Rightarrow (\text{SUM_ALL } P Q s \Leftrightarrow \text{SUM_ALL } P' Q' s')$
$\forall(f : \alpha \rightarrow \beta) (M : (\alpha \rightarrow \text{bool}) \rightarrow \text{bool}). \text{IMAGE } f (\text{BIGUNION } M) = \text{BIGUNION } (\text{IMAGE } (\text{IMAGE } f) M)$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \alpha \rightarrow \text{bool}) (x : \alpha). s \text{ DIFF } (x \text{ INSERT } t) = s \text{ DELETE } x \text{ DIFF } t$

$\forall(v:\alpha)(p:\beta \rightarrow \alpha)(g:\beta \rightarrow \text{bool}). (\forall(x:\beta).\neg g x) \Rightarrow (\text{PMATCH_ROW_COND_EX } v p g \Leftrightarrow F)$
$(\forall(x:\alpha)(y:\alpha). (f:\alpha \rightarrow \beta) x = f y \Leftrightarrow x = y) \Rightarrow (\text{IMAGE } f (s1:\alpha \rightarrow \text{bool}) = \text{IMAGE } f (s2:\alpha \rightarrow \text{bool}) \Leftrightarrow s1 = s2)$
$\forall(R:\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{transitive } R^T \Leftrightarrow \text{transitive } R$
$\forall(t:\text{bool}). T \vee t \Leftrightarrow T$
$\forall(t:\text{bool}). t \wedge F \Leftrightarrow F$
$\forall(t:\text{bool}). T \wedge t \Leftrightarrow t$
$\forall(f:\alpha \rightarrow \beta \# \text{bool}). (\forall(x:\alpha).\neg \text{SND } (f x)) \Rightarrow \text{GSPEC } f = (\emptyset : \beta \rightarrow \text{bool})$
$\forall(R:\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{equivalence } R \Rightarrow R^T = R$
$(\forall(x:\alpha)(y:\alpha). (R:\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) x y \Rightarrow R ((f:\alpha \rightarrow \alpha) x) (f y)) \Rightarrow \forall(x:\alpha)(y:\alpha). R C R x y \Rightarrow R C R (f x) (f y)$
$\text{SND } (p:\beta \# \alpha) = (y:\alpha) \Leftrightarrow \exists(x:\beta). p = (x,y)$
$\forall(P:\text{num} \rightarrow \text{bool}). P(0:\text{num}) \wedge (\forall(n:\text{num}). P n \Rightarrow P(\text{SUC } n)) \Rightarrow \forall(n:\text{num}). P n$
$(\forall(x:\alpha). (P:\alpha \rightarrow \text{bool}) x \Rightarrow (Q:\alpha \text{ option} \rightarrow \text{bool}) (\text{SOME } x)) \wedge ((\forall(x:\alpha). \neg P x) \Rightarrow Q(\text{NONE}:\alpha \text{ option})) \Rightarrow Q(\$some P)$
$\forall(l:\alpha \text{ list}). l \neq ([]:\alpha \text{ list}) \Rightarrow \text{ELL } (\text{PRE } (\text{LENGTH } l)) l = \text{HD } l$
$\forall(n1:\text{num})(n2:\text{num})(x:\alpha). n1 < n2 \Rightarrow \text{EL } n1 (\text{REPLICATE } n2 x) = x$
$\forall(n:\text{num})(l1:\alpha \text{ list})(l2:\alpha \text{ list}). n < \text{LENGTH } l1 \Rightarrow \text{EL } n (l1 ++ l2) = \text{EL } n l1$
$\forall(f:\alpha \rightarrow \beta)(t:\beta \rightarrow \text{bool})(sp:\alpha \rightarrow \text{bool}). \text{PREIMAGE } f (\text{COMPL } t) \cap sp = sp \text{ DIFF } \text{PREIMAGE } f t$
$\forall(x:\alpha)(s:\alpha \rightarrow \text{bool}). x \in s \Rightarrow \forall(f:\alpha \rightarrow \beta). f x \in \text{IMAGE } f s$
$\forall(l1:\alpha \text{ list})(h:\alpha)(l2:\alpha \text{ list})(l3:\alpha \text{ list}). l1 ++ h :: l2 ++ l3 = l1 ++ h :: (l2 ++ l3)$
$\forall(n:\text{num}). \text{count } n = \text{if } n = (0:\text{num}) \text{ then } (\emptyset : \text{num} \rightarrow \text{bool}) \text{ else } (\text{let } (p:\text{num}) = \text{PRE } n \text{ in } p \text{ INSERT } \text{count } p)$
$\forall(x:\alpha)(s:\alpha \rightarrow \text{bool}). x \in \text{COMPL } s \Leftrightarrow x \notin s$
$\forall(l:\alpha \text{ list})(n:\text{num}). \text{LENGTH } l \leq n \Rightarrow \text{DROP } n l = ([]:\alpha \text{ list})$
$\forall(P:\alpha \rightarrow \text{bool})(B:(\alpha \rightarrow \text{bool}) \rightarrow \text{bool}). \text{BIGINTER } (P \text{ INSERT } B) = P \cap \text{BIGINTER } B$
$\forall(xs:\alpha \text{ list})(ys:\beta \text{ list})(P:\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool})(x:\alpha). \text{LIST_REL } P xs ys \wedge \text{MEM } x xs \Rightarrow \exists(y:\beta). \text{MEM } y ys \wedge P x y$
$\text{longest_prefix } (\emptyset : \alpha \text{ list} \rightarrow \text{bool}) = ([] : \alpha \text{ list})$
$(\forall(x:\alpha)(y:\alpha). (R:\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) x y \Rightarrow R ((f:\alpha \rightarrow \alpha) x) (f y)) \Rightarrow \forall(x:\alpha)(y:\alpha). \text{SC } R x y \Rightarrow \text{SC } R (f x) (f y)$
$\forall(s:\alpha \rightarrow \text{bool})(t:\alpha \rightarrow \text{bool}). \text{countable } s \wedge t \subseteq s \Rightarrow \text{countable } t$
$\forall(ls:\text{num list}). \text{SUM } ls = (0:\text{num}) \Leftrightarrow \forall(x:\text{num}). \text{MEM } x ls \Rightarrow x = (0:\text{num})$
$\forall(s:\alpha \rightarrow \text{bool})(t:\alpha \rightarrow \text{bool}). \text{DISJOINT } s t \Leftrightarrow \text{DISJOINT } t s$
$\forall(n:\text{num}). n \leq \text{LENGTH } (l1:\alpha \text{ list}) \Rightarrow \text{TAKE } n (l1 ++ (l2:\alpha \text{ list})) = \text{TAKE } n l1$
$\forall(xs:\alpha \text{ list})(k:\text{num})(n:\text{num}). \text{TAKE } k (\text{DROP } n xs) = \text{DROP } n (\text{TAKE } (k+n) xs)$
$\forall(P1:\alpha \rightarrow \text{bool})(P2:\alpha \rightarrow \text{bool})(l:\alpha \text{ list}). \text{EVERY } P1 (\text{FILTER } P2 l) \Leftrightarrow \text{EVERY } (\lambda(x:\alpha). P2 x \Rightarrow P1 x) l$
$\forall(n:\text{num})(l:\alpha \text{ list}). n < \text{LENGTH } l \Rightarrow \text{EL } n l = \text{HD } (\text{SEG } (1:\text{num}) n l)$
$\forall(x:\alpha \text{ option}). (\text{option_CASE } x x (\text{SOME } :\alpha \rightarrow \alpha \text{ option}):\alpha \text{ option}) = x$
$\forall(R:\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{WeakOrder } R \Rightarrow \text{Order } R$
$\forall(s:\alpha \rightarrow \text{bool})(t:\alpha \rightarrow \text{bool})(u:\alpha \rightarrow \text{bool}). \text{DISJOINT } (s \cup t) u \Leftrightarrow \text{DISJOINT } s u \wedge \text{DISJOINT } t u$

$(s : \alpha \rightarrow \text{bool}) \sqsubseteq (t : \alpha \rightarrow \text{bool}) \Rightarrow s \cup (t \text{ DIFF } s) = t \wedge t \text{ DIFF } s \cup s = t$
$(\forall(s : (\alpha \rightarrow \text{bool}) \rightarrow \text{bool}) (t : \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{DISJOINT}(\text{BIGUNION } s) t \Leftrightarrow \forall(s' : \alpha \rightarrow \text{bool}). s' \in s \Rightarrow \text{DISJOINT } s' t) \wedge \forall(s : (\alpha \rightarrow \text{bool}) \rightarrow \text{bool}) (t : \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{DISJOINT } t (\text{BIGUNION } s) \Leftrightarrow \forall(s' : \alpha \rightarrow \text{bool}). s' \in s \Rightarrow \text{DISJOINT } t s'$
$(\forall(x : \alpha) (y : \beta). (R1 : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}) x y \Rightarrow (R2 : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}) x y) \Rightarrow \text{LIST_REL } R1 (l1 : \alpha \text{ list}) (l2 : \beta \text{ list}) \Rightarrow \text{LIST_REL } R2 l1 l2$
$\forall(R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) (x : \alpha) (y : \alpha) (z : \alpha). R^{\wedge} x y \wedge R^{\wedge} y z \Rightarrow R^{\wedge} x z$
$\forall(x : \alpha) (l : \alpha \text{ list}). \text{SNOC } x l = \text{FOLDL } (\text{CONS} : \alpha \rightarrow \alpha \text{ list} \rightarrow \alpha \text{ list}) [x] l$
$\forall(n : \text{num}) (x : \alpha). \text{REVERSE } (\text{REPLICATE } n x) = \text{REPLICATE } n x$
$(y : \alpha) \in \{x \mid (P : \alpha \rightarrow \text{bool}) x\} \Leftrightarrow P y$
$\forall(P : \alpha \rightarrow \text{bool}) (x : \alpha) (l : \alpha \text{ list}). \text{EXISTS } P (\text{SNOC } x l) \Leftrightarrow P x \vee \text{EXISTS } P l$
$\forall(v : \alpha) (\text{rows} : (\alpha \rightarrow \beta \text{ option}) \text{ list}). \text{PMATCH_EQUIV_ROWS } v \text{ rows rows}$
$\forall(l : \text{num} \rightarrow \text{bool}) (J : \text{num} \rightarrow \text{bool}) (n : \alpha). l \neq (\emptyset : \text{num} \rightarrow \text{bool}) \wedge J \neq (\emptyset : \text{num} \rightarrow \text{bool}) \wedge l \sqsubseteq J \Rightarrow \text{MIN_SET } J \leq \text{MIN_SET } l$
$(\forall(x : \alpha) (y : \alpha). (P : \alpha \rightarrow \text{bool}) x \wedge (R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) x y \Rightarrow P y) \Rightarrow \forall(x : \alpha) (y : \alpha). P x \wedge R C R x y \Rightarrow P y$
$\forall(P : \alpha \rightarrow \text{bool}) (l : \alpha \text{ list}). \neg \text{EVERY } P l \Leftrightarrow \text{EXISTS } (\neg \circ P) l$
$\forall(m : \text{num}) (l : \alpha \text{ list}) (n : \text{num}). n \leq m \Rightarrow \text{TAKE } n (\text{TAKE } m l) = \text{TAKE } n l$
$\forall(f : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \beta) (e : \beta) (g : \gamma \rightarrow \alpha) (l : \gamma \text{ list}). \text{FOLDL } f e (\text{MAP } g l) = \text{FOLDL } (\lambda(x : \gamma) (y : \beta). f(g x) y) e l$
$\forall(P : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}) (l1 : \alpha \text{ list}) (l2 : \beta \text{ list}) (v1 : \alpha) (v2 : \beta) (n : \text{num}). P v1 v2 \wedge \text{LIST_REL } P l1 l2 \Rightarrow \text{LIST_REL } P (\text{LUPDATE } v1 n l1) (\text{LUPDATE } v2 n l2)$
$\forall(P : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}) (xs : \alpha \text{ list}) (ys : \beta \text{ list}) (n : \text{num}). \text{LIST_REL } P xs ys \Rightarrow \text{LIST_REL } P (\text{TAKE } n xs) (\text{TAKE } n ys)$
$\forall(l : \alpha \text{ list}) (m : \text{num}) (P : \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{EXISTS } P (\text{TAKE } m l) \Rightarrow \text{EXISTS } P l$
$\text{RC } (\$SUBSET : (\alpha \rightarrow \text{bool}) \rightarrow (\alpha \rightarrow \text{bool}) \rightarrow \text{bool}) = (\$SUBSET : (\alpha \rightarrow \text{bool}) \rightarrow (\alpha \rightarrow \text{bool}) \rightarrow \text{bool})$
$\text{transitive } (R1 : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) \wedge \text{transitive } (R2 : \beta \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}) \Rightarrow \text{transitive } (R1 \text{ LEX } R2)$
$\forall(P : \alpha \rightarrow \text{bool}) (Q : \alpha \rightarrow \text{bool}) (l : \alpha \text{ list}). \text{EVERY } (\lambda(x : \alpha). P x \wedge Q x) l \Leftrightarrow \text{EVERY } P l \wedge \text{EVERY } Q l$
$\forall(l1 : \alpha \text{ list}) (l2 : \alpha \text{ list}). l1 \neq l2 \Rightarrow \forall(h1 : \alpha) (h2 : \alpha). h1 :: l1 \neq h2 :: l2$
$\forall(y : \alpha) (l : \alpha \text{ list}). \text{MEM } y l \Leftrightarrow \text{FOLDL } (\lambda(x : \alpha) (l' : \text{bool}). y = x \vee l') F l$
$\forall(x : \alpha) (y : \alpha). \{x\} = \{y\} \Leftrightarrow x = y$
$\forall(P : \text{unit} \rightarrow \text{bool}). P () \Rightarrow \forall(x : \text{unit}). P x$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{FINITE } s \Rightarrow \forall(t : \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{FINITE } (s \text{ DIFF } t)$
$\forall(m : \text{num}) (n : \text{num}) (l : \alpha \text{ list}). m + n = \text{LENGTH } l \Rightarrow \text{BUTLASTN } m l ++ \text{DROP } n l = l$
$\forall(l1 : \alpha \text{ list}) (l2 : \beta \text{ list}). \text{LENGTH } l1 = \text{LENGTH } l2 \Rightarrow \text{LENGTH } (\text{ZIP } (l1, l2)) = \text{LENGTH } l1 \wedge \text{LENGTH } (\text{ZIP } (l1, l2)) = \text{LENGTH } l2$
$\forall(x : \alpha) (xs : \alpha \text{ list}). \text{LENGTH } (\text{FRONT } (x :: xs)) = \text{LENGTH } xs$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{COMPL } s \cap s = (\emptyset : \alpha \rightarrow \text{bool}) \wedge \text{COMPL } s \cup s = \mathbb{U}(\alpha)$
$\text{UNZIP } ([] : (\alpha \# \beta) \text{ list}) = (([] : \alpha \text{ list}), ([] : \beta \text{ list})) \wedge \text{UNZIP } (((x : \alpha), (y : \beta)) :: (t : (\alpha \# \beta) \text{ list})) = (\text{let } (l1 : \alpha \text{ list}), (l2 : \beta \text{ list})) = \text{UNZIP } t \text{ in } (x :: l1, y :: l2)$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \alpha \rightarrow \text{bool}) (x : \alpha). \text{DISJOINT } (s \text{ DELETE } x) t \Leftrightarrow \text{DISJOINT } (t \text{ DELETE } x) s$
$\forall(f : \alpha \rightarrow \beta) (g : \gamma \rightarrow \alpha) (s : \gamma \rightarrow \text{bool}). \text{IMAGE } f (\text{IMAGE } g s) = \text{IMAGE } (f \circ g) s$
$\forall(P : \alpha \rightarrow \text{bool}) (Q : \beta \rightarrow \text{bool}) (x : \beta). P x \times (x \text{ INSERT } Q) = P \times \{x\} \cup P \times Q$

$\forall(f : \alpha \rightarrow \beta) (n : \text{num}) (l : \alpha \text{ list}). \text{MAP } f (\text{TAKE } n l) = \text{TAKE } n (\text{MAP } f l)$
$\forall(P : \alpha \rightarrow \text{bool}) (f : \beta \rightarrow \alpha) (s : \beta \rightarrow \text{bool}). (\exists(y : \alpha). y \in \text{IMAGE } f s \wedge P y) \Leftrightarrow \exists(x : \beta). x \in s \wedge P (f x)$
$\forall(x : \alpha) (s : \alpha \rightarrow \text{bool}). x \in \text{REST } s \Leftrightarrow x \in s \wedge x \neq \text{CHOICE } s$
$\text{REPLICATE } (x : \text{num}) (y : \alpha) = ([] : \alpha \text{ list}) \Leftrightarrow x = (0 : \text{num})$
$\forall(n : \text{num}). n < \text{SUC } n$
$\forall(x : \alpha) (y : \alpha) (s : \alpha \rightarrow \text{bool}). s \text{ DELETE } x \text{ DELETE } y = s \text{ DELETE } y \text{ DELETE } x$
$((p : \text{bool}) \Leftrightarrow \neg(q : \text{bool})) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (\neg q \vee \neg p)$
$\text{NULL } ((l_1 : \alpha \text{ list}) ++ (l_2 : \alpha \text{ list})) \Leftrightarrow \text{NULL } l_1 \wedge \text{NULL } l_2$
$\text{IS_SOME } (\text{OPTION_MAP } (f : \alpha \rightarrow \beta) (x : \alpha \text{ option})) \Leftrightarrow \text{IS_SOME } x$
$\forall(M : \alpha \text{ option}) (M' : \alpha \text{ option}) (v : \beta) (f : \alpha \rightarrow \beta). M = M' \wedge (M' = (\text{NONE } : \alpha \text{ option}) \Rightarrow v = (v' : \beta)) \wedge (\forall(x : \alpha). M' = \text{SOME } x \Rightarrow f x = (f' : \alpha \rightarrow \beta) x) \Rightarrow (\text{option_CASE } M v f : \beta) = (\text{option_CASE } M' v' f' : \beta)$
$\forall(f : \alpha \rightarrow \beta) (s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (f' : \alpha \rightarrow \beta) (s' : \alpha \rightarrow \text{bool}). s = s' \wedge (\forall(x : \alpha). x \in s' \Rightarrow f x = f' x) \Rightarrow \text{IMAGE } f s = \text{IMAGE } f' s'$
$\forall(x : \alpha \rightarrow \text{bool}) (P : (\alpha \rightarrow \text{bool}) \rightarrow \text{bool}). x \in P \Rightarrow x \subseteq \text{BIGUNION } P$
$\forall(f : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \gamma) (x : \alpha) (y : \beta). \text{UNCURRY } f (x, y) = f x y$
$\forall(sp : \alpha \rightarrow \text{bool}) (s : (\alpha \rightarrow \text{bool}) \rightarrow \text{bool}). (\forall(t : \alpha \rightarrow \text{bool}). t \in s \Rightarrow t \subseteq sp) \wedge s \neq (\emptyset : (\alpha \rightarrow \text{bool}) \rightarrow \text{bool}) \Rightarrow \text{BIGINTER } s \subseteq sp$
$(\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}). (\emptyset : \alpha \rightarrow \text{bool}) \cup s = s) \wedge \forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}). s \cup (\emptyset : \alpha \rightarrow \text{bool}) = s$
$\forall(ls : \alpha \text{ list}). ls \neq ([] : \alpha \text{ list}) \Rightarrow \text{TAKE } (\text{PRE } (\text{LENGTH } ls)) ls = \text{FRONT } ls$
$\forall(f : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \alpha) (e : \alpha) (l_1 : \beta \text{ list}) (l_2 : \beta \text{ list}). \text{FOLDL } f e (l_1 ++ l_2) = \text{FOLDL } f (\text{FOLDL } f e l_1) l_2$
$\forall(R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{WF } R \Leftrightarrow \forall(x : \alpha). \text{WFP } R x$
$\forall(l : \alpha \text{ list list list}). \text{FLAT } (\text{FLAT } l) = \text{FLAT } (\text{MAP } (\text{FLAT} : \alpha \text{ list list} \rightarrow \alpha \text{ list}) l)$
$\forall(P : \alpha \rightarrow \text{bool}) (Q : \alpha \rightarrow \text{bool}) (l : \alpha \text{ list}). (\forall(x : \alpha). \text{MEM } x l \wedge P x \Rightarrow Q x) \wedge \text{EVERY } P l \Rightarrow \text{EVERY } Q l$
$(x_1 : \text{num}) \otimes (y_1 : \text{num}) = (x_2 : \text{num}) \otimes (y_2 : \text{num}) \Leftrightarrow x_1 = x_2 \wedge y_1 = y_2$
$(x : \alpha) \in \text{RDOM } ((R_1 : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}) \cup_r (R_2 : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool})) \Leftrightarrow x \in \text{RDOM } R_1 \vee x \in \text{RDOM } R_2$
$\forall(y : \alpha) (x : \beta) (P : \alpha \rightarrow \text{bool}). P y \wedge x = (f : \alpha \rightarrow \beta) y \Rightarrow x \in \{f x \mid P x\}$
$((\text{if } (P : \text{bool}) \text{ then } (X : \alpha \text{ option}) \text{ else } (\text{NONE } : \alpha \text{ option})) = (\text{NONE } : \alpha \text{ option}) \Leftrightarrow P \Rightarrow \text{IS_NONE } X) \wedge ((\text{if } P \text{ then } (\text{NONE } : \alpha \text{ option}) \text{ else } X) = (\text{NONE } : \alpha \text{ option}) \Leftrightarrow \text{IS_SOME } X \Rightarrow P) \wedge ((\text{if } P \text{ then } X \text{ else } (\text{NONE } : \alpha \text{ option})) = \text{SOME } (x : \alpha) \Leftrightarrow P \wedge X = \text{SOME } x) \wedge ((\text{if } P \text{ then } (\text{NONE } : \alpha \text{ option}) \text{ else } X) = \text{SOME } x \Leftrightarrow \neg P \wedge X = \text{SOME } x)$
$(\forall(x : \alpha). x \in (s : \alpha \rightarrow \text{bool}) \Rightarrow (\text{INL } x : \alpha + \beta) \in (t : \alpha + \beta \rightarrow \text{bool})) \Rightarrow \text{INJ } (\text{INL} : \alpha \rightarrow \alpha + \beta) s t$
$\forall(m : \text{num}) (n : \text{num}). m < n \Rightarrow \text{SUC } m < \text{SUC } n$
$\text{PMATCH_ROW } (p : \beta \rightarrow \gamma) (g : \beta \rightarrow \text{bool}) (r : \beta \rightarrow \alpha) (i : \gamma) \neq (\text{NONE } : \alpha \text{ option}) \Leftrightarrow \text{PMATCH_ROW_COND_EX } i p g$
$\text{OWHILE } (G : \alpha \rightarrow \text{bool}) (f : \alpha \rightarrow \alpha) (s : \alpha) = (\text{NONE } : \alpha \text{ option}) \Leftrightarrow \forall(n : \text{num}). G (\text{FUNPOW } f n s)$
$\forall(f : \alpha \rightarrow \alpha) (P : \alpha \rightarrow \text{bool}) (l : \alpha \text{ list}). (\forall(x : \alpha). P (f x) \Leftrightarrow P x) \Rightarrow \text{MAP } f (\text{FILTER } P l) = \text{FILTER } P (\text{MAP } f l)$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{COMPL } (\text{COMPL } s) = s$
$(y : \alpha) \in \text{RRANGE } (R : \beta \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) \Leftrightarrow \exists(x : \beta). R x y$

$\text{LIST_REL } (\text{P} : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}) (\text{REPLICATE } (\text{n} : \text{num}) (\text{x} : \alpha)) (\text{REPLICATE } \text{n} (\text{y} : \beta)) \Leftrightarrow \text{n} > (0 : \text{num}) \Rightarrow \text{P x y}$	
$\forall (\text{s} : \alpha \rightarrow \text{bool}) (\text{t} : \gamma \rightarrow \text{bool}) (\text{u} : \beta \rightarrow \text{bool}). (\exists (\text{f} : \alpha \rightarrow \gamma). \text{BIJ f s t}) \wedge (\exists (\text{g} : \gamma \rightarrow \beta). \text{BIJ g t u}) \Rightarrow \exists (\text{h} : \alpha \rightarrow \beta). \text{BIJ h s u}$	
$\forall (\text{R} : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{reflexive R} \Leftrightarrow (\$= : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) \subseteq_{\text{r}} \text{R}$	
$\text{DATATYPE } ((\text{sum} : (\alpha \rightarrow \alpha + \beta) \rightarrow (\beta \rightarrow \alpha + \beta) \rightarrow \gamma) (\text{INL} : \alpha \rightarrow \alpha + \beta) (\text{INR} : \beta \rightarrow \alpha + \beta))$	
$\text{GENLIST } (\text{f} : \text{num} \rightarrow \alpha) (\text{SUC } (\text{n} : \text{num})) = \text{f} (0 : \text{num}) :: \text{GENLIST } (\text{f} \circ \text{SUC}) \text{n}$	
$\forall (\text{n} : \text{num}) (\text{l1} : \alpha \text{ list}). \text{n} \leq \text{LENGTH l1} \Rightarrow \forall (\text{l2} : \alpha \text{ list}). \text{DROP n l1 ++ l2} = \text{DROP n l1 ++ l2}$	
$\forall (\text{f} : \alpha \rightarrow \beta) (\text{x} : \alpha) (\text{l} : \alpha \text{ list}). \text{MAP f (SNOC x l)} = \text{SNOC} (\text{f x}) (\text{MAP f l})$	
$\text{INVOL \$-}$	
$\forall (\text{f} : \alpha \rightarrow \text{num}) (\text{x} : \alpha) (\text{y} : \alpha). \text{measure f x y} \Leftrightarrow \text{f x} < \text{f y}$	
$\forall (\text{f} : \alpha \rightarrow \beta) (\text{g} : \alpha \rightarrow \beta). \text{f (EXT_POINT f g)} = \text{g (EXT_POINT f g)} \Leftrightarrow \text{f} = \text{g}$	
$\forall (\text{t} : \text{bool}). \text{t} \vee \text{F} \Leftrightarrow \text{t}$	
$\forall (\text{l} : \alpha \text{ list}). \neg \text{NULL l} \Leftrightarrow \exists (\text{e} : \alpha). \text{MEM e l}$	
$\forall (\text{f} : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \beta) (\text{e} : \beta) (\text{P} : \alpha \rightarrow \text{bool}) (\text{l} : \alpha \text{ list}). \text{FOLDL f e (FILTER P l)} = \text{FOLDL} (\lambda (\text{x} : \alpha) (\text{y} : \beta). \text{if P x then f x y else y}) \text{e l}$	
$(\text{R} : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) \text{equiv_on } (\text{s} : \alpha \rightarrow \text{bool}) \Rightarrow \forall (\text{t} : \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{t} \in \text{partition R s} \Rightarrow \forall (\text{x} : \alpha) (\text{y} : \alpha). \text{x} \in \text{t} \wedge \text{y} \in \text{t} \Rightarrow \text{R x y}$	
$\forall (\text{v} : \alpha) (\text{rs1} : (\alpha \rightarrow \beta \text{ option}) \text{ list}) (\text{rs2} : (\alpha \rightarrow \beta \text{ option}) \text{ list}) (\text{i} : \text{num}). \text{i} < \text{LENGTH rs1} \Rightarrow (\text{PMATCH_ROW_REDUNDANT v (rs1 ++ rs2)} \text{i}) \Leftrightarrow \text{PMATCH_ROW_REDUNDANT v rs1 i}$	
$\forall (\text{l1} : \alpha \text{ list}) (\text{l2} : \alpha \text{ list}). \text{IS_SUFFIX l1 l2} \Leftrightarrow \text{REVERSE l2} \leqslant \text{REVERSE l1}$	
$\forall (\text{f} : \alpha \# \beta \rightarrow \gamma). \text{UNCURRY (CURRY f)} = \text{f}$	
$\text{EL (NUMERAL (BIT1 (n : num))) ((l : alpha)::(ls : alpha list))} = \text{EL (PRE (NUMERAL (BIT1 n))) ls} \wedge \text{EL (NUMERAL (BIT2 n)) (l::ls)} = \text{EL (NUMERAL (BIT1 n)) ls}$	
$\forall (\text{a1} : \alpha \text{ list}) (\text{a0} : \alpha). \text{a0::a1} \neq ([] : \alpha \text{ list})$	
$\forall (\text{x} : \text{num}) (\text{y} : \text{num}). \text{x} \otimes \text{y} = (0 : \text{num}) \Leftrightarrow \text{x} = (0 : \text{num}) \wedge \text{y} = (0 : \text{num})$	
$\forall (\text{R} : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}). (\forall (\text{x} : \alpha) (\text{y} : \alpha). \text{R x y} \Rightarrow \text{R}^+ \text{x y}) \wedge \forall (\text{x} : \alpha) (\text{y} : \alpha) (\text{z} : \alpha). \text{R}^+ \text{x y} \wedge \text{R}^+ \text{y z} \Rightarrow \text{R}^+ \text{x z}$	
$\forall (\text{v_old} : \alpha) (\text{v_new} : \beta) (\text{rows_old} : (\alpha \rightarrow \gamma \text{ option}) \text{ list}) (\text{rows_new} : (\beta \rightarrow \gamma \text{ option}) \text{ list}) (\text{r_old} : \alpha \rightarrow \gamma \text{ option}) (\text{r_new} : \beta \rightarrow \gamma \text{ option}). \text{r_old v_old} = \text{r_new v_new} \Rightarrow \text{PMATCH v_old rows_old} = \text{PMATCH v_new rows_new} \Rightarrow \text{PMATCH v_old (r_old::rows_old)} = \text{PMATCH v_new (r_new::rows_new)}$	
$\forall (\text{s} : \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{FINITE s} \Rightarrow \forall (\text{t} : \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{t} \subseteq \text{s} \Rightarrow \text{FINITE t}$	
$\forall (\text{f} : \alpha \rightarrow \beta) (\text{s} : \alpha \rightarrow \text{bool}) (\text{t} : \beta \rightarrow \text{bool}). \text{INJ f s t} \Rightarrow \text{INJ f s (IMAGE f s)}$	
$\forall (\text{x} : \alpha) (\text{y} : \alpha) (\text{s} : \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{x} \in \text{y INSERT s} \Leftrightarrow \text{x} = \text{y} \vee \text{x} \in \text{s}$	
$\forall (\text{v} : \alpha) (\text{rows1} : (\alpha \rightarrow \beta \text{ option}) \text{ list}) (\text{rows2} : (\alpha \rightarrow \beta \text{ option}) \text{ list}). \text{PMATCH_EQUIV_ROWS v rows1 rows2} \Leftrightarrow \text{PMATCH_EQUIV_ROWS v rows2 rows1}$	
$(\text{antisymmetric } (\text{R1} : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool})) \Rightarrow \text{antisymmetric } (\text{R1} \cap_{\text{r}} (\text{R2} : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}))) \wedge (\text{antisymmetric R2} \Rightarrow \text{antisymmetric } (\text{R1} \cap_{\text{r}} \text{R2}))$	
$\forall (\text{s} : \alpha \rightarrow \text{bool}) (\text{M} : \alpha \rightarrow \text{num}). (\exists (\text{x} : \alpha). \text{x} \in \text{s}) \Leftrightarrow \exists (\text{x} : \alpha). \text{x} \in \text{s} \wedge \forall (\text{y} : \alpha). \text{y} \in \text{s} \Rightarrow \text{M x} \leq \text{M y}$	
$\forall (\text{f} : \alpha \rightarrow \beta) (\text{s} : \alpha \rightarrow \text{bool}) (\text{t} : \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{IMAGE f (s \cap t)} \subseteq \text{IMAGE f s} \cap \text{IMAGE f t}$	
$\forall (\text{s} : \alpha \rightarrow \text{bool}) (\text{t} : \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{s} \cap \text{t} = \text{COMPL (COMPL s} \cup \text{COMPL t)}$	
$\forall (\text{R} : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) (\text{P} : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{WF R} \wedge (\forall (\text{x} : \alpha) (\text{y} : \alpha). \text{P x y} \Rightarrow \text{R x y}) \Rightarrow \text{WF P}$	

$\forall(f1 : \text{num} \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) (f1' : \text{num} \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) (f2 : \text{num} \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) (f2' : \text{num} \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{ind_type\$INJP } f1 \ f2 = \text{ind_type\$INJP } f1' \ f2' \Leftrightarrow f1 = f1' \wedge f2 = f2'$
$\forall(R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) (x : \alpha) (y : \alpha). R^{\diamond} x \ y \Leftrightarrow x = y \vee \exists(u : \alpha). R \ x \ u \wedge R^{\diamond} \ u \ y$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \alpha \rightarrow \text{bool}). s \cup t = t \cup s$
$\forall(x : \alpha) (y : \alpha \text{ list}) (a : \alpha) (b : \alpha \text{ list}). \text{SNOC } x \ y = \text{SNOC } a \ b \Leftrightarrow x = a \wedge y = b$
$\forall(n : \text{num}). \text{TAKE } n ([] : \alpha \text{ list}) = ([] : \alpha \text{ list})$
$\text{DROP } (n : \text{num}) (\text{REPLICATE } (m : \text{num}) (a : \alpha)) = \text{REPLICATE } (m - n) a$
$((a : \alpha), (b : \beta)) \in \{(y, (x : \beta)) \mid (P : \alpha \rightarrow \text{bool}) \ y\} \Leftrightarrow P \ a \wedge b = x$
$\forall(l : \alpha \text{ list list}). \text{FLAT } (\text{REVERSE } l) = \text{REVERSE } (\text{FLAT } (\text{MAP } (\text{REVERSE} : \alpha \text{ list} \rightarrow \alpha \text{ list}) l))$
$\forall(n : \text{num}) (m : \text{num}) (l : \alpha \text{ list}). n + m \leq \text{LENGTH } l \Rightarrow \text{LASTN } n (\text{BUTLASTN } m l) = \text{BUTLASTN } m (\text{LASTN } (n + m) l)$
$\forall(P : \alpha \rightarrow \text{bool}) (Q : \alpha \rightarrow \text{bool}) (l : \alpha \text{ list}). \text{FILTER } P (\text{FILTER } Q l) = \text{FILTER } (\lambda(x : \alpha). P \ x \wedge Q \ x) l$
$\forall(x : \alpha \text{ option}). (\text{option_CASE } x (\text{NONE} : \alpha \text{ option}) (\text{SOME} : \alpha \rightarrow \alpha \text{ option}) : \alpha \text{ option}) = x$
$\text{FINITE } (\emptyset : \alpha \rightarrow \text{bool})$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (e : \alpha) (s2 : \alpha \rightarrow \text{bool}). s \text{ DELETE } e \subseteq s2 \Leftrightarrow s \subseteq e \text{ INSERT } s2$
$\mathbb{U}(\alpha \rightarrow \text{bool}) = \text{POW } \mathbb{U}(\alpha)$
$\text{NULL } ([] : \alpha \text{ list}) \wedge \forall(h : \alpha) (t : \alpha \text{ list}). \neg \text{NULL } (h :: t)$
$\forall(R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) (x : \alpha). R^{\wedge} = x \ x$
$\forall(v : \alpha). \text{IS_REDUNDANT_ROWS_INFO } v ([] : (\alpha \rightarrow \beta \text{ option}) \text{ list}) T ([] : \text{bool list})$
$\forall(f : \alpha \rightarrow \beta) (s : (\beta \rightarrow \text{bool}) \rightarrow \text{bool}). \text{PREIMAGE } f (\text{BIGUNION } s) = \text{BIGUNION } (\text{IMAGE } (\text{PREIMAGE } f) s)$
$\forall(f : 'z \rightarrow 'z). \text{IDEM } f \Leftrightarrow \forall(x : 'z). f (f x) = f x$
$\forall(x : \alpha) (s : \alpha \rightarrow \text{bool}). x \notin s \text{ DELETE } x$
$(\text{OPTION_MAP } (f : \beta \rightarrow \alpha) (x : \beta \text{ option}) = (\text{NONE} : \alpha \text{ option}) \Leftrightarrow x = (\text{NONE} : \beta \text{ option})) \wedge ((\text{NONE} : \alpha \text{ option}) = \text{OPTION_MAP } f x \Leftrightarrow x = (\text{NONE} : \beta \text{ option}))$
$\forall(x : \alpha) (y : \alpha \text{ list}) (z : \alpha \text{ list}). z \leqslant \text{SNOC } x \ y \Leftrightarrow z \leqslant y \vee z = \text{SNOC } x \ y$
$\forall(c : \text{num}) (i : \alpha) (r : \text{num} \rightarrow \text{num} \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{ind_type\$ZCONSTR } c \ i \ r \neq (\text{ind_type\$ZBOT} : \text{num} \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool})$
$\forall(f : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \gamma). \exists(fn : \alpha \# \beta \rightarrow \gamma). \forall(x : \alpha) (y : \beta). fn (x, y) = f x \ y$
$(\text{set } (l : \alpha \text{ list}) = (\emptyset : \alpha \rightarrow \text{bool}) \Leftrightarrow l = ([] : \alpha \text{ list})) \wedge ((\emptyset : \alpha \rightarrow \text{bool}) = \text{set } l \Leftrightarrow l = ([] : \alpha \text{ list}))$
$\neg((p : \text{bool}) \Rightarrow (q : \text{bool})) \Rightarrow p$
$\forall(f : \alpha \rightarrow \beta) (g : \beta \rightarrow \gamma) (s : \gamma \rightarrow \text{bool}). \text{PREIMAGE } f (\text{PREIMAGE } g s) = \text{PREIMAGE } (g \circ f) s$
$\forall(x : \alpha) (n : \text{num}) (ys : \alpha \text{ list}). \text{LENGTH } (\text{LUPDATE } x \ n \ ys) = \text{LENGTH } ys$
$(\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}). \mathbb{U}(\alpha) \cup s = \mathbb{U}(\alpha)) \wedge \forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}). s \cup \mathbb{U}(\alpha) = \mathbb{U}(\alpha)$
$\forall(M : \beta \# \gamma) (M' : \beta \# \gamma) (f : \beta \rightarrow \gamma \rightarrow \alpha). M = M' \wedge (\forall(x : \beta) (y : \gamma). M' = (x, y) \Rightarrow f x \ y = (f' : \beta \rightarrow \gamma \rightarrow \alpha) x \ y) \Rightarrow (\text{pair_CASE } M \ f : \alpha) = (\text{pair_CASE } M' \ f' : \alpha)$
$\forall(R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}). (RC \ R)^T = RC \ R^T$
$\forall(n : \text{num}). \text{SUC } n \neq (0 : \text{num})$
$\forall(n : \text{num}) (l : \alpha \text{ list}). n \leq \text{LENGTH } l \Rightarrow \text{BUTLASTN } n (\text{LASTN } n l) = ([] : \alpha \text{ list})$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \alpha \rightarrow \text{bool}). s \cup t = (\emptyset : \alpha \rightarrow \text{bool}) \Leftrightarrow s = (\emptyset : \alpha \rightarrow \text{bool}) \wedge t = (\emptyset : \alpha \rightarrow \text{bool})$
$\forall(s : \text{num} \rightarrow \text{bool}). (\exists(n : \text{num}). n \in s) \Leftrightarrow \exists(n : \text{num}). n \in s \wedge \forall(m : \text{num}). m \in s \Rightarrow n \leq m$
$((\exists(\text{opt} : \alpha \text{ option}). (P : \alpha \text{ option} \rightarrow \text{bool}) \text{ opt}) \Leftrightarrow P (\text{NONE} : \alpha \text{ option})) \vee \exists(x : \alpha). P (\text{SOME} \ x)$
$\forall(P : \alpha \rightarrow \text{bool}) (l1 : \alpha \text{ list}) (l2 : \alpha \text{ list}). \text{EVERY } P (l1 ++ l2) \Leftrightarrow \text{EVERY } P \ l1 \wedge \text{EVERY } P \ l2$

$\forall(v:\alpha)(rs:(\alpha \rightarrow \beta \text{ option}) \text{ list}). (\text{EVERY } (\lambda(r:\alpha \rightarrow \beta \text{ option}). r v = (\text{NONE} : \beta \text{ option})) rs \Rightarrow F) \Rightarrow \text{PMATCH_IS_EXHAUSTIVE } v \text{ rs}$
$(s1 : \alpha \rightarrow \text{bool}) \subseteq (s2 : \alpha \rightarrow \text{bool}) \Rightarrow \text{REL_RESTRICT } (R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) s1 \subseteq_r \text{REL_RESTRICT } R s2$
$\text{nsnd } (n : \text{num}) \leq n$
$\forall(R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool})(x : \alpha)(y : \alpha)(z : \alpha). R x y \wedge R^* y z \Rightarrow R^+ x z$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}). \neg(s \subset (\emptyset : \alpha \rightarrow \text{bool}))$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool})(t : \alpha \rightarrow \text{bool}). s \text{ DIFF } t \text{ DIFF } t = s \text{ DIFF } t$
$\forall(c : \text{bool})(x : \text{bool}). (\text{if } c \text{ then } x \text{ else } F) \Leftrightarrow c \wedge x$
$(R : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}) \circ_r (\$= : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) = R$
$\forall(p : \alpha \# \beta)(f : \alpha \rightarrow \gamma)(g : \beta \rightarrow \delta). \text{FST } ((f \# g) p) = f(\text{FST } p)$
$\forall(n : \text{num}). \text{count } n \text{ DELETE } n = \text{count } n$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool})(t : \alpha \rightarrow \text{bool}). s \cup (s \text{ DIFF } t) = s$
$\text{PMATCH_ROW } (p : \beta \rightarrow \gamma)(g : \beta \rightarrow \text{bool})(r : \beta \rightarrow \alpha)(v : \gamma) \neq (\text{NONE} : \alpha \text{ option}) \Rightarrow \text{PMATCH } v \\ (\text{PMATCH_ROW } p \text{ g } r :: (rs : (\gamma \rightarrow \alpha \text{ option}) \text{ list})) = r(@(x : \beta). \text{PMATCH_ROW_COND } p \text{ g } v \text{ x})$
$\forall(f : \alpha \rightarrow \beta)(g : \gamma \rightarrow \delta)(x : \alpha)(y : \gamma). (f \# g)(x, y) = (f x, g y)$
$\forall(n : \text{num}). \text{ALL_DISTINCT } (\text{COUNT_LIST } n)$
$\text{MAP } (f : \alpha \rightarrow \beta)(l : \alpha \text{ list}) = [(x : \beta)] \Leftrightarrow \exists(x0 : \alpha). l = [x0] \wedge x = f x0$
$\forall(y : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool})(z : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}). y = z \Leftrightarrow y \subseteq_r z \wedge z \subseteq_r y$
$\text{LIST_BIND } ((l1 : \beta \text{ list}) ++ (l2 : \beta \text{ list})) (f : \beta \rightarrow \alpha \text{ list}) = \text{LIST_BIND } l1 f ++ \text{LIST_BIND } l2 f$
$\text{IDEML } (\text{SC} : (\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) \rightarrow \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool})$
$\forall(n : \text{num})(l2 : \alpha \text{ list}). n \leq \text{LENGTH } l2 \Rightarrow \forall(l1 : \alpha \text{ list}). \text{LASTN } n(l1 ++ l2) = \text{LASTN } n l2$
$\forall(x : \alpha)(y : \alpha). x \in \{y\} \Leftrightarrow x = y$
$\forall(t1 : \alpha)(t2 : \alpha). (\text{if } T \text{ then } t1 \text{ else } t2) = t1$
$\forall(o1 : \alpha \text{ option})(o2 : \alpha \text{ option})(f1 : \alpha \rightarrow \beta \text{ option})(f2 : \alpha \rightarrow \beta \text{ option}). o1 = o2 \wedge (\forall(x : \alpha). o2 = \text{SOME } x \Rightarrow f1 x = f2 x) \Rightarrow \text{OPTION_BIND } o1 f1 = \text{OPTION_BIND } o2 f2$
$\forall(L : \text{num list}). \text{SUM } L = \text{SUM_ACC } L (0 : \text{num})$
$\forall(R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{reflexive } R^T \Leftrightarrow \text{reflexive } R$
$(\forall(x : \alpha)(y : \beta)(z : \alpha). (\text{if } (P : \text{bool}) \text{ then } (\text{INR } x : \beta + \alpha) \text{ else } (\text{INL } y : \beta + \alpha)) = (\text{INR } z : \beta + \alpha) \Leftrightarrow P \wedge z = x) \wedge (\forall(x : \gamma)(y : \delta)(z : \delta). (\text{if } P \text{ then } (\text{INR } x : \delta + \gamma) \text{ else } (\text{INL } y : \delta + \gamma)) = (\text{INL } z : \delta + \gamma) \Leftrightarrow \neg P \wedge z = y) \wedge (\forall(x : \varepsilon)(y : \zeta)(z : \varepsilon). (\text{if } P \text{ then } (\text{INL } x : \varepsilon + \zeta) \text{ else } (\text{INR } y : \varepsilon + \zeta)) = (\text{INL } z : \varepsilon + \zeta) \Leftrightarrow P \wedge z = x) \wedge \forall(x : \eta)(y : \theta)(z : \theta). (\text{if } P \text{ then } (\text{INL } x : \eta + \theta) \text{ else } (\text{INR } y : \eta + \theta)) = (\text{INR } z : \eta + \theta) \Leftrightarrow \neg P \wedge z = y$
$\forall(h : \alpha)(l1 : \alpha \text{ list})(l2 : \alpha \text{ list}). \text{LAST } (l1 ++ h :: l2) = \text{LAST } (h :: l2)$
$\text{trichotomous } (\text{STRORD } (R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool})) \Leftrightarrow \text{trichotomous } R$
$\forall(l : \alpha \text{ list})(x : \alpha)(y : \alpha)(i : \text{num}). \text{MEM } x (\text{LUPDATE } y i l) \Leftrightarrow i < \text{LENGTH } l \wedge x = y \vee \exists(j : \text{num}). j < \text{LENGTH } l \wedge i \neq j \wedge \text{EL } j l = x$
$\text{numeral\$iiSUC } \text{ZERO} = \text{BIT2 } \text{ZERO} \wedge \text{numeral\$iiSUC } (\text{BIT1 } (n : \text{num})) = \text{BIT1 } (\text{SUC } n) \wedge \text{numeral\$iiSUC } (\text{BIT2 } n) = \text{BIT2 } (\text{SUC } n)$
$\neg((A : \text{bool}) \vee (B : \text{bool})) \Rightarrow F \Leftrightarrow (A \Rightarrow F) \Rightarrow \neg B \Rightarrow F$
$\forall(R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool})(f : \beta \rightarrow \alpha). \text{total } R \Rightarrow \text{total } (\text{inv_image } R f)$
$\text{numeral\$texp_help } (n : \text{num})(0 : \text{num}) = (2 : \text{num}) ** (n + (1 : \text{num}))$
$\text{BIGUNION } (\emptyset : (\alpha \rightarrow \text{bool}) \rightarrow \text{bool}) = (\emptyset : \alpha \rightarrow \text{bool})$

$\forall(P : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}). (\exists(x : \alpha) (y : \beta). P x y) \Leftrightarrow \exists((x : \alpha), (y : \beta)). P x y$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \alpha \rightarrow \text{bool}) (u : \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{DISJOINT } s t \wedge u \subseteq t \Rightarrow \text{DISJOINT } s u$
$\text{PMATCH_ROW_COND_EX } (i : \alpha) (p : \beta \rightarrow \alpha) (g : \beta \rightarrow \text{bool}) \Leftrightarrow \exists(x : \beta). i = p x \wedge g x$
$\text{FILTER } (P : \alpha \rightarrow \text{bool}) ([] : \alpha \text{ list}) = ([] : \alpha \text{ list}) \wedge (\forall(h : \alpha). P h \Rightarrow \text{FILTER } P (h :: l : \alpha \text{ list})) = h :: \text{FILTER } P l \wedge \forall(h : \alpha). \neg P h \Rightarrow \text{FILTER } P (h :: l) = \text{FILTER } P l$
$\forall(c : \text{bool}) (x : \text{bool}). (\text{if } c \text{ then } x \text{ else } T) \Leftrightarrow c \Rightarrow x$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \alpha \rightarrow \text{bool}) (x : \alpha). x \in s \cap t \Leftrightarrow x \in s \wedge x \in t$
$\text{IDEM } (\text{STRORD} : (\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) \rightarrow \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool})$
$(\forall(x : \alpha) (y : \beta). (P : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}) x y \Rightarrow (Q : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}) x y) \Rightarrow \text{OPTREL } P (x : \alpha \text{ option}) (y : \beta \text{ option}) \Rightarrow \text{OPTREL } Q x y$
$(\forall(x : \text{num}). \text{pair_to_num } (\text{num_to_pair } x) = x) \wedge \forall(x : \text{num}) (y : \text{num}). \text{num_to_pair } (\text{pair_to_num } (x, y)) = (x, y)$
$\forall(n : \text{num}). (0 : \text{num}) < n \Leftrightarrow \text{count } n \neq (\emptyset : \text{num} \rightarrow \text{bool})$
$\forall(ls : \alpha \text{ list}) (n : \text{num}). n < \text{LENGTH } ls \Rightarrow \text{DROP } n ls = \text{EL } n ls :: \text{DROP } (n + (1 : \text{num})) ls$
$(2 : \text{num}) * \text{tri } (n : \text{num}) = n * (n + (1 : \text{num}))$
$(x : \alpha) \in \text{BIGINTER } (B : (\alpha \rightarrow \text{bool}) \rightarrow \text{bool}) \Leftrightarrow \forall(P : \alpha \rightarrow \text{bool}). P \in B \Rightarrow x \in P$
$\forall(x : \alpha) (s : \alpha \rightarrow \text{bool}). s \text{ DELETE } x \subseteq s$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{FINITE } s \Rightarrow \forall(x : \alpha). x \in s \Leftrightarrow \text{MEM } x (\text{SET_TO_LIST } s)$
$\forall(s1 : \alpha \rightarrow \text{bool}) (s2 : \alpha \rightarrow \text{bool}) (x : \alpha). s1 \subseteq s2 \Rightarrow s1 \text{ DELETE } x \subseteq s2 \text{ DELETE } x$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}). s = (\emptyset : \alpha \rightarrow \text{bool}) \vee \exists(x : \alpha) (t : \alpha \rightarrow \text{bool}). s = x \text{ INSERT } t \wedge x \notin t$
$\forall(s1 : \alpha \rightarrow \text{bool}) (s2 : \alpha \rightarrow \text{bool}). s1 \subseteq s2 \Rightarrow \text{POW } s1 \subseteq \text{POW } s2$
$\text{MAX_SET } (\emptyset : \text{num} \rightarrow \text{bool}) = (0 : \text{num}) \wedge \text{MAX_SET } \{(e : \text{num})\} = e$
$\text{OPTION_MAP } (f : \alpha \rightarrow \beta) (x : \alpha \text{ option}) = (\text{option_CASE } x (\text{NONE} : \beta \text{ option}) ((\text{SOME} : \beta \rightarrow \beta \text{ option}) \circ f) : \beta \text{ option})$
$\forall(R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) (x : \alpha) (y : \alpha). R^* x y \Rightarrow \text{RC } R x y \vee R^+ x y$
$\forall(R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}). (\forall(x : \alpha). R^* x x) \wedge \forall(x : \alpha) (y : \alpha) (z : \alpha). R x y \wedge R^* y z \Rightarrow R^* x z$
$\forall(x : \alpha) (y : \beta). (\text{INR } y : \alpha + \beta) \neq (\text{INL } x : \alpha + \beta)$
$\forall(x : \alpha) (s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \alpha \rightarrow \text{bool}). (x \text{ INSERT } s) \cup t = x \text{ INSERT } s \cup t$
$\forall(n : \text{num}) (l : \alpha \text{ list}). n < \text{LENGTH } l \Rightarrow \text{DROP } n l = \text{EL } n l :: \text{DROP } (\text{SUC } n) l$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{FINITE } s \Leftrightarrow s \text{ HAS_SIZE CARD } s$
$\forall(n : \text{num}) (l : \alpha \text{ list}). n \leq \text{LENGTH } l \Rightarrow \text{LENGTH } (\text{LASTN } n l) = n$
$\forall(\text{opt} : \alpha \text{ option}). \text{IS_SOME } \text{opt} \Leftrightarrow \exists(x : \alpha). \text{opt} = \text{SOME } x$
$\forall(x : \alpha) (\text{sos} : (\alpha \rightarrow \text{bool}) \rightarrow \text{bool}). x \in \text{BIGUNION } \text{sos} \Leftrightarrow \exists(s : \alpha \rightarrow \text{bool}). x \in s \wedge s \in \text{sos}$
$\forall(P : \alpha \rightarrow \text{bool}) (Q : \alpha \rightarrow \text{bool}). \{x \mid P x \vee Q x\} = \{x \mid P x\} \cup \{x \mid Q x\}$
$([] : \alpha \text{ list}) \in (s : \alpha \text{ list} \rightarrow \text{bool}) \Rightarrow \text{longest_prefix } s = ([] : \alpha \text{ list})$
$\forall(R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{SC } (\text{SC } R) = \text{SC } R$
$\forall(a : \alpha \rightarrow \text{bool}) (b : \beta \rightarrow \text{bool}) (c : \beta \rightarrow \text{bool}). \text{FUNSET } a (b \cap c) = \text{FUNSET } a b \cap \text{FUNSET } a c$
$\text{INFINITE } \mathbb{U}(:\alpha) \Leftrightarrow \forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{FINITE } s \Rightarrow \exists(x : \alpha). x \notin s$
$\forall(l : \alpha \text{ list list}). \text{LENGTH } (\text{FLAT } l) = \text{SUM } (\text{MAP } (\text{LENGTH} : \alpha \text{ list} \rightarrow \text{num}) l)$
$\forall(n : \text{num}) (m : \text{num}) (l : \alpha \text{ list}). m \leq n \Rightarrow \text{TAKE } m l ++ \text{TAKE } (n - m) (\text{DROP } m l) = \text{TAKE } n l$
$\forall(x : \alpha) (l : \alpha \text{ list}). \neg \text{NULL } (\text{SNOC } x l)$
$\text{INJ } (f : \alpha \rightarrow \beta) (s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \beta \rightarrow \text{bool}) \Rightarrow \text{FINITE } s \Rightarrow \text{CARD } (\text{IMAGE } f s) = \text{CARD } s$
$\forall(P : \alpha \text{ list} \rightarrow \text{bool}). P ([] : \alpha \text{ list}) \wedge (\forall(l : \alpha \text{ list}). P l \Rightarrow \forall(a : \alpha). P (a :: l)) \Rightarrow \forall(l : \alpha \text{ list}). P l$

$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \alpha \rightarrow \text{bool}). s \text{ DIFF } t \subseteq s$
$\forall(l : \alpha \text{ list}). \text{BUTLASTN} (\text{LENGTH } l) l = ([] : \alpha \text{ list})$
$\forall(p : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}) (l1 : \alpha \text{ list}) (l2 : \beta \text{ list}). \text{LIST_REL } p \ l1 \ l2 \Rightarrow \text{LENGTH } l1 = \text{LENGTH } l2$
$\forall(f : \alpha \rightarrow \beta) (s : \beta \rightarrow \text{bool}). \text{PREIMAGE } f (\text{COMPL } s) = \text{COMPL} (\text{PREIMAGE } f \ s)$
$\text{symmetric } (R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) \wedge=$
$\forall(p : \alpha \rightarrow \text{bool}) (l : \alpha \text{ list}) (m : \text{num}). \text{EVERY } p \ l \Rightarrow \text{EVERY } p (\text{DROP } m \ l)$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \beta \rightarrow \text{bool}). (\exists(f : \alpha \rightarrow \beta). \text{BIJ } f \ s \ t) \Leftrightarrow \exists(g : \beta \rightarrow \alpha). \text{BIJ } g \ t \ s$
$\forall(f : \alpha \rightarrow \beta) (s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \beta \rightarrow \text{bool}). \text{BIJ } f \ s \ t \Rightarrow t = \text{IMAGE } f \ s$
$\forall(l1 : \alpha \text{ list}) (x : \alpha) (l2 : \alpha \text{ list}). l1 ++ \text{SNOC } x \ l2 = \text{SNOC } x (l1 ++ l2)$
$\text{CURRY } (f : \alpha \# \beta \rightarrow \gamma) = \text{CURRY } (g : \alpha \# \beta \rightarrow \gamma) \Leftrightarrow f = g$
$\forall(n : \text{num}) (l : \alpha \text{ list}). n \leq \text{LENGTH } l \Rightarrow \text{TAKE } n \ l = \text{BUTLASTN} (\text{LENGTH } l - n) \ l$
$\forall(x : \alpha). \mathbb{U}(:\alpha) x$
$\forall(m : \text{num}) (n : \text{num}). \text{TAKE } n (\text{TAKE } m (l : \alpha \text{ list})) = \text{TAKE } (\text{MIN } n m) \ l$
$\forall(f : \alpha \rightarrow \beta) (s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{IMAGE } f (s \cup t) = \text{IMAGE } f \ s \cup \text{IMAGE } f \ t$
$(\forall(x : \alpha) (y : \alpha). (R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) x \ y \Rightarrow (f : \alpha \rightarrow \beta) x = f \ y) \Rightarrow \forall(x : \alpha) (y : \alpha). R^+ x \ y \Rightarrow f \ x = f \ y$
$\forall(f : \alpha \rightarrow \beta) (s : \beta \rightarrow \text{bool}) (t : \beta \rightarrow \text{bool}). \text{PREIMAGE } f (s \text{ DIFF } t) = \text{PREIMAGE } f \ s \text{ DIFF } \text{PREIMAGE } f \ t$
$\forall(A : \alpha \rightarrow \text{bool}) (B : \alpha \rightarrow \text{bool}) (x : \alpha). A \cup B \text{ DELETE } x = A \text{ DELETE } x \cup (B \text{ DELETE } x)$
$(\forall(l : \alpha \text{ list}). \text{BUTLASTN} (0 : \text{num}) l = l) \wedge \forall(n : \text{num}) (x : \beta) (l : \beta \text{ list}). \text{BUTLASTN} (\text{SUC } n) (\text{SNOC } x \ l) = \text{BUTLASTN } n \ l$
$\forall(R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) (x : \alpha) (y : \alpha). R \ x \ y \Rightarrow R^\diamond \ x \ y$
$\forall(n : \text{num}) (l : \alpha \text{ list}). n \leq \text{LENGTH } l \Rightarrow \text{TAKE } n (\text{REVERSE } l) = \text{REVERSE } (\text{LASTN } n \ l)$
$\forall(xs : \alpha \text{ option list}) (n : \text{num}) (f : \alpha \rightarrow \beta) (h : \alpha). \text{LUPDATE } (\text{SOME } (f \ h)) n (\text{MAP } (\text{OPTION_MAP } f) \ xs) = \text{MAP } (\text{OPTION_MAP } f) (\text{LUPDATE } (\text{SOME } h) n \ xs)$
$\forall(x : \alpha) (s : \alpha \rightarrow \text{bool}). x \in s \Rightarrow x \text{ INSERT } s \text{ DELETE } x = s$
$\forall(R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{reflexive } R \Rightarrow \text{RC } R = R$
$(\text{OPTION_BIND } (p : \alpha \text{ option}) (f : \alpha \rightarrow \beta \text{ option}) = (\text{NONE} : \beta \text{ option}) \Leftrightarrow p = (\text{NONE} : \alpha \text{ option}) \vee \exists(x : \alpha). p = \text{SOME } x \wedge f \ x = (\text{NONE} : \beta \text{ option})) \wedge (\text{OPTION_BIND } p \ f = \text{SOME } (y : \beta) \Leftrightarrow \exists(x : \alpha). p = \text{SOME } x \wedge f \ x = \text{SOME } y)$
$\forall(l1 : \alpha \text{ list}) (l2 : \alpha \text{ list}). \text{set } l1 \cup \text{set } l2 = \text{set } (l1 ++ l2)$
$\forall(R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) (x : \alpha) (y : \alpha). R^\diamond \ x \ y \Leftrightarrow \exists(u : \alpha). R^\diamond \ x \ u \wedge R^\diamond \ u \ y$
$\text{MIN } (0 : \text{num}) (x : \text{num}) = (0 : \text{num}) \wedge \text{MIN } x (0 : \text{num}) = (0 : \text{num}) \wedge \text{MIN } (\text{NUMERAL } x) (\text{NUMERAL } (y : \text{num})) = \text{NUMERAL } (\text{if } x < y \text{ then } x \text{ else } y)$
$\forall(c : \text{bool}) (x : \text{bool}) (x' : \text{bool}) (y : \text{bool}) (y' : \text{bool}). (x' \Rightarrow x) \wedge (y' \Rightarrow y) \Rightarrow (\text{if } c \text{ then } x' \text{ else } y') \Rightarrow \text{if } c \text{ then } x \text{ else } y$
$\forall(P : \alpha \rightarrow \text{bool}) (s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \alpha \rightarrow \text{bool}). (\forall(x : \alpha). x \in s \cup t \Rightarrow P \ x) \Leftrightarrow (\forall(x : \alpha). x \in s \Rightarrow P \ x) \wedge \forall(x : \alpha). x \in t \Rightarrow P \ x$
$\text{PMATCH_ROW } (p : \beta \rightarrow \gamma) (g : \beta \rightarrow \text{bool}) (r : \beta \rightarrow \alpha) (i : \gamma) = (\text{NONE} : \alpha \text{ option}) \Leftrightarrow \forall(x : \beta). \neg \text{PMATCH_ROW_COND } p \ g \ i \ x$
$\forall(f1 : \alpha \rightarrow \text{bool}) (f2 : \beta \rightarrow \alpha) (l : \beta \text{ list}). \text{FILTER } f1 (\text{MAP } f2 \ l) = \text{MAP } f2 (\text{FILTER } (f1 \circ f2) \ l)$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \alpha \rightarrow \text{bool}) (u : \alpha \rightarrow \text{bool}). s \subseteq t \wedge t \subseteq u \Rightarrow s \subseteq u$
$(\forall(R : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}) (x : \alpha) (y : \beta \text{ option}). \text{OPTREL } R (\text{SOME } x) y \Leftrightarrow \exists(z : \beta). y = \text{SOME } z \wedge R \ x \ z) \wedge \forall(R : \gamma \rightarrow \delta \rightarrow \text{bool}) (x : \gamma \text{ option}) (y : \delta). \text{OPTREL } R x (\text{SOME } y) \Leftrightarrow \exists(z : \gamma). x = \text{SOME } z \wedge R \ z \ y$

$\forall(m : \text{num}) (n : \text{num}). m < \text{SUC } n \Rightarrow m = n \vee m < n$
$\text{tri}(n : \text{num}) = n * (n + (1 : \text{num})) \text{ DIV } (2 : \text{num})$
$\forall(f : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \beta) (e : \beta) (x : \alpha) (l : \alpha \text{ list}). \text{FOLDL } f e (\text{SNOC } x l) = \text{FOLDL } f (f x e) l$
$\forall(l1 : \alpha \text{ list}) (l2 : \beta \text{ list}). \text{LENGTH } l1 = \text{LENGTH } l2 \Rightarrow (\text{ZIP } (l1, l2) = ([] : (\alpha \# \beta) \text{ list}) \Leftrightarrow l1 = ([] : \alpha \text{ list}) \wedge l2 = ([] : \beta \text{ list}))$
$\{x \mid x \in (y : \alpha \rightarrow \text{bool})\} = y$
$\forall(n : \text{num}). n \neq (0 : \text{num}) \Rightarrow \text{COUNT_LIST } n = (0 : \text{num}) :: \text{MAP } \text{SUC } (\text{COUNT_LIST } (n - (1 : \text{num})))$
$\forall(R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) (x : \alpha) (y : \alpha). \text{WF } R \Rightarrow R x y \Rightarrow x \neq y$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \alpha \rightarrow \text{bool}) (u : \alpha \rightarrow \text{bool}). s \cup (t \cup u) = s \cup t \cup u$
$\forall(m : \text{num}) (n : \text{num}). m < \text{SUC } n \Leftrightarrow m = n \vee m < n$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \alpha \rightarrow \text{bool}). s \subset t \Leftrightarrow \exists(x : \alpha). x \notin s \wedge x \in \text{INSERT } s \subseteq t$
$\forall(x : \alpha) (s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \alpha \rightarrow \text{bool}). s \subseteq t \text{ DELETE } x \Leftrightarrow x \notin s \wedge s \subseteq t$
$(\forall(l : \alpha \text{ list}). \text{DROP } (0 : \text{num}) l = l) \wedge \forall(n : \text{num}) (x : \alpha) (l : \alpha \text{ list}). \text{DROP } (\text{SUC } n) (x :: l) = \text{DROP } n l$
$\forall(n : \text{num}) (f : \text{num} \rightarrow \alpha). (0 : \text{num}) < n \Rightarrow \text{HD } (\text{GENLIST } f n) = f (0 : \text{num})$
$\forall(x : \alpha \text{ list}) (y : \beta \text{ list}). \text{LIST_REL } (R : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}) x y \Rightarrow \text{LENGTH } x = \text{LENGTH } y$
$(l1 : \alpha \text{ list}) ++ (l2 : \alpha \text{ list}) = [(e : \alpha)] \Leftrightarrow l1 = [e] \wedge l2 = ([] : \alpha \text{ list}) \vee l1 = ([] : \alpha \text{ list}) \wedge l2 = [e]$
$\forall(b : \alpha \rightarrow \beta) (s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \beta \rightarrow \text{bool}) (x : \alpha) (y : \beta). \text{INJ } b s t \wedge x \notin s \wedge y \notin t \Rightarrow \text{INJ } b (x \mapsto y) (x \text{ INSERT } s) (y \text{ INSERT } t)$
$\forall(n : \text{num}) (x : \alpha) (l : \alpha \text{ list}). \text{ELL } (\text{SUC } n) (\text{SNOC } x l) = \text{ELL } n l$
$\forall(n : \text{num}) (m : \text{num}) (l : \alpha \text{ list}). n + m \leq \text{LENGTH } l \Rightarrow \forall(x : \alpha). \text{SEG } n m (\text{SNOC } x l) = \text{SEG } n m l$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (f : \alpha \rightarrow \beta). (\text{IMAGE } f s = (\emptyset : \beta \rightarrow \text{bool}) \Leftrightarrow s = (\emptyset : \alpha \rightarrow \text{bool})) \wedge ((\emptyset : \beta \rightarrow \text{bool}) = \text{IMAGE } f s \Leftrightarrow s = (\emptyset : \alpha \rightarrow \text{bool}))$
$\forall(L : (\alpha \# \beta) \text{ list}). \text{UNZIP } L = (\text{MAP } (\text{fst} : \alpha \# \beta \rightarrow \alpha) L, \text{MAP } (\text{snd} : \alpha \# \beta \rightarrow \beta) L)$
$\forall(p : \alpha \# \beta) (p' : \alpha \# \beta) (P : \alpha \rightarrow \text{bool}) (P' : \alpha \rightarrow \text{bool}) (Q : \beta \rightarrow \text{bool}) (Q' : \beta \rightarrow \text{bool}). p = p' \wedge (\forall(x : \alpha) (y : \beta). p' = (x, y) \Rightarrow (P x \Leftrightarrow P' x)) \wedge (\forall(x : \alpha) (y : \beta). p' = (x, y) \Rightarrow (Q y \Leftrightarrow Q' y)) \Rightarrow (\text{PROD_ALL } P Q p \Leftrightarrow \text{PROD_ALL } P' Q' p')$
$\text{SET_TO_LIST } (\emptyset : \alpha \rightarrow \text{bool}) = ([] : \alpha \text{ list})$
$\forall(f : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}) (s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \beta \rightarrow \text{bool}). \text{BIGUNION } (\text{IMAGE } f s) \times t = \text{BIGUNION } (\text{IMAGE } (\lambda(n : \alpha). f n \times t) s)$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \alpha \rightarrow \text{bool}) (u : \alpha \rightarrow \text{bool}) (v : \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{DISJOINT } s t \wedge u \subseteq s \wedge v \subseteq t \Rightarrow \text{DISJOINT } u v$
$\text{FST } (p : \alpha \# \beta) = (x : \alpha) \Leftrightarrow \exists(y : \beta). p = (x, y)$
$\forall(x : \alpha \text{ list}) (y : \alpha \text{ list}). x \leq y \Rightarrow \text{LENGTH } x \leq \text{LENGTH } y$
$\forall(x : \alpha). \text{one_CASE } () x = x$
$\forall(A : \alpha \rightarrow \text{bool}) (B : \beta \rightarrow \text{bool}) (C : \alpha \rightarrow \text{bool}) (D : \beta \rightarrow \text{bool}). A \times B \cap (C \times D) = A \cap C \times (B \cap D)$
$\forall(x : \alpha) (y : \alpha). \{y\} x \Leftrightarrow x = y$
$\text{WeakOrder } (\$RSUBSET : (\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}) \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}) \rightarrow \text{bool})$
$\text{INFINITE } \mathbb{U}(\alpha) \Leftrightarrow \exists(f : \alpha \rightarrow \alpha). (\forall(x : \alpha) (y : \alpha). f x = f y \Rightarrow x = y) \wedge \exists(y : \alpha). \forall(x : \alpha). f x \neq y$
$\forall(R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) (x : \alpha) (z : \alpha). R^+ x z \Rightarrow R x z \vee \exists(y : \alpha). R^+ x y \wedge R y z$
$\forall(R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) (\text{RTC}' : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}). (\forall(x : \alpha). \text{RTC}' x x) \wedge (\forall(x : \alpha) (y : \alpha) (z : \alpha). R x y \wedge \text{RTC}' y z \Rightarrow \text{RTC}' x z) \Rightarrow \forall(a0 : \alpha) (a1 : \alpha). R^{*} a0 a1 \Rightarrow \text{RTC}' a0 a1$
$\forall(x : \alpha) (s : \alpha \rightarrow \text{bool}). x \in \text{INSERT } s \neq (\emptyset : \alpha \rightarrow \text{bool})$

$\forall(f : \alpha \rightarrow \beta). \text{PREIMAGE } f \mathbb{U}(:\beta) = \mathbb{U}(:\alpha)$	
$\forall(P : \alpha \rightarrow \text{bool}) (l : \alpha \text{ list}). \text{EXISTS } P l \Leftrightarrow \text{FOLDR } (\lambda(x : \alpha). (l' : \text{bool}). P x \vee l') F l$	
$\text{IDEM } (\text{RC} : (\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) \rightarrow \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool})$	
$\forall(X : \alpha \rightarrow \text{bool}) (P : (\alpha \rightarrow \text{bool}) \rightarrow \text{bool}). \text{BIGUNION } P \subseteq X \Leftrightarrow \forall(Y : \alpha \rightarrow \text{bool}). Y \in P \Rightarrow Y \subseteq X$	
$\forall(f : \alpha \rightarrow \beta) (x : \alpha). \text{IMAGE } f \{x\} = \{f x\}$	
$((\mathbb{U}_r : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}) \sqsubseteq_r (R : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool})) \Leftrightarrow R = (\mathbb{U}_r : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}) \wedge R \subseteq_r (\mathbb{U}_r : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool})$	
$\forall(x : \alpha + \beta). \text{ISL } x \vee \text{ISR } x$	
$\text{transitive } (R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) \Leftrightarrow R \circ_r R \subseteq_r R$	
$\neg F \Leftrightarrow T$	
$\neg((p : \text{bool}) \vee (q : \text{bool})) \Rightarrow \neg p$	
$\text{WF } \$<$	
$\forall(f : \alpha \rightarrow \beta) (g : \beta \rightarrow \gamma) (s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \beta \rightarrow \text{bool}) (u : \gamma \rightarrow \text{bool}). \text{BIJ } f s t \wedge \text{BIJ } g t u \Rightarrow \text{BIJ } (g \circ f) s u$	
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{INFINITE } s \wedge \text{FINITE } t \Rightarrow s \text{ DIFF } t \neq (\emptyset : \alpha \rightarrow \text{bool})$	
$\forall(f : \alpha \rightarrow \beta) (v : \gamma) (p : \beta \rightarrow \gamma) (g : \beta \rightarrow \text{bool}) (p' : \alpha \rightarrow \gamma) (g' : \alpha \rightarrow \text{bool}).$ $\neg \text{PMATCH_ROW_COND_EX } v p g \Rightarrow (\forall(x : \alpha). p' x = p (f x)) \Rightarrow (\text{PMATCH_ROW_COND_EX } v p' g' \Leftrightarrow \text{PMATCH_ROW_COND_EX } v p' (\lambda(x : \alpha). g' x \wedge \neg g (f x)))$	
$\forall(f : \alpha \rightarrow \beta) (l : \alpha \text{ list list}). \text{MAP } f (\text{FLAT } l) = \text{FLAT } (\text{MAP } (\text{MAP } f) l)$	
$\forall(m : \text{num}) (n : \text{num}). \text{SUC } m = \text{SUC } n \Rightarrow m = n$	
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (x : \alpha). x \notin s \Rightarrow s \text{ DELETE } x = s$	
$\forall(l1 : \alpha \text{ list}) (x : \alpha) (l2 : \alpha \text{ list}). \text{SNOC } x l1 ++ l2 = l1 ++ x :: l2$	
$\text{pairwise } (R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) ((s1 : \alpha \rightarrow \text{bool}) \cup (s2 : \alpha \rightarrow \text{bool})) \Leftrightarrow \text{pairwise } R s1 \wedge \text{pairwise } R s2 \wedge \forall(x : \alpha) (y : \alpha). x \in s1 \wedge y \in s2 \Rightarrow R x y \wedge R y x$	
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \alpha \rightarrow \text{bool}). s \subseteq t \Leftrightarrow s \cap t = s$	
$\forall(l : \alpha \text{ list}). \text{REVERSE } l = \text{FOLDR } (\text{SNOC} : \alpha \rightarrow \alpha \text{ list} \rightarrow \alpha \text{ list}) ([] : \alpha \text{ list}) l$	
$\forall(x : \alpha \# \beta). \exists(q : \alpha) (r : \beta). x = (q, r)$	
$\forall(P : \alpha \rightarrow \text{bool}) (Q : \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{BIGINTER } \{P; Q\} = P \cap Q$	
$\forall(m : \alpha) (n : \alpha). (\lambda(x : \alpha). (y : \alpha). y = (f : \alpha \rightarrow \alpha) x)^* (f m) n \Leftrightarrow (\lambda(x : \alpha). (y : \alpha). y = f x)^+ m n$	
$\forall(xs : \alpha \text{ list}) (n : \text{num}) (k : \text{num}). \text{DROP } n (\text{TAKE } k xs) = \text{TAKE } (k - n) (\text{DROP } n xs)$	
$\forall(n : \text{num}) (l2 : \alpha \text{ list}). n < \text{LENGTH } l2 \Rightarrow \forall(l1 : \alpha \text{ list}). \text{ELL } n (l1 ++ l2) = \text{ELL } n l2$	
$(\emptyset_r : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) \sqsubseteq_r (R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) \wedge (R \subseteq_r (\emptyset_r : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool})) \Leftrightarrow R = (\emptyset_r : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool})$	
$\forall(P : \alpha \rightarrow \text{bool}) (ls : \alpha \text{ list}). \text{EXISTS } (\$- \circ P) ls \Rightarrow \text{LENGTH } (\text{FILTER } P ls) < \text{LENGTH } ls$	
$\text{LIST_BIND } (l : \alpha \text{ list}) (\lambda(x : \alpha). [x]) = l$	
$(\text{some}(x : \text{bool}). \neg x) = \text{SOME } F$	
$\forall(x : \alpha) (s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \alpha \rightarrow \text{bool}). s \subseteq x \text{ INSERT } t \Leftrightarrow s \text{ DELETE } x \subseteq t$	
$\forall(P : \alpha + \beta \rightarrow \text{bool}). (\forall(x : \alpha). P (\text{INL } x : \alpha + \beta)) \wedge (\forall(y : \beta). P (\text{INR } y : \alpha + \beta)) \Rightarrow \forall(s : \alpha + \beta). P s$	
$\forall(P : \alpha \rightarrow \text{bool}) (a : \alpha) (s : \alpha \rightarrow \text{bool}). (\forall(x : \alpha). x \in a \text{ INSERT } s \Rightarrow P x) \Leftrightarrow P a \wedge \forall(x : \alpha). x \in s \Rightarrow P x$	
$(\forall(x : \alpha). (P : \alpha \rightarrow \text{bool}) x \Rightarrow (Q : \alpha \rightarrow \text{bool}) x) \Rightarrow \text{EVERY } P (l : \alpha \text{ list}) \Rightarrow \text{EVERY } Q l$	
$(\text{LIST_REL } (R : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}) ([] : \alpha \text{ list}) (y : \beta \text{ list})) \Leftrightarrow y = ([] : \beta \text{ list}) \wedge (\text{LIST_REL } R (x : \alpha \text{ list}) ([] : \beta \text{ list})) \Leftrightarrow x = ([] : \alpha \text{ list})$	

$\forall(l : \text{bool list}). \text{OR_EL } l \Leftrightarrow \text{FOLDL } \$\backslash\backslash F \mid l$
$\forall(R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{antisymmetric } (R \circ R) \Leftrightarrow \text{antisymmetric } R$
$(\forall(x : \alpha) (y : \alpha). (R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) x y \Rightarrow (f : \alpha \rightarrow \beta) x = f y) \Rightarrow \forall(x : \alpha) (y : \alpha). R^* x y \Rightarrow f x = f y$
$\forall(x : \alpha) (s : \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{PREIMAGE } (K x : \beta \rightarrow \alpha) s = \text{if } x \in s \text{ then } U(\beta) \text{ else } (\emptyset : \beta \rightarrow \text{bool})$
$\forall(xs : \alpha \text{ list}) (i : \text{num}) (n : \text{num}) (x : \alpha). oEL n (LUPDATE x i xs) = \text{if } i \neq n \text{ then } oEL n xs \text{ else if } i < \text{LENGTH } xs \text{ then SOME } x \text{ else (NONE : } \alpha \text{ option)}$
$\forall(R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{reflexive } R^*$
$(\text{list_CASE } (x : \alpha \text{ list}) (v : \beta) (f : \alpha \rightarrow \alpha \text{ list} \rightarrow \beta) : \beta) = (v' : \beta) \Leftrightarrow x = ([] : \alpha \text{ list}) \wedge v = v' \vee \exists(a : \alpha) (l : \alpha \text{ list}). x = a :: l \wedge f a l = v'$
$\forall(n : \text{num}) (l : \alpha \text{ list}). n \leq \text{LENGTH } l \Rightarrow \text{LASTN } n (\text{REVERSE } l) = \text{REVERSE } (\text{TAKE } n l)$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \alpha \rightarrow \text{bool}). s \subseteq t \wedge t \subseteq s \Leftrightarrow s = t$
$(p : \text{bool}) \wedge (q : \text{bool}) \Rightarrow q$
$\forall(P : \alpha \rightarrow \text{bool}) (ls : \alpha \text{ list}). \text{dropWhile } P ls = ([] : \alpha \text{ list}) \Leftrightarrow \text{EVERY } P ls$
$\forall(p : \alpha \rightarrow \text{bool}) (q : \alpha \rightarrow \text{bool}). p \cap q \cup \text{COMPL } p \cap q = q$
$((p : \text{bool}) \Leftrightarrow (q : \text{bool})) \Rightarrow (r : \text{bool}) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee \neg r) \wedge (\neg q \vee r \vee \neg p)$
$(\text{pair_CASE } ((x : \beta), (y : \gamma)) (f : \beta \rightarrow \gamma \rightarrow \alpha) : \alpha) = f x y$
$\forall(s1 : (\alpha \rightarrow \text{bool}) \rightarrow \text{bool}) (s2 : (\alpha \rightarrow \text{bool}) \rightarrow \text{bool}). \text{BIGUNION } (s1 \cup s2) = \text{BIGUNION } s1 \cup \text{BIGUNION } s2$
$\text{FINITE } (s : \alpha \rightarrow \text{bool}) \wedge \text{SURJ } (f : \alpha \rightarrow \beta) s (t : \beta \rightarrow \text{bool}) \Rightarrow \text{FINITE } t$
$\text{OPTION_MAP } (f : \gamma \rightarrow \beta) (\text{OPTION_MAP } (g : \alpha \rightarrow \gamma) (x : \alpha \text{ option})) = \text{OPTION_MAP } (f \circ g) x$
$\forall(f : \text{num} \rightarrow \alpha) (n : \text{num}). \text{set } (\text{GENLIST } f n) = \text{IMAGE } f (\text{count } n)$
$\forall(m : \text{num}) (n : \text{num}). m = n \vee m < n \Rightarrow m < \text{SUC } n$
$\text{REVERSE } (l : \alpha \text{ list}) = [(e : \alpha)] \Leftrightarrow l = [e]$
$\forall(n : \text{num}). \text{SUM_SET } \{n\} = n$
$\forall(f1 : \text{num} \rightarrow \text{num} \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) (f2 : \text{num} \rightarrow \text{num} \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{ind_type\$INJF } f1 = \text{ind_type\$INJF } f2 \Leftrightarrow f1 = f2$
$\text{LIST_REL } (R : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}) ((h : \alpha) :: (t : \alpha \text{ list})) (xs : \beta \text{ list}) \Leftrightarrow \exists(h' : \beta) (t' : \beta \text{ list}). xs = h' :: t' \wedge R h h' \wedge \text{LIST_REL } R t t'$
$\forall(n : \text{num}) (l : \alpha \text{ list}). n \leq \text{LENGTH } l \Rightarrow \forall(x : \alpha). \text{DROP } n (\text{SNOC } x l) = \text{SNOC } x (\text{DROP } n l)$
$\forall(x : \alpha) (y : \beta). \text{FST } (x, y) = x$
$\text{is_measure_maximal } (m : \alpha \rightarrow \text{num}) \{(x : \alpha)\} (y : \alpha) \Leftrightarrow y = x$
$\forall(P : \alpha \rightarrow \text{bool}) (l : \alpha \text{ list}). \text{EXISTS } P l \Leftrightarrow \neg \text{EVERY } (\lambda(x : \alpha). \neg P x) l$
$\forall(x : \alpha \text{ option}). \text{IS_NONE } x \Leftrightarrow x = (\text{NONE} : \alpha \text{ option})$
$\forall(x : \text{bool}) (x' : \text{bool}) (y : \text{bool}) (y' : \text{bool}). (y \Rightarrow x \Rightarrow x') \wedge (x' \Rightarrow y \Rightarrow y') \Rightarrow x \wedge y \Rightarrow x' \wedge y'$
$(R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) \text{equiv_on } (s : \alpha \rightarrow \text{bool}) \Rightarrow (\emptyset : \alpha \rightarrow \text{bool}) \notin \text{partition } R s$
$\forall(R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) (x : \alpha) (y : \alpha). R x y \Rightarrow \text{RC } R x y$
$\forall(a : \alpha \text{ list}) (b : \alpha \text{ list}) (c : \alpha \text{ list}). a \leq b ++ c \Rightarrow a \leq b \vee b \leq c$
$\forall(n : \text{num}). \text{set } (\text{COUNT_LIST } n) = \text{count } n$
$\forall(x : \alpha \text{ option option}) (y : \alpha). \text{OPTION_JOIN } x = \text{SOME } y \Leftrightarrow x = \text{SOME } (\text{SOME } y)$
$\neg(A : \text{bool}) \Rightarrow F \Leftrightarrow A$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{REST } s \subseteq s$
$\forall(R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) (f : \beta \rightarrow \alpha). \text{symmetric } R \Rightarrow \text{symmetric } (\text{inv_image } R f)$
$\forall(R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{RC } (R \circ R) = R \circ R$

$\text{PRE}(0 : \text{num}) = (0 : \text{num}) \wedge \forall(m : \text{num}). \text{PRE}(\text{SUC } m) = m$
$\forall(l : \alpha \text{ list}). \text{TAKE}(\text{LENGTH } l) l = l$
$\forall(f : \alpha \rightarrow \beta) (x : \alpha \# \beta) (ls : \alpha \text{ list}). \text{ALL_DISTINCT } ls \Rightarrow (\text{MEM } x (\text{ZIP } (ls, \text{MAP } f ls)) \Leftrightarrow \text{MEM } (\text{FST } x) ls \wedge \text{SND } x = f (\text{FST } x))$
$\text{LIST_BIND } (l : \alpha \text{ list list}) (\lambda(x : \alpha \text{ list}). x) = \text{FLAT } l \wedge \text{LIST_BIND } l (l : \alpha \text{ list} \rightarrow \alpha \text{ list}) = \text{FLAT } l$
$\forall(v_{\text{old}} : \alpha) (v_{\text{new}} : \beta) (\text{rows}_{\text{old}} : (\alpha \rightarrow \gamma \text{ option}) \text{ list}) (\text{rows}_{\text{new}} : (\beta \rightarrow \gamma \text{ option}) \text{ list}) (r_{\text{old}} : \alpha \rightarrow \gamma \text{ option}). r_{\text{old}} v_{\text{old}} = (\text{NONE} : \gamma \text{ option}) \Rightarrow \text{PMATCH } v_{\text{old}} \text{ rows}_{\text{old}} = \text{PMATCH } v_{\text{new}} \text{ rows}_{\text{new}} \Rightarrow \text{PMATCH } v_{\text{old}} (r_{\text{old}} : \text{rows}_{\text{old}}) = \text{PMATCH } v_{\text{new}} \text{ rows}_{\text{new}}$
$\forall(x_1 : \alpha \text{ option}) (x_2 : \alpha \text{ option}) (y_1 : \beta \text{ option}) (y_2 : \beta \text{ option}) (f_1 : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \gamma) (f_2 : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \gamma). x_1 = x_2 \wedge y_1 = y_2 \wedge (\forall(x : \alpha) (y : \beta). x_2 = \text{SOME } x \wedge y_2 = \text{SOME } y \Rightarrow f_1 x y = f_2 x y) \Rightarrow \text{OPTION_MAP2 } f_1 x_1 y_1 = \text{OPTION_MAP2 } f_2 x_2 y_2$
$\forall(l_1 : \alpha \text{ list}) (l_2 : \alpha \text{ list}). l_1 = \text{REVERSE } l_2 \Leftrightarrow l_2 = \text{REVERSE } l_1$
$\forall(x : \alpha) (y : \beta) (l : (\alpha \# \beta) \text{ list}). \text{MEM } (x, y) l \Rightarrow \exists(z : \alpha \# \beta). x = \text{FST } z \wedge \text{MEM } z l$
$\$? (\text{UNCURRY } (\lambda(x : \alpha). (P : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}) x)) \Leftrightarrow \exists(x : \alpha). \$? (P x)$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}). s \subseteq \mathbb{U}(:\alpha)$
$\forall(f : \alpha \rightarrow \text{num}) (g : \alpha \rightarrow \text{num}) (ls : \alpha \text{ list}). \text{SUM } (\text{MAP } (\lambda(x : \alpha). f x + g x) ls) = \text{SUM } (\text{MAP } f ls) + \text{SUM } (\text{MAP } g ls)$
$(\forall(p : \alpha \# \beta). (P : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}) (\text{FST } p) (\text{SND } p)) \Leftrightarrow \forall(p_1 : \alpha) (p_2 : \beta). P p_1 p_2$
$\forall(P : \alpha \rightarrow \text{bool}) (L : \alpha \text{ list}) (x : \alpha). \text{MEM } x (\text{FILTER } P L) \Leftrightarrow P x \wedge \text{MEM } x L$
$\forall(j : \text{num}) (n : \text{num}) (h : \alpha) (t : \alpha \text{ list}). (0 : \text{num}) < j \wedge n + j \leq \text{LENGTH } t + (1 : \text{num}) \Rightarrow \text{SEG } n j (h :: t) = \text{SEG } n (j - (1 : \text{num})) t$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \alpha \rightarrow \text{bool}). s \text{ DIFF } t = s \cap \text{COMPL } t$
$(\$PSUBSET : (\alpha \rightarrow \text{bool}) \rightarrow (\alpha \rightarrow \text{bool}) \rightarrow \text{bool})^{\diamond} = (\$SUBSET : (\alpha \rightarrow \text{bool}) \rightarrow (\alpha \rightarrow \text{bool}) \rightarrow \text{bool})$
$\forall(h : \alpha) (t : \alpha \text{ list}). \text{TL } (h :: t) = t$
$\forall(l : \alpha \text{ list}). l \neq ([] : \alpha \text{ list}) \Rightarrow \text{LENGTH } (\text{FRONT } l) = \text{PRE } (\text{LENGTH } l)$
$\forall(l : \alpha \text{ list}). l = ([] : \alpha \text{ list}) \vee \exists(h : \alpha) (t : \alpha \text{ list}). l = h :: t$
$((p : \text{bool}) \Leftrightarrow ((q : \text{bool}) \Leftrightarrow (r : \text{bool}))) \Leftrightarrow (p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg r \vee \neg q) \wedge (q \vee \neg r \vee \neg p) \wedge (r \vee \neg q \vee \neg p)$
$\mathbb{U}(:\alpha) \neq (\emptyset : \alpha \rightarrow \text{bool})$
$((((f : (\alpha \rightarrow \beta) \text{ option}) <*> \text{SOME } (x : \alpha)) : \beta \text{ option}) = ((\text{SOME } (\lambda(f : \alpha \rightarrow \beta). f x) <*> f) : \beta \text{ option})$
$((a : \alpha), (b : \beta)) \in \{((x : \alpha), y) \mid (P : \beta \rightarrow \text{bool}) y\} \Leftrightarrow P b \wedge a = x$
$\forall(x : \alpha + \beta). \neg \text{ISL } x \Leftrightarrow \text{ISR } x$
$\forall(n : \text{num}). \text{LENGTH } (\text{FLAT } (\text{REPLICATE } n (ls : \alpha \text{ list}))) = n * \text{LENGTH } ls$
$\text{LIST_BIND } (\text{MAP } (f : \gamma \rightarrow \beta) (l : \gamma \text{ list})) (g : \beta \rightarrow \alpha \text{ list}) = \text{LIST_BIND } l (g \circ f)$
$\forall(f : \alpha \rightarrow \beta). (\forall(x : \alpha) (y : \alpha). f x = f y \Rightarrow x = y) \Rightarrow \forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{INFINITE } s \Rightarrow \text{INFINITE } (\text{IMAGE } f s)$
$\forall(n : \text{num}) (f : \text{num} \rightarrow \alpha). \text{NULL } (\text{GENLIST } f n) \Leftrightarrow n = (0 : \text{num})$
$(\forall(x : \alpha) (y : \alpha). (R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) x y \Rightarrow (Q : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) x y) \Rightarrow \text{RC } R (x : \alpha) (y : \alpha) \Rightarrow \text{RC } Q x y$
$\forall(P : \alpha \rightarrow \text{bool}) (Q : \alpha \rightarrow \text{bool}). P \subseteq Q \Rightarrow \forall(x : \alpha). x \in P \Rightarrow x \in Q$
$\forall(x : \alpha) (s : \alpha \rightarrow \text{bool}). x \text{ INSERT } x \text{ INSERT } s = x \text{ INSERT } s$
$\forall(l : \alpha \text{ list}). \text{REVERSE } (\text{REVERSE } l) = l$

ind_type\$ISO ($\lambda(x:\alpha). x$) ($\lambda(x:\alpha). x$)
$\forall(s:\alpha \rightarrow \text{bool}) (t:\alpha \rightarrow \text{bool}). s = t \Leftrightarrow s \subseteq t \wedge t \subseteq s$
$\forall(R:\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) (P:\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}). (\forall(x:\alpha). P x x) \wedge (\forall(x:\alpha) (y:\alpha) (z:\alpha). P x y \wedge R y z \Rightarrow P x z) \Rightarrow \forall(x:\alpha) (y:\alpha). R^{\diamond} x y \Rightarrow P x y$
EVERY ($P:\alpha \rightarrow \text{bool}$) (FLAT ($I_s:\alpha \text{ list list}$)) \Leftrightarrow EVERY (EVERY P) I_s
$(\forall(l:\alpha \text{ list}). \text{LASTN}(0:\text{num}) l = ([]:\alpha \text{ list})) \wedge (\forall(n:\text{num}) (x:\beta) (l:\beta \text{ list}). \text{LASTN}(\text{SUC } n)(\text{SNOC } x l) = \text{SNOC } x (\text{LASTN } n l))$
$((\forall(n:\text{num}). \neg(P:\text{num} \rightarrow \text{bool}) n) \Rightarrow (Q:\text{num option} \rightarrow \text{bool}) (\text{NONE}:\text{num option})) \wedge (\forall(n:\text{num}). P n \wedge (\forall(m:\text{num}). m < n \Rightarrow \neg P m) \Rightarrow Q (\text{SOME } n)) \Rightarrow Q (\$OLEAST P)$
$(\forall(l:\alpha \text{ list}). l ++ ([]:\alpha \text{ list}) = l) \wedge \forall(l:\beta \text{ list}). ([]:\beta \text{ list}) ++ l = l$
$\forall(c:\text{bool}) (l:\alpha \text{ list}). \text{EVERY} (\lambda(x:\alpha). c) l \Leftrightarrow l = ([]:\alpha \text{ list}) \vee c$
$\forall(s:\alpha \rightarrow \text{bool}) (t:\alpha \rightarrow \text{bool}). s \neq t \Leftrightarrow \exists(x:\alpha). x \in t \Leftrightarrow x \notin s$
PMATCH ($v:\beta$) (rows :($\beta \rightarrow \alpha \text{ option}$) list) = PMATCH v (SNOC (PMATCH_ROW ($\lambda(_0:\beta).$ $_0$) ($\lambda(_0:\beta).$ T) ($\lambda(_0:\beta).$ (ARB : α))) rows)
$\forall(x:\alpha \# \beta) (l:(\alpha \# \beta) \text{ list}). \text{UNZIP} (\text{SNOC } x l) = (\text{SNOC} (\text{FST } x) (\text{FST} (\text{UNZIP } l)), \text{SNOC} (\text{SND } x) (\text{SND} (\text{UNZIP } l)))$
$\forall(X:\alpha). (P:\text{bool}) \Leftrightarrow \text{Case } X \Rightarrow P$
$(\forall(l:\alpha \text{ list}). (P:\alpha \text{ list} \rightarrow \text{bool}) l) \Leftrightarrow P ([]:\alpha \text{ list}) \wedge \forall(h:\alpha) (t:\alpha \text{ list}). P (h::t)$
$\forall(f:\alpha \rightarrow \beta). (\forall(s:\beta \rightarrow \text{bool}). \text{BIJ } f (\emptyset:\alpha \rightarrow \text{bool}) s \Leftrightarrow s = (\emptyset:\beta \rightarrow \text{bool})) \wedge \forall(s:\alpha \rightarrow \text{bool}). \text{BIJ } f s (\emptyset:\beta \rightarrow \text{bool}) \Leftrightarrow s = (\emptyset:\alpha \rightarrow \text{bool})$
$\forall(P:\alpha \rightarrow \text{bool}) (f:\beta \rightarrow \alpha) (s:\beta \rightarrow \text{bool}). (\forall(y:\alpha). y \in \text{IMAGE } f s \Rightarrow P y) \Leftrightarrow \forall(x:\beta). x \in s \Rightarrow P (f x)$
$\forall(s:\alpha \rightarrow \text{bool}). \text{INJ} (\lambda(x:\alpha). x) s s$
$\forall(f:\alpha \rightarrow \beta) (s:\alpha \rightarrow \text{bool}) (t:\beta \rightarrow \text{bool}). \text{INJ } f s t \Rightarrow \forall(e:\alpha). e \in s \Rightarrow \text{INJ } f (s \text{ DELETE } e) (t \text{ DELETE } f e)$
$\forall(P:\alpha \rightarrow \text{bool}) (l:\alpha \text{ list}). \text{EVERY} (\lambda(x:\alpha). \neg P x) l \Rightarrow \text{SPLITP } P l = (l, ([]:\alpha \text{ list}))$
$\forall(x:\alpha \rightarrow \text{bool}) (y:\text{bool}). x \subseteq (K y:\alpha \rightarrow \text{bool}) \Leftrightarrow x \subseteq (\emptyset:\alpha \rightarrow \text{bool}) \vee y$
$\forall(a1:\alpha) (a2:\alpha). \text{ind_type$INJA } a1 = \text{ind_type$INJA } a2 \Leftrightarrow a1 = a2$
$\forall(R:\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}). (\text{SC } R)^T = \text{SC } R \wedge \text{SC } R^T = \text{SC } R$
$\forall(s:\alpha \rightarrow \text{bool}) (P:(\alpha \rightarrow \text{bool}) \rightarrow \text{bool}). \text{BIGUNION} (s \text{ INSERT } P) = s \cup \text{BIGUNION } P$
$\forall(t:\text{bool}). T \Rightarrow t \Leftrightarrow t$
$\forall(B:\alpha \rightarrow \text{bool}) (C:\alpha \rightarrow \alpha) (R:\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{WFR } R \wedge (\forall(s:\alpha). B s \Rightarrow R (C s) s) \Rightarrow \forall(P:\alpha \rightarrow \text{bool}). (\forall(s:\alpha). (B s \Rightarrow P (C s)) \Rightarrow P s) \Rightarrow \forall(v:\alpha). P v$
WF ($\emptyset_r:\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}$)
$\text{ZIP} (([]:\gamma \text{ list}), ([]:\delta \text{ list})) = ([]:(\gamma \# \delta) \text{ list}) \wedge \forall(x1:\alpha) (l1:\alpha \text{ list}) (x2:\beta) (l2:\beta \text{ list}). \text{ZIP} (x1::l1, x2::l2) = (x1, x2)::\text{ZIP} (l1, l2)$
$\forall(x:\alpha) (L:\alpha \text{ list list}). \text{MEM } x (\text{FLAT } L) \Leftrightarrow \exists(l:\alpha \text{ list}). \text{MEM } l L \wedge \text{MEM } x l$
GSPEC ($f:\beta \rightarrow \alpha \# \text{bool}$) = IMAGE (($\text{FST}:\alpha \# \text{bool} \rightarrow \alpha$) $\circ f$) (($\text{SND}:\alpha \# \text{bool} \rightarrow \text{bool}$) $\circ f$)
$\forall(\text{adjacent'}:\alpha \text{ list} \rightarrow \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}). (\forall(a:\alpha) (b:\alpha) (t:\alpha \text{ list}). \text{adjacent'}(a::b::t) a b) \wedge (\forall(a:\alpha) (b:\alpha) (h:\alpha) (t:\alpha \text{ list}). \text{adjacent'} t a b \Rightarrow \text{adjacent'}(h::t) a b) \Rightarrow \forall(a0:\alpha \text{ list}) (a1:\alpha) (a2:\alpha). \text{adjacent } a0 a1 a2 \Rightarrow \text{adjacent'} a0 a1 a2$
$\forall(m:\text{num}) (n:\text{num}) (l:\alpha \text{ list}). n + m \leq \text{LENGTH } l \Rightarrow \text{BUTLASTN } n (\text{BUTLASTN } m l) = \text{BUTLASTN } (n + m) l$
trichotomous (RC ($R:\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}$)) \Leftrightarrow trichotomous R

$\forall(n : \text{num}) (l : \alpha \text{ list}). n \leq \text{LENGTH } l \Rightarrow \text{BUTLASTN } n (\text{REVERSE } l) = \text{REVERSE } (\text{DROP } n l)$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \alpha \rightarrow \text{bool}). s \text{ DIFF } t = (\emptyset : \alpha \rightarrow \text{bool}) \Leftrightarrow s \subseteq t$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \alpha \rightarrow \text{bool}). s \subseteq t \Rightarrow t \cap s = s$
$\forall(f : \beta \rightarrow \gamma) (g : \alpha \rightarrow \beta). \text{MAP } (f \circ g) = \text{MAP } f \circ \text{MAP } g$
$(\forall(x : \text{unit}). (P : \text{unit} \rightarrow \text{bool}) x) \Leftrightarrow P ()$
$\forall(f : 'z \rightarrow 'z). \text{INVOL } f \Rightarrow \forall(a : 'z) (b : 'z). f a = b \Leftrightarrow a = f b$
$\text{OPTION_CHOICE } (m1 : \alpha \text{ option}) (m2 : \alpha \text{ option}) = (\text{NONE} : \alpha \text{ option}) \Leftrightarrow m1 = (\text{NONE} : \alpha \text{ option}) \wedge m2 = (\text{NONE} : \alpha \text{ option})$
$\forall(l : \alpha \text{ list}) (n : \text{num}). \text{LENGTH } l = \text{SUC } n \Leftrightarrow \exists(h : \alpha) (l' : \alpha \text{ list}). \text{LENGTH } l' = n \wedge l = h :: l'$
$\forall(R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) (x : \alpha) (y : \alpha). R^* x y \Leftrightarrow x = y \vee \exists(u : \alpha). R^* x u \wedge R u y$
$(\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \alpha \rightarrow \text{bool}). s \cap t \subseteq s) \wedge \forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \alpha \rightarrow \text{bool}). t \cap s \subseteq s$
reflexive (\$SUBSET : (\alpha \rightarrow \text{bool}) \rightarrow (\alpha \rightarrow \text{bool}) \rightarrow \text{bool}\$)
$\forall(xs : \alpha \text{ list}) (n : \text{num}) (y : \alpha). oEL n xs = \text{SOME } y \Leftrightarrow n < \text{LENGTH } xs \wedge y = EL n xs$
$\forall(s : \beta \rightarrow \text{bool}). \text{FUNSET } (\emptyset : \alpha \rightarrow \text{bool}) s = \mathbb{U}(\alpha \rightarrow \beta)$
$\forall(l1 : \alpha \text{ list list}) (l2 : \alpha \text{ list list}). \text{FLAT } (l1 ++ l2) = \text{FLAT } l1 ++ \text{FLAT } l2$
$\text{FLAT } ([] : \alpha \text{ list list}) = ([] : \alpha \text{ list}) \wedge \text{FLAT } ([] : \beta \text{ list}) :: (t : \beta \text{ list list}) = \text{FLAT } t \wedge \text{FLAT } ((h : \gamma) :: (t1 : \gamma \text{ list}) :: (t2 : \gamma \text{ list list})) = h :: \text{FLAT } (t1 :: t2)$
$\forall(P : \alpha \rightarrow \text{bool}) (x : \alpha) (l : \alpha \text{ list}). \text{FILTER } P (SNOC x l) = \text{if } P x \text{ then } SNOC x (\text{FILTER } P l) \text{ else FILTER } P l$
$\forall(x : \alpha). (\emptyset : \alpha \rightarrow \text{bool}) \neq \{x\}$
$(\exists(l : \alpha \text{ list}). (P : \alpha \text{ list} \rightarrow \text{bool}) l) \Leftrightarrow P ([] : \alpha \text{ list}) \vee \exists(h : \alpha) (t : \alpha \text{ list}). P (h :: t)$
$\text{ind_type\$ISO } (f : \alpha \rightarrow \beta) (g : \beta \rightarrow \alpha) \Rightarrow (\forall(P : \alpha \rightarrow \text{bool}). (\forall(x : \alpha). P x) \Leftrightarrow \forall(x : \beta). P (g x)) \wedge (\forall(P : \alpha \rightarrow \text{bool}). (\exists(x : \alpha). P x) \Leftrightarrow \exists(x : \beta). P (g x)) \wedge \forall(a : \alpha) (b : \beta). a = g b \Leftrightarrow f a = b$
$\forall(f : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \beta) (b : \beta). \text{ITSET } f (\emptyset : \alpha \rightarrow \text{bool}) b = b$
$(\forall(x : \alpha) (xs : \alpha \text{ list}). \text{FRONT } (x :: xs) = ([] : \alpha \text{ list}) \Leftrightarrow xs = ([] : \alpha \text{ list})) \wedge (\forall(x : \alpha) (xs : \alpha \text{ list}). ([] : \alpha \text{ list}) = \text{FRONT } (x :: xs) \Leftrightarrow xs = ([] : \alpha \text{ list})) \wedge \forall(x : \alpha) (xs : \alpha \text{ list}). \text{NULL } (\text{FRONT } (x :: xs)) \Leftrightarrow \text{NULL } xs$
$(0 : \text{num}) < \text{SUC } (0 : \text{num})$
$\forall(e : \alpha) (l : \alpha \text{ list}) (h : \alpha). \text{MEM } e l \wedge e \neq \text{LAST } (h :: l) \Rightarrow \text{MEM } e (\text{FRONT } (h :: l))$
$\forall(f : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \alpha) (e : \alpha) (P : \beta \rightarrow \text{bool}) (l : \beta \text{ list}). \text{FOLDL } f e (\text{FILTER } P l) = \text{FOLDL } (\lambda(x : \alpha) (y : \beta). \text{if } P y \text{ then } f x y \text{ else } x) e l$
$\forall(x : \alpha \text{ list}). ([] : \alpha \text{ list}) \leqslant x \wedge (x \leqslant ([] : \alpha \text{ list}) \Leftrightarrow x = ([] : \alpha \text{ list}))$
$\forall(x : \alpha). \text{FINITE } \{x\}$
$\forall(f : (\alpha \rightarrow \text{bool}) \rightarrow \text{bool}) (g : (\alpha \rightarrow \text{bool}) \rightarrow \text{bool}). f \subseteq g \Rightarrow \text{BIGUNION } f \subseteq \text{BIGUNION } g$
$\forall(l1 : \alpha \text{ list}) (l2 : \alpha \text{ list}). \text{REVERSE } l1 = \text{REVERSE } l2 \Leftrightarrow l1 = l2$
$\forall(a1 : \alpha \text{ list}) (a0 : \alpha). ([] : \alpha \text{ list}) \neq a0 :: a1$
DROP (0 : num) (l : alpha list) = l
$\forall(l : \alpha \text{ list}) (n1 : \text{num}) (n2 : \text{num}). \text{ALL_DISTINCT } l \wedge n1 < \text{LENGTH } l \wedge n2 < \text{LENGTH } l \Rightarrow (\text{EL } n1 l = \text{EL } n2 l \Leftrightarrow n1 = n2)$
$\forall(ls : \alpha \text{ list list}). \text{set } (\text{FLAT } ls) = \text{BIGUNION } (\text{set } (\text{MAP } (\text{set} : \alpha \text{ list} \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) ls))$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{FINITE } s \Rightarrow \forall(x : \alpha). \text{MEM } x (\text{SET_TO_LIST } s) \Leftrightarrow x \in s$
$\forall(f : \alpha \rightarrow \gamma) (g : \beta \rightarrow \delta) (z : \alpha + \beta). \text{SUM_MAP } f g z = (\text{sum_CASE } z ((\text{INL } : \gamma \rightarrow \gamma + \delta) \circ f) ((\text{INR } : \delta \rightarrow \gamma + \delta) \circ g) : \gamma + \delta)$
$(\emptyset : \alpha \rightarrow \text{bool}) \neq \mathbb{U}(\alpha)$

$\forall(ls : \alpha \text{ list}) (n : \text{num}). \text{ALL_DISTINCT } ls \Rightarrow \text{ALL_DISTINCT} (\text{DROP } n \ ls)$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{DISJOINT } s \ t \Leftrightarrow \neg \exists(x : \alpha). x \in s \wedge x \in t$
$\forall(P : \alpha \rightarrow \text{bool}) (Q : \alpha \rightarrow \text{bool}). \{x \mid P \ x \wedge Q \ x\} = \{x \mid P \ x\} \cap \{x \mid Q \ x\}$
$\forall(P : \alpha \rightarrow \text{bool}) (l : \alpha \text{ list}). \text{FILTER } P \ l \neq ([] : \alpha \text{ list}) \Leftrightarrow \exists(x : \alpha). \text{MEM } x \ l \wedge P \ x$
$\forall(n : \text{num}) (l : \alpha \text{ list}). \text{TAKE } n \ l \ ++ \ \text{DROP } n \ l = l$
$\forall(x : \alpha) (s : \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{COMPL } s \ x \Leftrightarrow x \notin s$
$\forall(l : \alpha \text{ list}). \text{LENGTH} (\text{REVERSE } l) = \text{LENGTH } l$
$\text{MAP } (f : \text{num} \rightarrow \alpha) (\text{COUNT_LIST } (n : \text{num})) = \text{GENLIST } f \ n$
$\{(x, y) \mid (P : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}) x \ y\} = \text{UNCURRY } P$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (x : \alpha) (x' : \alpha). (x \in s \Leftrightarrow x' \in s) \Leftrightarrow (x \in s \ \text{DELETE } x' \Leftrightarrow x' \in s \ \text{DELETE } x)$
$(\forall(x : \alpha). (P : \alpha \rightarrow \text{bool}) x \Rightarrow (P' : \alpha \rightarrow \text{bool}) x) \wedge (\forall(y : \beta). (Q : \beta \rightarrow \text{bool}) y \Rightarrow (Q' : \beta \rightarrow \text{bool}) y)$ $\Rightarrow \text{SUM_ALL } P \ Q \ (s : \alpha + \beta) \Rightarrow \text{SUM_ALL } P' \ Q' \ s$
$\forall(p : \text{bool}) (q : \text{bool}) (m : \text{bool}). (\text{stmarker } m \wedge p \Leftrightarrow p \wedge \text{stmarker } m) \wedge (p \wedge q \wedge \text{stmarker } m \Leftrightarrow (p \wedge q) \wedge \text{stmarker } m) \wedge ((p \wedge \text{stmarker } m) \wedge q \Leftrightarrow (p \wedge q) \wedge \text{stmarker } m)$
$(\text{LEAST}(n : \text{num}). n = (x : \text{num})) = x \wedge (\text{LEAST}(n : \text{num}). x = n) = x$
$\forall(f : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \alpha) (e : \alpha) (l : \beta \text{ list}). \text{FOLDL } f \ e \ (\text{REVERSE } l) = \text{FOLDR } (\lambda(x : \beta) (y : \alpha). f \ y \ x) \ e \ l$
$(\text{Case } (X : \alpha) \wedge (Y : \text{bool}) \Leftrightarrow Y) \wedge (Y \wedge \text{Case } X \Leftrightarrow Y) \wedge (\text{Case } X \Rightarrow Y \Leftrightarrow Y)$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \alpha \rightarrow \text{bool}) (u : \alpha \rightarrow \text{bool}). s \cup t \subseteq u \Leftrightarrow s \subseteq u \wedge t \subseteq u$
$\forall(pl : (\alpha \# \beta) \text{ list}). \text{LENGTH} (\text{FST } (\text{UNZIP } pl)) = \text{LENGTH } pl \wedge \text{LENGTH} (\text{SND } (\text{UNZIP } pl)) = \text{LENGTH } pl$
$\forall(p : \alpha \rightarrow \text{bool}). p \ (\text{UNIV_POINT } p) \Leftrightarrow \forall(x : \alpha). p \ x$
$\text{DATATYPE } ((\text{list} : \alpha \text{ list} \rightarrow (\alpha \rightarrow \alpha \text{ list} \rightarrow \alpha \text{ list}) \rightarrow \text{bool}) ([] : \alpha \text{ list}) (\text{CONS} : \alpha \rightarrow \alpha \text{ list} \rightarrow \alpha \text{ list}))$
$\text{LIST_BIND } (\text{LIST_BIND } (l : \gamma \text{ list}) (g : \gamma \rightarrow \beta \text{ list})) (f : \beta \rightarrow \alpha \text{ list}) = \text{LIST_BIND } l \ (\text{flip } (\text{LIST_BIND} : \beta \text{ list} \rightarrow (\beta \rightarrow \alpha \text{ list}) \rightarrow \alpha \text{ list}) f \circ g)$
$\forall(l : \text{bool list}). \text{AND_EL } l \Leftrightarrow \text{FOLDR } \$ \wedge \ T \ l$
$(x : \alpha \text{ list}) \leq ([] : \alpha \text{ list}) \Leftrightarrow x = ([] : \alpha \text{ list})$
$\forall(m : \text{num}) (n : \text{num}). m \in \text{count } n \Leftrightarrow m < n$
$\forall(l : \alpha \text{ list}) (i : \text{num}). \text{MAP } (f : \alpha \rightarrow \beta) (\text{DROP } i \ l) = \text{DROP } i \ (\text{MAP } f \ l)$
$\forall(s1 : \alpha \rightarrow \text{bool}) (s2 : \alpha \rightarrow \text{bool}) (s3 : \alpha \rightarrow \text{bool}). s1 \subseteq s2 \ \text{DIFF } s3 \Leftrightarrow s1 \subseteq s2 \wedge \text{DISJOINT } s1 \ s3$
$\forall(m : \text{num}) (n : \text{num}). \text{SUC } m = \text{SUC } n \Leftrightarrow m = n$
$\forall(R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{transitive } R^+$
$\forall(n : \text{num}) (m : \text{num}) (l : \alpha \text{ list}). n + m \leq \text{LENGTH } l \Rightarrow \text{DROP } n \ (\text{DROP } m \ l) = \text{DROP } (n + m) \ l$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}). s = (\emptyset : \alpha \rightarrow \text{bool}) \Leftrightarrow \text{DISJOINT } s \ s$
$\forall(x : \alpha) (y : \beta). \{x\} \times \{y\} = \{(x, y)\}$
$(\forall(x : \alpha). (R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) x \ x) \Rightarrow \forall(x : \alpha \text{ option}). \text{OPTREL } R \ x \ x$
$(0 : \text{num}) \otimes (0 : \text{num}) = (0 : \text{num})$
$\forall(v : \text{unit}). v = ()$
$\forall(ss : \alpha + \beta). (\exists(x : \alpha). ss = (\text{INL } x : \alpha + \beta)) \vee \exists(y : \beta). ss = (\text{INR } y : \alpha + \beta)$
$\forall(R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}). (\forall(P : \alpha \rightarrow \text{bool}). (\forall(x : \alpha). (\forall(y : \alpha). R \ y \ x \Rightarrow P \ y) \Rightarrow P \ x) \Rightarrow \forall(x : \alpha). P \ x) \Rightarrow \text{WFR }$
$\forall(x : \alpha). \{x\} \text{ DELETE } x = (\emptyset : \alpha \rightarrow \text{bool})$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{INFINITE } s \Leftrightarrow \forall(t : \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{FINITE } t \Rightarrow t \subseteq s \Rightarrow t \subset s$
$\forall(R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{diamond } R \Rightarrow \text{diamond } (\text{RC } R)$

$\text{OPTION_MCOMP}(g : \gamma \rightarrow \delta \text{ option}) (\text{SOME} : \gamma \rightarrow \gamma \text{ option}) = g \wedge \text{OPTION_MCOMP}(\text{SOME} : \beta \rightarrow \beta \text{ option}) (f : \alpha \rightarrow \beta \text{ option}) = f$
$\forall(x : \alpha) (y : \beta). \text{ SND}(x, y) = y$
$\forall(n : \text{num}) (l : \alpha \text{ list}). n \leq \text{LENGTH } l \Rightarrow \forall(x : \alpha). \text{ TAKE } n (\text{SNOC } x \ l) = \text{ TAKE } n \ l$
$\forall(f : \alpha \rightarrow \beta) (s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \beta \rightarrow \text{bool}) (s_0 : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t_0 : \beta \rightarrow \text{bool}). \text{INJ } f \ s \ t \wedge s_0 \subseteq s \wedge t \subseteq t_0 \Rightarrow \text{INJ } f \ s_0 \ t_0$
$\forall(n : \text{num}) (x : \alpha). \text{REPLICATE } n \ x = \text{GENLIST}(\text{K } x : \text{num} \rightarrow \alpha) n$
$(\$= : \beta \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}) \circ_r (R : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}) = R$
$\forall(R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{transitive } R \Rightarrow \text{transitive } (\text{RC } R)$
$\forall(t : \text{bool}). t \Rightarrow t \Leftrightarrow \text{T}$
$\forall(v : \alpha) (v' : \alpha) (\text{rows} : (\alpha \rightarrow \beta \text{ option}) \text{ list}) (\text{rows}' : (\alpha \rightarrow \beta \text{ option}) \text{ list}) (r : \alpha \rightarrow \beta \text{ option}) (r' : \alpha \rightarrow \beta \text{ option}). v = v' \wedge r \ v' = r' \ v' \wedge \text{PMATCH } v \ \text{rows} = \text{PMATCH } v' \ \text{rows} \Rightarrow \text{PMATCH } v \ (r :: \text{rows}) = \text{PMATCH } v' \ (r' :: \text{rows}')$
$((A : \alpha \rightarrow \text{bool}) \cap (B : \alpha \rightarrow \text{bool})) = A \Leftrightarrow A \subseteq B \wedge (A \cap B = B \Leftrightarrow B \subseteq A)$
$\text{LENGTH}(\text{STRONGEST_REDUNDANT_ROWS_INFO}(v : \alpha) (\text{rows} : (\alpha \rightarrow \beta \text{ option}) \text{ list})) = \text{LENGTH } \text{rows}$
$(R1 : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}) \subseteq_r (R2 : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}) \wedge (S1 : \gamma \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) \subseteq_r (S2 : \gamma \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) \Rightarrow R1 \circ_r S1 \subseteq_r R2 \circ_r S2$
$\forall(\text{opt1} : \alpha \text{ option}) (\text{opt2} : \alpha \text{ option}) (f1 : \alpha \rightarrow \beta) (f2 : \alpha \rightarrow \beta). \text{opt1} = \text{opt2} \wedge (\forall(x : \alpha). \text{opt2} = \text{SOME } x \Rightarrow f1 \ x = f2 \ x) \Rightarrow \text{OPTION_MAP } f1 \ \text{opt1} = \text{OPTION_MAP } f2 \ \text{opt2}$
$\forall(m : \text{num}) (n : \text{num}). m < n \Rightarrow m \neq n$
$\forall(x : \alpha) (y : \alpha). (R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool})^* x \ y \Rightarrow R^* = x \ y$
$\text{STRORD}(R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) = R \cap_r \text{RCOMPL}(\$= : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool})$
$\forall(x : \alpha) (s : \alpha \rightarrow \text{bool}). s \ \text{DELETE } x \ \text{DELETE } x = s \ \text{DELETE } x$
$\forall(R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{WeakOrder } R \Rightarrow \text{RC } (\text{STRORD } R) = R$
$\text{CARD}(\emptyset : \alpha \rightarrow \text{bool}) = (0 : \text{num})$
$\forall(m : \text{num}) (n : \text{num}). m = n \Rightarrow \neg(m < n)$
$\forall(R1 : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) (R2 : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{irreflexive } R2 \wedge R1 \subseteq_r R2 \Rightarrow \text{irreflexive } R1$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (x : \alpha). x \in s \Rightarrow (s \ \text{DELETE } x = (\emptyset : \alpha \rightarrow \text{bool}) \Leftrightarrow s = \{x\})$
$\forall(n : \text{num}) (m : \text{num}) (l : \alpha \text{ list}). \text{DROP } n (\text{DROP } m \ l) = \text{DROP } (n + m) \ l$
$\forall(\text{opt} : \alpha \text{ option}) (\text{opt}' : \alpha \text{ option}) (P : \alpha \rightarrow \text{bool}) (P' : \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{opt} = \text{opt}' \wedge (\forall(x : \alpha). \text{opt}' = \text{SOME } x \Rightarrow (P \ x \Leftrightarrow P' \ x)) \Rightarrow (\text{OPTION_ALL } P \ \text{opt} \Leftrightarrow \text{OPTION_ALL } P' \ \text{opt}')$
$\mathbb{U}(: \text{bool}) = \{\text{T}; \text{F}\}$
$((A : \alpha \rightarrow \text{bool}) \cup (B : \alpha \rightarrow \text{bool})) \cap A = A \wedge (B \cup A) \cap A = A \wedge A \cap (A \cup B) = A \wedge A \cap (B \cup A) = A$
$\forall(f' : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \gamma) (f : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \gamma) (M' : \alpha \# \beta) (M : \alpha \# \beta). M = M' \wedge (\forall(x : \alpha) (y : \beta). M' = (x, y) \Rightarrow f \ x \ y = f' \ x \ y) \Rightarrow \text{UNCURRY } f \ M = \text{UNCURRY } f' \ M'$
$\forall(v : \alpha) (\text{rows1a} : (\alpha \rightarrow \beta \text{ option}) \text{ list}) (\text{rows1b} : (\alpha \rightarrow \beta \text{ option}) \text{ list}) (\text{rows2a} : (\alpha \rightarrow \beta \text{ option}) \text{ list}) (\text{rows2b} : (\alpha \rightarrow \beta \text{ option}) \text{ list}). \text{PMATCH_EQUIV_ROWS } v \ \text{rows1a} \ \text{rows1b} \Rightarrow \text{PMATCH_EQUIV_ROWS } v \ \text{rows2a} \ \text{rows2b} \Rightarrow \text{PMATCH_EQUIV_ROWS } v \ (\text{rows1a} ++ \text{rows2a}) (\text{rows1b} ++ \text{rows2b})$
$\forall(t : \text{bool}). t \vee \text{T} \Leftrightarrow \text{T}$
$\forall(x : \alpha) (y : \alpha) (s : \alpha \rightarrow \text{bool}). (x \ \text{INSERT } s) \ \text{DELETE } y = \text{if } x = y \text{ then } s \ \text{DELETE } y \text{ else } x \ \text{INSERT } s \ \text{DELETE } y$

$\forall(R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) (Q : \alpha \rightarrow \text{bool}) (b : \alpha). Q b \wedge (\forall(x : \alpha) (y : \alpha). R x y \wedge Q y \Rightarrow Q x) \Rightarrow \forall(x : \alpha). R^* x b \Rightarrow Q x$
$\forall(a : \alpha \text{ list}) (b : \beta \text{ list}) (c : \alpha \text{ list}) (d : \beta \text{ list}). \text{LENGTH } a = \text{LENGTH } b \wedge \text{LENGTH } c = \text{LENGTH } d \Rightarrow \text{ZIP } (a, b) ++ \text{ZIP } (c, d) = \text{ZIP } (a ++ c, b ++ d)$
$\forall(x : \alpha) (f : \alpha \rightarrow \text{num} \rightarrow \alpha). (\forall(n : \text{num}). \text{PRIM_REC_FUN } x f (0 : \text{num}) n = x) \wedge \forall(m : \text{num}) (n : \text{num}). \text{PRIM_REC_FUN } x f (\text{SUC } m) n = f (\text{PRIM_REC_FUN } x f m (\text{PRE } n)) n$
$(\forall(s : \alpha). (P : \alpha \rightarrow \text{bool}) s \Leftrightarrow (Q : \alpha \rightarrow \text{bool}) s) \Rightarrow ((\forall(s : \alpha). P s) \Leftrightarrow \forall(s : \alpha). Q s)$
$\forall(x : \alpha \rightarrow \text{bool}) (y : \alpha \rightarrow \text{bool}) (z : \alpha \rightarrow \text{bool}). x \text{ DIFF } (y \cup z) = x \text{ DIFF } y \text{ DIFF } z$
$(\text{OLEAST}(n : \text{num}). n = (x : \text{num})) = \text{SOME } x \wedge (\text{OLEAST}(n : \text{num}). x = n) = \text{SOME } x \wedge (\text{OLEAST}(n : \text{num}). F) = (\text{NONE} : \text{num option}) \wedge (\text{OLEAST}(n : \text{num}). T) = \text{SOME } (0 : \text{num})$
$\forall(n : \text{num}). \neg(n < n)$
$\forall(P : \alpha \rightarrow \text{bool}) (l : \alpha \text{ list}). \text{LENGTH } (\text{FILTER } P l) \leq \text{LENGTH } l$
$\forall(P : \text{num} \rightarrow \text{bool}) (n : \text{num}). \text{EVERY } P (\text{COUNT_LIST } n) \Leftrightarrow \forall(m : \text{num}). m < n \Rightarrow P m$
$\forall(m : \text{num}) (n : \text{num}). \text{count } n m \Leftrightarrow m < n$
$(\forall(P : \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{PREFIX } P ([] : \alpha \text{ list}) = ([] : \alpha \text{ list})) \wedge \forall(P : \beta \rightarrow \text{bool}) (x : \beta) (l : \beta \text{ list}). \text{PREFIX } P (x :: l) = \text{if } P x \text{ then } x :: \text{PREFIX } P l \text{ else } ([] : \beta \text{ list})$
$(\forall(x : \alpha). \text{LAST } [x] = x) \wedge \forall(x : \alpha) (y : \alpha) (z : \alpha \text{ list}). \text{LAST } (x :: y :: z) = \text{LAST } (y :: z)$
$\forall(n : \text{num}) (l : \alpha \text{ list}). n < \text{LENGTH } l \Rightarrow \text{ELL } n l = \text{EL } (\text{PRE } (\text{LENGTH } l - n)) l$
$\forall(x : \alpha). \text{DISJOINT } \{x\} (\emptyset : \alpha \rightarrow \text{bool})$
$\forall(n : \text{num}) (l : \alpha \text{ list}). n \leq \text{LENGTH } l \Rightarrow \text{LENGTH } (\text{BUTLASTN } n l) = \text{LENGTH } l - n$
$(\forall(x : \alpha). (P : \alpha \rightarrow \text{bool}) x \Rightarrow (P' : \alpha \rightarrow \text{bool}) x) \wedge (\forall(y : \beta). (Q : \beta \rightarrow \text{bool}) y \Rightarrow (Q' : \beta \rightarrow \text{bool}) y) \Rightarrow \text{PROD_ALL } P Q (p : \alpha \# \beta) \Rightarrow \text{PROD_ALL } P' Q' p$
$\forall(l1 : \alpha \text{ list}) (l2 : \alpha \text{ list}) (l3 : \alpha \text{ list}). \text{IS_SUFFIX } l1 l2 \wedge \text{IS_SUFFIX } l2 l3 \Rightarrow \text{IS_SUFFIX } l1 l3$
$\text{DATATYPE } ((\text{pair} : (\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \alpha \# \beta) \rightarrow \gamma) (\$, : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \alpha \# \beta))$
$\text{INJ } (\text{LINV_OPT } (f : \beta \rightarrow \alpha) (s : \beta \rightarrow \text{bool})) (\text{IMAGE } f s) (\text{IMAGE } (\text{SOME} : \beta \rightarrow \beta \text{ option}) s)$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{countable } s \vee \text{countable } t \Rightarrow \text{countable } (s \cap t)$
$\forall(f : \alpha \rightarrow \beta) (s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (u : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \beta \rightarrow \text{bool}). s \subseteq u \wedge \text{IMAGE } f u \subseteq t \Rightarrow \text{IMAGE } f s \subseteq t$
$\forall(R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{transitive } R^*$
$\forall(X : \alpha \rightarrow \text{bool}) (Y : \alpha \rightarrow \text{bool}) (P : (\alpha \rightarrow \text{bool}) \rightarrow \text{bool}). Y \in P \wedge \text{DISJOINT } Y X \Rightarrow \text{DISJOINT } X (\text{BIGINTER } P) \wedge \text{DISJOINT } (\text{BIGINTER } P) X$
$(0 : \text{num}) = \text{LENGTH } ([] : \alpha \text{ list}) \Leftrightarrow [] = ([] : \alpha \text{ list})$
$(\text{option_CASE } (x : \alpha \text{ option}) (e : \beta) (f : \alpha \rightarrow \beta) : \beta) = \text{if IS_SOME } x \text{ then } f (\text{THE } x) \text{ else } e$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{DISJOINT } s s \Leftrightarrow s = (\emptyset : \alpha \rightarrow \text{bool})$
$\forall(R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) (a : \alpha) (b : \alpha). R^* a b \Leftrightarrow \forall(Q : \alpha \rightarrow \text{bool}). Q a \wedge (\forall(y : \alpha) (z : \alpha). Q y \wedge R y z \Rightarrow Q z) \Rightarrow Q b$
$\forall(R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) (x : \alpha) (y : \alpha). \text{RC } R x y \Rightarrow R^* x y$
$\forall(m : \text{num}) (n : \text{num}). m < n \Rightarrow m < \text{SUC } n$
$\text{BIGINTER } (\emptyset : (\alpha \rightarrow \text{bool}) \rightarrow \text{bool}) = \text{U}(:\alpha)$
$(\neg(A : \text{bool}) \Rightarrow F) \Rightarrow (A \Rightarrow F) \Rightarrow F$
$\forall(f : \alpha \rightarrow \beta \# \gamma) (a : \beta \rightarrow \text{bool}) (b : \gamma \rightarrow \text{bool}). \text{PREIMAGE } f (a \times b) = \text{PREIMAGE } ((\text{FST} : \beta \# \gamma \rightarrow \beta) \circ f) a \cap \text{PREIMAGE } ((\text{SND} : \beta \# \gamma \rightarrow \gamma) \circ f) b$
$\forall(f : \alpha \rightarrow \beta) (x : \alpha \text{ option}). \text{OPTION_MAP } f x = (\text{NONE} : \beta \text{ option}) \Leftrightarrow x = (\text{NONE} : \alpha \text{ option})$
$\forall(f : \alpha \rightarrow \beta) (s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \beta \rightarrow \text{bool}). \text{BIJ } f s t \Leftrightarrow (\forall(x : \alpha). x \in s \Rightarrow f x \in t) \wedge \exists(g : \beta \rightarrow \alpha). (\forall(x : \beta). x \in t \Rightarrow g x \in s) \wedge (\forall(x : \alpha). x \in s \Rightarrow g (f x) = x) \wedge \forall(x : \beta). x \in t \Rightarrow f (g x) = x$

$\forall(l1 : \alpha \text{ list}) (l2 : \alpha \text{ list}) (n : \text{num}) (x : \alpha). n < \text{LENGTH } l1 \Rightarrow \text{LUPDATE } x \ n \ (l1 ++ l2) = \text{LUPDATE } x \ n \ l1 ++ l2$
$(\text{some}(x : \alpha). x = (y : \alpha)) = \text{SOME } y \wedge (\text{some}(x : \alpha). y = x) = \text{SOME } y$
$(\forall(x : \alpha). \text{FRONT } [x] = ([] : \alpha \text{ list})) \wedge \forall(x : \alpha) (y : \alpha) (z : \alpha \text{ list}). \text{FRONT } (x :: y :: z) = x :: \text{FRONT } (y :: z)$
$\text{ZRECSpace}(\text{ind_type\$ZBOT} : \text{num} \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) \wedge \forall(c : \text{num}) (i : \alpha) (r : \text{num} \rightarrow \text{num} \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}). (\forall(n : \text{num}). \text{ZRECSpace}(r \ n)) \Rightarrow \text{ZRECSpace}(\text{ind_type\$ZCONSTR } c \ i \ r)$
$\forall(m : \text{num}) (n : \text{num}). \text{MEM } m \ (\text{COUNT_LIST } n) \Leftrightarrow m < n$
$\forall(P : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}). (\forall(x : \alpha) (y : \beta). P \ x \ y) \Leftrightarrow \forall((x : \alpha), (y : \beta)). P \ x \ y$
$\forall(P : \alpha \rightarrow \text{bool}) (x : \alpha). x \in P \Leftrightarrow P \ x$
$\text{BIGINTER } (B : (\alpha \rightarrow \text{bool}) \rightarrow \text{bool}) (x : \alpha) \Leftrightarrow \forall(P : \alpha \rightarrow \text{bool}). P \in B \Rightarrow x \in P$
$\text{LIST_REL } (P : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}) (\text{GENLIST } (f : \text{num} \rightarrow \alpha) (l : \text{num})) (\text{GENLIST } (g : \text{num} \rightarrow \beta) l) \Leftrightarrow \forall(i : \text{num}). i < l \Rightarrow P(f \ i) (g \ i)$
$\forall(f : \alpha \rightarrow \beta) (s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \beta \rightarrow \text{bool}). \text{SURJ } f \ s \ t \Leftrightarrow \text{IMAGE } f \ s = t$
$\forall(f : \alpha \rightarrow \beta) (g : \text{num} \rightarrow \alpha) (n : \text{num}). \text{MAP } f \ (\text{GENLIST } g \ n) = \text{GENLIST } (f \circ g) \ n$
$\forall(f : \alpha \rightarrow \beta) (l : \alpha \text{ list}) (a : \alpha). \text{MEM } a \ l \Rightarrow \text{MEM } (f \ a) (\text{MAP } f \ l)$
$\text{BIGUNION } (\text{IMAGE } (f : \beta \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) (\text{set } (ls : \beta \text{ list}))) \subseteq (s : \alpha \rightarrow \text{bool}) \Leftrightarrow \forall(x : \beta). \text{MEM } x \ ls \Rightarrow f \ x \subseteq s$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \alpha \rightarrow \text{bool}). t \subseteq s \Rightarrow s \ \text{DIFF } (s \ \text{DIFF } t) = t$
$\forall(\text{set} : \alpha \rightarrow \text{bool}) (e : \alpha \rightarrow \text{bool}). e \in \text{POW set} \Leftrightarrow e \subseteq \text{set}$
$\text{FINITE } \mathbb{U}(:\alpha \ # \ \beta) \Leftrightarrow \text{FINITE } \mathbb{U}(:\alpha) \wedge \text{FINITE } \mathbb{U}(:\beta)$
$\forall(f : \alpha \rightarrow \beta) (s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \beta \rightarrow \text{bool}). \text{FINITE } s \wedge \text{BIJ } f \ s \ t \Rightarrow \text{CARD } s = \text{CARD } t$
$\{x \mid T\} = \mathbb{U}(:\alpha)$
$\text{COMPL } (\emptyset : \alpha \rightarrow \text{bool}) = \mathbb{U}(:\alpha)$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \alpha \rightarrow \text{bool}). s = t \Leftrightarrow \forall(x : \alpha). x \in s \Leftrightarrow x \in t$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}). (\exists(f : \text{num} \rightarrow \alpha). \text{BIJ } f \ \mathbb{U}(:\text{num}) \ s) \Rightarrow \text{countable } s$
$\forall(a0 : \alpha) (a1 : \alpha \text{ list}) (a0' : \alpha) (a1' : \alpha \text{ list}). a0 :: a1 = a0' :: a1' \Leftrightarrow a0 = a0' \wedge a1 = a1'$
$\forall(s1 : (\alpha \rightarrow \text{bool}) \rightarrow \text{bool}) (s2 : (\alpha \rightarrow \text{bool}) \rightarrow \text{bool}). \text{BIGINTER } (s1 \cup s2) = \text{BIGINTER } s1 \cap \text{BIGINTER } s2$
$\forall(f : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}) (s : \gamma \rightarrow \text{bool}) (t : \alpha \rightarrow \text{bool}). s \times \text{BIGUNION } (\text{IMAGE } f \ t) = \text{BIGUNION } (\text{IMAGE } (\lambda(n : \alpha). s \times f \ n) \ t)$
$\text{PMATCH_EQUIV_ROWS } (v : \alpha) (\text{rows1} : (\alpha \rightarrow \beta \text{ option}) \text{ list}) (\text{rows2} : (\alpha \rightarrow \beta \text{ option}) \text{ list}) \Rightarrow \text{PMATCH } v \ \text{rows1} = \text{PMATCH } v \ \text{rows2}$
$\forall(l : \alpha \text{ list}) (x : \alpha). \text{SEG } (1 : \text{num}) (\text{LENGTH } l) (\text{SNOC } x \ l) = [x]$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{FINITE } s \Rightarrow \text{countable } s$
$\forall(l : \alpha \text{ list}). \text{FINITE } (\text{set } l)$
$\forall(f : \alpha \rightarrow \text{num}) (x : \alpha) (ls : \alpha \text{ list}). \text{MEM } x \ ls \Rightarrow f \ x \leq \text{SUM } (\text{MAP } f \ ls)$
$\forall(x : \alpha) (s : \alpha \rightarrow \text{bool}). x \in x \ \text{INSERT } s$
$\forall(n : \text{num}) (l : \alpha \text{ list}). n < \text{LENGTH } l \Rightarrow \text{BUTLASTN } n \ (\text{FRONT } l) = \text{FRONT } (\text{BUTLASTN } n \ l)$
$\forall(v : \alpha) (p : \beta \rightarrow \alpha) (g : \beta \rightarrow \text{bool}) (p' : \gamma \rightarrow \alpha) (g' : \gamma \rightarrow \text{bool}) (\text{RES} : \text{bool}). \text{PMATCH_ROW_COND_EX } v \ p \ g \Rightarrow (\forall(x : \beta). g \ x \Rightarrow ((\exists(x' : \gamma). p' \ x' = p \ x \wedge g' \ x') \Leftrightarrow \text{RES})) \Rightarrow (\text{PMATCH_ROW_COND_EX } v \ p' \ g' \Leftrightarrow \text{RES})$
$\forall(x : \alpha). (\emptyset : \alpha \rightarrow \text{bool}) \ \text{DELETE } x = (\emptyset : \alpha \rightarrow \text{bool})$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \alpha \rightarrow \text{bool}). s \ \text{DIFF } t \cap s = s \ \text{DIFF } t$

$\forall(n:\text{num})(l1:\alpha\text{ list})(l2:\alpha\text{ list}). \text{TAKE } n(l1 ++ l2) = \text{TAKE } n l1 ++ \text{TAKE } (n - \text{LENGTH } l1) l2$
$\forall(s:\alpha \rightarrow \text{bool})(t:\alpha \rightarrow \text{bool})(u:\alpha \rightarrow \text{bool}). s \cap (t \cap u) = s \cap t \cap u$
$\forall(P:\alpha\text{ list} \rightarrow \text{bool}). (\forall(l:\alpha\text{ list}). \text{LENGTH } l = (0:\text{num}) \Rightarrow P l) \Leftrightarrow P ([]:\alpha\text{ list})$
$\text{ASSOC } (\$++:\alpha\text{ list} \rightarrow \alpha\text{ list} \rightarrow \alpha\text{ list})$
$\text{PMATCH_ROW_REDUNDANT } (v:\alpha)([]:(\alpha \rightarrow \beta \text{ option})\text{ list})(i:\text{num}) \Leftrightarrow F$
$\forall(\text{ZRECSpace}' : (\text{num} \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) \rightarrow \text{bool}). \text{ZRECSpace}'(\text{ind_type\$ZBOT} : \text{num} \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool})$
$\wedge (\forall(c:\text{num})(i:\alpha)(r:\text{num} \rightarrow \text{num} \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}). (\forall(n:\text{num}). \text{ZRECSpace}'(r n)) \Rightarrow \text{ZRECSpace}'(\text{ind_type\$ZCONSTR } c i r)) \Rightarrow \forall(a0:\text{num} \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{ZRECSpace } a0 \Rightarrow \text{ZRECSpace}' a0$
$\forall(l1:\alpha\text{ list})(l2:\beta\text{ list}). \text{LENGTH } l1 = \text{LENGTH } l2 \Rightarrow \forall(x1:\alpha)(x2:\beta). \text{ZIP } (\text{SNOC } x1 l1, \text{SNOC } x2 l2) = \text{SNOC } (x1, x2) (\text{ZIP } (l1, l2))$
$\neg \text{SHORTLEX } (R:\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool})(l:\alpha\text{ list})([]:\alpha\text{ list})$
$\forall(e:\alpha). \exists(fn:\text{unit} \rightarrow \alpha). fn() = e$
$\forall(l:\alpha\text{ list}). l \neq [] \Rightarrow \text{FRONT } l ++ [\text{LAST } l] = l$
$\forall(l:\alpha\text{ list})(n:\text{num}). n < \text{LENGTH } l \Rightarrow \text{LAST } (\text{DROP } n l) = \text{LAST } l$
$\forall(n:\text{num})(l:\alpha\text{ list}). n \leq \text{LENGTH } l \Rightarrow \forall(x:\alpha). \text{BUTLASTN } n (x::l) = x::\text{BUTLASTN } n l$
$\forall(f:\alpha \rightarrow \beta)(s:\beta \rightarrow \text{bool})(t:\beta \rightarrow \text{bool}). \text{DISJOINT } s t \Rightarrow \text{DISJOINT } (\text{PREIMAGE } f s) (\text{PREIMAGE } f t)$
$(\exists(ls:\alpha\text{ list}). (P:\alpha\text{ list} \rightarrow \text{bool}) ls) \Leftrightarrow \exists(n:\text{num})(f:\text{num} \rightarrow \alpha). P (\text{GENLIST } f n)$
$\text{nub } ([]:\alpha\text{ list}) = ([]:\alpha\text{ list})$
$\text{WF } (R:\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool})^+ \Leftrightarrow \text{WFR}$
$\forall(n:\text{num}). \text{countable } (\text{count } n)$
$\{x \mid (y:\alpha) = x\} = \{y\}$
$\forall(x:\alpha)(l:\alpha\text{ list}). \text{SNOC } x l = l ++ [x]$
$\forall(s:\alpha \rightarrow \text{bool})(t:\alpha \rightarrow \text{bool}). \text{DISJOINT } s t \Leftrightarrow \forall(x:\alpha). x \in s \Rightarrow x \notin t$
$\text{GENLIST } (f:\text{num} \rightarrow \alpha)(0:\text{num}) = ([]:\alpha\text{ list}) \wedge \text{GENLIST } f (\text{NUMERAL } (n:\text{num})) = \text{GENLIST_AUX } f (\text{NUMERAL } n) ([]:\alpha\text{ list})$
$\forall(s:\alpha)(x:\alpha \rightarrow \text{bool}). x \subset \{s\} \Leftrightarrow x = (\emptyset:\alpha \rightarrow \text{bool})$
$\forall(R:\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{symmetric } R^T \Leftrightarrow \text{symmetric } R$
$\forall(t1:\alpha)(t2:\alpha). (\text{if } F \text{ then } t1 \text{ else } t2) = t2$
$\forall(l1:\alpha\text{ list})(l2:\alpha\text{ list}). \text{set } (l1 ++ l2) = \text{set } l1 \cup \text{set } l2$
$\forall(l1:\alpha\text{ list})(l2:\alpha\text{ list}). l2 \leqslant l1 \Leftrightarrow \exists(l:\alpha\text{ list}). l1 = l2 ++ l$
$\forall(R:\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{irreflexive } R^T \Leftrightarrow \text{irreflexive } R$
$\forall(s:\alpha \rightarrow \text{bool}). \text{CHOICE } s \notin \text{REST } s$
$\forall(l1:\alpha\text{ list})(l2:\alpha\text{ list}). l1 ++ l2 = \text{FOLDL } (\lambda(l':\alpha\text{ list})(x:\alpha). \text{SNOC } x l') l1 l2$
$\forall(L:\alpha\text{ list})(n:\text{num}). \text{LEN } L n = \text{LENGTH } L + n$
$\forall(x:\text{bool})(x':\text{bool})(y:\text{bool})(y':\text{bool}). (x \Rightarrow y' \Rightarrow y) \wedge (\neg y' \Rightarrow x \Rightarrow x') \Rightarrow (x' \Rightarrow y') \Rightarrow x \Rightarrow y$
$\forall(P:\alpha \rightarrow \text{bool})(l:\alpha\text{ list}). \text{EVERY } P l \Leftrightarrow \forall(e:\alpha). \text{MEM } e l \Rightarrow P e$
$\forall(n1:\text{num})(n2:\text{num}). \text{count } n1 = \text{count } n2 \Leftrightarrow n1 = n2$
$\forall(n:\text{num}). (0:\text{num}) < n \Rightarrow \forall(x:\alpha)(l:\alpha\text{ list}). \text{EL } n (x::l) = \text{EL } (\text{PRE } n) l$
$\forall(e:\alpha)(l:\alpha\text{ list}). \text{LIST_ELEM_COUNT } e l > (0:\text{num}) \Leftrightarrow \text{MEM } e l$
$\forall(t:\text{bool}). t \vee t \Leftrightarrow t$

$(\forall(x:\alpha)(y:\alpha). (f:\alpha \rightarrow \beta) x = f y \Leftrightarrow x = y) \Rightarrow (\text{DISJOINT}(\text{IMAGE } f(s1:\alpha \rightarrow \text{bool})) (\text{IMAGE } f(s2:\alpha \rightarrow \text{bool})) \Leftrightarrow \text{DISJOINT } s1 \text{ } s2)$
$\forall(x:\text{bool})(x':\text{bool})(y:\text{bool})(y':\text{bool}). (y \Rightarrow x' \Rightarrow x) \wedge (x' \Rightarrow y' \Rightarrow y) \Rightarrow x' \wedge y' \Rightarrow x \wedge y$
$\forall(n:\text{num}). \text{DROP } n ([]:\alpha \text{ list}) = ([]:\alpha \text{ list})$
$\forall(s:\alpha \rightarrow \text{bool}). s \subset \mathbb{U}(:\alpha) \Leftrightarrow \exists(x:\alpha). x \notin s$
$(Q:\alpha \text{ option} \rightarrow \text{bool}) (\$some(P:\alpha \rightarrow \text{bool})) \Rightarrow (\exists(x:\alpha). P x \wedge Q(\text{SOME } x)) \vee (\forall(x:\alpha). \neg P x) \wedge Q(\text{NONE}:\alpha \text{ option})$
$\text{transitive } (\$SUBSET:(\alpha \rightarrow \text{bool}) \rightarrow (\alpha \rightarrow \text{bool}) \rightarrow \text{bool})$
$\forall(f:\alpha \rightarrow \beta)(g:\beta \rightarrow \gamma)(s:\alpha \rightarrow \text{bool})(t:\beta \rightarrow \text{bool})(u:\gamma \rightarrow \text{bool}). \text{INJ } f \text{ } s \text{ } t \wedge \text{INJ } g \text{ } t \text{ } u \Rightarrow \text{INJ } (g \circ f) \text{ } s \text{ } u$
$\forall(y:\beta)(s:\alpha \rightarrow \text{bool})(f:\alpha \rightarrow \beta). \text{IMAGE } f \text{ } s \text{ } y \Leftrightarrow \exists(x:\alpha). y = f x \wedge x \in s$
$\forall(f:\alpha \rightarrow \beta)(g:\beta \rightarrow \gamma)(s:\alpha \rightarrow \text{bool})(t:\beta \rightarrow \text{bool})(u:\gamma \rightarrow \text{bool}). \text{SURJ } f \text{ } s \text{ } t \wedge \text{SURJ } g \text{ } t \text{ } u \Rightarrow \text{SURJ } (g \circ f) \text{ } s \text{ } u$
$\forall(f:'z \rightarrow 'z). \text{INVOL } f \Rightarrow \forall(a:'z)(b:'z). f a = f b \Leftrightarrow a = b$
$\forall(l1:\alpha \text{ list})(l2:\alpha \text{ list})(l3:\alpha \text{ list}). l1 ++ (l2 ++ l3) = l1 ++ l2 ++ l3$
$\$OLEAST(P:\text{num} \rightarrow \text{bool}) = (\text{NONE}:\text{num option}) \Leftrightarrow \forall(n:\text{num}). \neg P n$
$\forall(n:\text{num})(l1:\alpha \text{ list})(l2:\alpha \text{ list}). \text{DROP } n(l1 ++ l2) = \text{DROP } n \text{ } l1 ++ \text{DROP } (n - \text{LENGTH } l1) \text{ } l2$
$\forall(ls:\alpha \text{ list})(f:\beta \rightarrow \alpha). \text{EVERY } (\lambda(x:\alpha). \exists(y:\beta). x = f y) ls \Rightarrow \exists(l:\beta \text{ list}). ls = \text{MAP } f \text{ } l$
$\forall(opt:\alpha \text{ option}). (\exists(x:\alpha). opt = \text{SOME } x) \vee opt = (\text{NONE}:\alpha \text{ option})$
$\text{SURJ } (f:\alpha \rightarrow \beta)(s:\alpha \rightarrow \text{bool})(t:\beta \rightarrow \text{bool}) \Rightarrow \exists(g:\beta \rightarrow \alpha). \text{INJ } g \text{ } t \text{ } s \wedge \forall(y:\beta). y \in t \Rightarrow f(g y) = y$
$\forall(R:\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool})(x:\alpha)(y:\alpha)(z:\alpha). R^* x \text{ } y \wedge R \text{ } y \text{ } z \Rightarrow R^+ x \text{ } z$
$\forall(f:\alpha \rightarrow \beta)(s:\alpha \rightarrow \text{bool})(t:\beta \rightarrow \text{bool}). \text{INJ } f \text{ } s \text{ } t \wedge \text{INFINITE } s \Rightarrow \text{INFINITE } t$
$\forall(x1:\alpha)(l1:\alpha \text{ list})(x2:\alpha)(l2:\alpha \text{ list}). \text{SNOC } x1 \text{ } l1 = \text{SNOC } x2 \text{ } l2 \Rightarrow \text{LENGTH } l1 = \text{LENGTH } l2$
$\forall(x:\alpha)(l:\alpha \text{ list}). \text{TL } (\text{SNOC } x \text{ } l) = \text{if } \text{NULL } l \text{ then } ([]:\alpha \text{ list}) \text{ else } \text{SNOC } x \text{ } (\text{TL } l)$
$\forall(P:\alpha \text{ list} \rightarrow \text{bool})(n:\text{num}). (\forall(l:\alpha \text{ list}). \text{LENGTH } l = \text{SUC } n \Rightarrow P \text{ } l) \Leftrightarrow \forall(l:\alpha \text{ list}). \text{LENGTH } l = n \Rightarrow (\lambda(l:\alpha \text{ list}). \forall(x:\alpha). P(x::l)) \text{ } l$
$(x:\alpha) \in \text{RDOM } (\text{RRESTRICT } (R:\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool})(s:\alpha \rightarrow \text{bool})) \Leftrightarrow x \in \text{RDOM } R \wedge x \in s$
$\forall(x:\alpha)(l:\alpha \text{ list}). \text{FRONT } (\text{SNOC } x \text{ } l) = l$
$\forall(l:\alpha \text{ list})(x:\alpha). \text{MEM } x \text{ } (\text{REVERSE } l) \Leftrightarrow \text{MEM } x \text{ } l$
$\forall(l:\alpha \text{ list}). \text{NULL } l \Leftrightarrow \text{FOLDL } (\lambda(x:\text{bool})(l':\alpha). F) \text{ } T \text{ } l$
$\forall(l:\alpha \text{ list})(m:\text{num})(x:\alpha). \text{MEM } x \text{ } (\text{DROP } m \text{ } l) \Rightarrow \text{MEM } x \text{ } l$
$\forall(x:\alpha + \beta). \text{ISR } x \Rightarrow (\text{INR } (\text{OUTR } x):\alpha + \beta) = x$
$(([(f:\beta \rightarrow \alpha)] <*> (l:\beta \text{ list})):\alpha \text{ list}) = \text{MAP } f \text{ } l$
$\forall(n:\text{num})(x:\alpha). \text{SNOC } x \text{ } (\text{REPLICATE } n \text{ } x) = \text{REPLICATE } (\text{SUC } n) \text{ } x$
$\forall(s:\alpha \rightarrow \text{bool})(x:\alpha)(y:\alpha). x \text{ } \text{INSERT } s = \{y\} \Leftrightarrow x = y \wedge s \subseteq \{y\}$
$\forall(n:\text{num})(l1:\alpha \text{ list})(l2:\alpha \text{ list}). l1 \leqslant l2 \wedge n < \text{LENGTH } l1 \wedge n < \text{LENGTH } l2 \Rightarrow \text{EL } n \text{ } l1 = \text{EL } n \text{ } l2$
$\forall(R:\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{reflexive } (RC \text{ } R)$
$(R1:\gamma \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}) \circ_r (R2:\delta \rightarrow \gamma \rightarrow \text{bool}) \circ_r (R3:\alpha \rightarrow \delta \rightarrow \text{bool}) = (R1 \circ_r R2) \circ_r R3$
$\forall(n:\text{num}). (0:\text{num}) < n \Rightarrow \forall(x:\alpha)(l:\alpha \text{ list}). \text{ELL } n \text{ } (\text{SNOC } x \text{ } l) = \text{ELL } (\text{PRE } n) \text{ } l$
$\forall(l1:\alpha \text{ list})(l2:\alpha \text{ list}). \text{ALL_DISTINCT } (l1 ++ l2) \Leftrightarrow \text{ALL_DISTINCT } l1 \wedge \text{ALL_DISTINCT } l2 \wedge \forall(e:\alpha). \text{MEM } e \text{ } l1 \Rightarrow \neg \text{MEM } e \text{ } l2$
$\forall(l:\alpha \text{ list}). l \neq ([]:\alpha \text{ list}) \Rightarrow \text{BUTLASTN } (1:\text{num}) \text{ } l = \text{FRONT } l$

$\forall(s:\alpha \rightarrow \text{bool})(t:\alpha \rightarrow \text{bool}). \text{BIGUNION}\{s; t\} = s \cup t$
$\forall(l2:\alpha \text{ list})(l1:\alpha \text{ list}). \neg \text{NULL } l2 \Rightarrow \text{EL } (\text{LENGTH } l1)(l1 ++ l2) = \text{HD } l2$
$\text{reflexive } ((R1:\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) \text{ LEX } (R2:\beta \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool})) \Leftrightarrow \text{reflexive } R1 \vee \text{reflexive } R2$
$\text{INJ } (f:\alpha \rightarrow \beta)(s:\alpha \rightarrow \text{bool})(\text{IMAGE } f s) \Rightarrow (\text{countable } (\text{IMAGE } f s) \Leftrightarrow \text{countable } s)$
$\text{MAP } (f:\beta \rightarrow \alpha)(\text{LIST_BIND } (l:\gamma \text{ list})(g:\gamma \rightarrow \beta \text{ list})) = \text{LIST_BIND } l(\text{MAP } f \circ g)$
$\text{FUNSET } \mathbb{U}(:\alpha)\mathbb{U}(:\beta) = \mathbb{U}(:\alpha \rightarrow \beta)$
$\forall(A:\text{bool})(B:\text{bool})(C:\text{bool}). A \wedge B \Rightarrow C \Leftrightarrow A \Rightarrow B \Rightarrow C$
$\text{MAP } (\text{SND } :\beta \# \alpha \rightarrow \alpha)(\text{FILTER } (\lambda((x:\beta),(y:\alpha)). y \neq (z:\alpha))(ls:(\beta \# \alpha) \text{ list})) = \text{FILTER } (\lambda(y:\alpha). z \neq y)(\text{MAP } (\text{SND } :\beta \# \alpha \rightarrow \alpha) ls)$
$\text{REPLICATE } (n:\text{num})(a:\alpha) ++ \text{REPLICATE } (m:\text{num}) a = \text{REPLICATE } (n+m) a$
$\forall(b:\text{bool}). \neg b \Rightarrow (b \Leftrightarrow F)$
$\forall(x:\alpha)(y:\beta)(a:\alpha)(b:\beta). (x,y) = (a,b) \Leftrightarrow x = a \wedge y = b$
$\forall(f:\alpha \rightarrow \beta)(n:\text{num})(x:\alpha). \text{MAP } f(\text{REPLICATE } n x) = \text{REPLICATE } n(f x)$
$\forall(n:\text{num})(l:\alpha \text{ list}). n < \text{LENGTH } l \Rightarrow \text{SNOC } (\text{EL } n l)(\text{TAKE } n l) = \text{TAKE } (\text{SUC } n) l$
$\text{PMATCH_ROW_COND_EX } (i:\alpha)(p:\beta \rightarrow \alpha)(g:\beta \rightarrow \text{bool}) \Rightarrow \text{PMATCH_ROW } p g(r:\beta \rightarrow \gamma) i = \text{SOME } (r(@(x:\beta).\text{PMATCH_ROW_COND } p g i x))$
$\forall(R1:\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool})(R2:\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool})(x:\alpha)(y:\alpha). (R1 \cap_r R2)^* x y \Rightarrow (R1^* \cap_r R2^*) x y$
$\forall(P:\alpha \rightarrow \text{bool})(a:\alpha)(s:\alpha \rightarrow \text{bool}). (\exists(x:\alpha). x \in a \text{ INSERT } s \wedge P x) \Leftrightarrow P a \vee \exists(x:\alpha). x \in s \wedge P x$
$\forall(f:\alpha \rightarrow \gamma)(g:\beta \rightarrow \delta)(z:\alpha + \beta). \text{SUM_MAP } f g z = \text{if ISL } z \text{ then } (\text{INL } (f(\text{OUTL } z)):\gamma + \delta) \text{ else } (\text{INR } (g(\text{OUTR } z)):\gamma + \delta)$
$\forall(l:\alpha \text{ list list}). \text{REVERSE } (\text{FLAT } l) = \text{FLAT } (\text{REVERSE } (\text{MAP } (\text{REVERSE } :\alpha \text{ list} \rightarrow \alpha \text{ list}) l))$
$\forall(f1:\alpha \rightarrow \beta)(f2:\alpha \rightarrow \beta)(l:\alpha \text{ list}). \text{MAP } f1 l = \text{MAP } f2 l \Leftrightarrow \forall(e:\alpha). \text{MEM } e l \Rightarrow f1 e = f2 e$
$(\$:\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool})^T = (\$:\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool})$
$\forall(n:\text{num})(l:\alpha \text{ list}). n < \text{LENGTH } l \Rightarrow \text{ELL } n(\text{REVERSE } l) = \text{ELL } (\text{PRE } (\text{LENGTH } l - n)) l$
$\forall(x:\alpha)(s:\alpha \rightarrow \text{bool}). (\emptyset:\alpha \rightarrow \text{bool}) \neq x \text{ INSERT } s$
$(\neg \text{SHORTLEX } (R:\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool})([]:\alpha \text{ list})([]:\alpha \text{ list}) \wedge \neg \text{SHORTLEX } R((h1:\alpha)::(t1:\alpha \text{ list})) ([]:\alpha \text{ list})) \wedge \text{SHORTLEX } R ([]:\alpha \text{ list}) ((h2:\alpha)::(t2:\alpha \text{ list})) \wedge (\text{SHORTLEX } R(h1::t1)(h2::t2) \Leftrightarrow \text{LENGTH } t1 < \text{LENGTH } t2 \vee \text{LENGTH } t1 = \text{LENGTH } t2 \wedge (R h1 h2 \vee h1 = h2 \wedge \text{SHORTLEX } R t1 t2))$
$(\forall(v:\alpha). \text{PMATCH_IS_EXHAUSTIVE } v ([]:(\alpha \rightarrow \beta \text{ option}) \text{ list}) \Leftrightarrow F) \wedge \forall(v:\gamma)(r:\gamma \rightarrow \delta \text{ option})(rs:(\gamma \rightarrow \delta \text{ option}) \text{ list}). \text{PMATCH_IS_EXHAUSTIVE } v(r::rs) \Leftrightarrow r v \neq (\text{NONE } :\delta \text{ option}) \vee \text{PMATCH_IS_EXHAUSTIVE } v rs$
$(\forall(s:\alpha \rightarrow \text{bool}). \mathbb{U}(:\alpha) \cap s = s) \wedge \forall(s:\alpha \rightarrow \text{bool}). s \cap \mathbb{U}(:\alpha) = s$
$\forall(f:\alpha \rightarrow \beta)(s:\alpha \rightarrow \text{bool})(t:\beta \rightarrow \text{bool}). \text{BIJ } f s t \Leftrightarrow f \in \text{FUNSET } s t \wedge \forall(y:\beta). y \in t \Rightarrow \exists!(x:\alpha). x \in s \wedge y = f x$
$\forall(n:\text{num})(l:\alpha \text{ list}). n \leq \text{LENGTH } l \Rightarrow \text{BUTLASTN } n l = \text{TAKE } (\text{LENGTH } l - n) l$
$\forall(l2:\alpha \text{ list})(l1:\alpha \text{ list}). \text{IS_SUFFIX } (\text{REVERSE } l1)(\text{REVERSE } l2) \Leftrightarrow l2 \leqslant l1$
$\forall(s:\alpha \rightarrow \text{bool})(x:\alpha)(y:\alpha). x \in s \text{ DELETE } y \Leftrightarrow x \in s \wedge x \neq y$
$\forall(ls:\alpha \text{ list})(n:\text{num}). n \leq \text{LENGTH } ls \Rightarrow \text{REVERSE } (\text{DROP } n ls) = \text{REVERSE } (\text{LASTN } (\text{LENGTH } ls - n) ls)$
$\forall(f:\alpha \rightarrow \beta). \text{PREIMAGE } f(\emptyset:\beta \rightarrow \text{bool}) = (\emptyset:\alpha \rightarrow \text{bool})$
$\forall(f:\alpha \rightarrow \beta)(l:\alpha \text{ list}). \text{MAP } f(\text{REVERSE } l) = \text{REVERSE } (\text{MAP } f l)$
$\forall(s:\alpha \rightarrow \text{bool})(t:\alpha \rightarrow \text{bool})(x:\alpha). (s \cup t)x \Leftrightarrow x \in s \vee x \in t$

$\forall(n : \text{num}). \text{LENGTH}(\text{COUNT_LIST } n) = n$
$(\exists(p : \alpha \# \beta). (P : \alpha \# \beta \rightarrow \text{bool}) p) \Leftrightarrow \exists(p_1 : \alpha) (p_2 : \beta). P(p_1, p_2)$
$\forall(l1 : \alpha \text{ list}) (l2 : \alpha \text{ list}). l1 ++ l2 = \text{FOLDL}(\text{CONS} : \alpha \rightarrow \alpha \text{ list} \rightarrow \alpha \text{ list}) l2 l1$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (x : \alpha). \text{COMPL}(x \text{ INSERT } s) = \text{COMPL } s \text{ DELETE } x$
$\forall(t : \text{bool}). t \Rightarrow T \Leftrightarrow T$
$\text{countable}(\emptyset : \alpha \rightarrow \text{bool})$
$\forall(R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{Order } R \Leftrightarrow \text{StrongOrder } (\text{STRORD } R)$
$\forall(x : \text{bool}) (x' : \text{bool}) (y : \text{bool}) (y' : \text{bool}). (x \Rightarrow y \Rightarrow y') \wedge (\neg y' \Rightarrow x' \Rightarrow x) \Rightarrow (x \Rightarrow y) \Rightarrow x' \Rightarrow y'$
$(x : \alpha \text{ list}) \leqslant (y : \alpha \text{ list}) \Leftrightarrow x = ([] : \alpha \text{ list}) \vee \exists(xs : \alpha \text{ list}). x = y :: xs \wedge xs \leqslant ys$
$\forall(P : \alpha \rightarrow \text{bool}) (l : \alpha \text{ list}) (m : \text{num}). \text{EVERY } P l \Rightarrow \text{EVERY } P (\text{TAKE } m l)$
$\text{IS_SOME } (\text{OPTION_BIND } (x : \alpha \text{ option}) (g : \alpha \rightarrow \beta \text{ option})) \Rightarrow \text{IS_SOME } x$
$(\forall(x : \alpha) (y : \alpha). (R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) x y \Rightarrow (Q : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) x y) \Rightarrow R^* (x : \alpha) (y : \alpha) \Rightarrow Q^* x y$
$\forall(x : \alpha \text{ list}). x \leqslant x$
$\text{count}(0 : \text{num}) = (\emptyset : \text{num} \rightarrow \text{bool})$
$(\forall(x : \alpha). (P : \alpha \rightarrow \text{bool}) x \Rightarrow (Q : \alpha \rightarrow \text{bool}) x) \Rightarrow \text{EXISTS } P (l : \alpha \text{ list}) \Rightarrow \text{EXISTS } Q l$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \alpha \rightarrow \text{bool}). s \subseteq t \Rightarrow s \cap t = s$
$\forall(R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) (x : \alpha) (y : \alpha). R x y \Rightarrow R^+ x y$
$\forall(xs : \alpha \text{ list}). \text{FILTER } (\lambda(x : \alpha). T) xs = xs$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}). (\lambda(x : \alpha). x) \text{ PERMUTES } s$
$\forall(l1 : \alpha \text{ list}) (n : \text{num}). \text{LENGTH } l1 \leq n \Rightarrow \forall(l2 : \alpha \text{ list}). \text{TAKE } n (l1 ++ l2) = l1 ++ \text{TAKE } (n - \text{LENGTH } l1) l2$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{INFINITE } s \Rightarrow \forall(t : \alpha \rightarrow \text{bool}). s \subseteq t \Rightarrow \text{INFINITE } t$
$(\text{option_CASE } (\text{NONE} : \alpha \text{ option}) : \beta \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \beta) = (\lambda(v : \beta) (f : \alpha \rightarrow \beta). v) \wedge (\text{option_CASE } (\text{SOME } (x : \alpha)) : \beta \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \beta) = (\lambda(v : \beta) (f : \alpha \rightarrow \beta). f x)$
$\forall(t : \text{bool}). t \Rightarrow F \Leftrightarrow \neg t$
$\forall(f1 : \alpha \rightarrow \text{bool}) (f2 : \alpha \rightarrow \text{bool}) (l : \alpha \text{ list}). \text{FILTER } f1 (\text{FILTER } f2 l) = \text{FILTER } f2 (\text{FILTER } f1 l)$
$\forall(f : \alpha \rightarrow \beta) (P : \alpha \rightarrow \text{bool}) (Q : \beta \rightarrow \text{bool}). \text{FUNSET } P Q f \Leftrightarrow \forall(x : \alpha). x \in P \Rightarrow f x \in Q$
$\mathbb{U}(:\alpha + \beta) = \text{IMAGE } (\text{INL} : \alpha \rightarrow \alpha + \beta) \cup \text{IMAGE } (\text{INR} : \beta \rightarrow \alpha + \beta) \cup \mathbb{U}(:\beta)$
$\forall(x : \alpha) (s : \alpha \rightarrow \text{bool}). s \subseteq x \text{ INSERT } s$
$\forall(l : \alpha \text{ list}) (x : \alpha). l \neq x :: l \wedge x :: l \neq l$
$\text{PROD_SET } (\emptyset : \text{num} \rightarrow \text{bool}) = (1 : \text{num}) \wedge \forall(x : \text{num}) (s : \text{num} \rightarrow \text{bool}). \text{FINITE } s \Rightarrow \text{PROD_SET } (x \text{ INSERT } s) = x * \text{PROD_SET } (s \text{ DELETE } x)$
$\forall(f : \alpha \rightarrow \beta) (s : \beta \rightarrow \text{bool}) (x : \alpha). \text{PREIMAGE } f s x \Leftrightarrow f x \in s$
$\forall(f : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \beta) (e : \beta) (l1 : \alpha \text{ list}) (l2 : \alpha \text{ list}). \text{FOLDL } f e (l1 ++ l2) = \text{FOLDL } f (\text{FOLDL } f e l2) l1$
$\forall(n : \text{num}) (l : \alpha \text{ list}). n \leq \text{LENGTH } l \Rightarrow \text{DROP } n l = \text{LASTN } (\text{LENGTH } l - n) l$
$\forall(n : \text{num}) (l : \alpha \text{ list}). n \leq \text{LENGTH } l \Rightarrow \text{LENGTH } (\text{TAKE } n l) = n$
$(0 : \text{num}) < (n : \text{num}) \Rightarrow \text{DROP } n ((x : \alpha :: (xs : \alpha \text{ list})) = \text{DROP } (n - (1 : \text{num})) xs$
$\forall(l : \text{bool list}). \text{AND_EL } l \Leftrightarrow \text{FOLDL } \$ \wedge T l$
$\forall(P : \alpha \rightarrow \text{bool}) (l : \alpha \text{ list}). \text{FILTER } P l = ([] : \alpha \text{ list}) \Leftrightarrow \text{EVERY } (\lambda(x : \alpha). \neg P x) l$
$\forall(v : \alpha) (\text{rows} : (\alpha \rightarrow \beta \text{ option}) \text{ list}) (p : \text{bool}) (\text{infos} : \text{bool list}). \text{FST } (\text{STRONGEST_REDUNDANT_ROWS_INFO_AUX } v \text{ rows } p \text{ infos}) \Leftrightarrow p \wedge \text{EVERY } (\lambda(r : \alpha \rightarrow \beta \text{ option}). r v = (\text{NONE} : \beta \text{ option})) \text{ rows}$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}). s \cap s = s$

$\forall(x:\alpha \rightarrow \text{bool})(y:\alpha \rightarrow \text{bool})(z:\alpha \rightarrow \text{bool}). x \text{ DIFF } y \text{ DIFF } z = x \text{ DIFF } z \text{ DIFF } y$
$\forall(c:\text{bool})(x:\text{bool})(x':\text{bool})(y:\text{bool})(y':\text{bool}). (c \Rightarrow x' \Rightarrow x) \wedge (\neg c \Rightarrow y' \Rightarrow y) \Rightarrow (\text{if } c \text{ then } x' \text{ else } y') \Rightarrow \text{if } c \text{ then } x \text{ else } y$
$\forall(x:\alpha). \text{SING}\{x\}$
$((a:\alpha), (b:\alpha)) \in \{(x,x) \mid (P:\alpha \rightarrow \text{bool}) x\} \Leftrightarrow P a \wedge a = b$
$\forall(M:\alpha \text{ list})(M':\alpha \text{ list})(v:\beta)(f:\alpha \rightarrow \alpha \text{ list} \rightarrow \beta). M = M' \wedge (M' = ([]:\alpha \text{ list}) \Rightarrow v = (v':\beta)) \wedge (\forall(a0:\alpha)(a1:\alpha \text{ list}). M' = a0 :: a1 \Rightarrow f a0 a1 = (f':\alpha \rightarrow \alpha \text{ list} \rightarrow \beta) a0 a1) \Rightarrow (\text{list_CASE } M v f : \beta) = (\text{list_CASE } M' v' f' : \beta)$
$\forall(x:\alpha)(l:\alpha \text{ list}). \text{SNOC } x l \neq ([]:\alpha \text{ list})$
$\forall(g:\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \alpha)(f:\beta \rightarrow \alpha \rightarrow \alpha). \text{FCOMM } g f \Rightarrow \forall(e:\alpha). \text{LEFT_ID } g e \Rightarrow \forall(l:\beta \text{ list list}). \text{FOLDR } f e (\text{FLAT } l) = \text{FOLDR } g e (\text{MAP } (\text{FOLDR } f e) l)$
$\forall(m:\text{num})(n:\text{num}). m < \text{SUC } n \Rightarrow m \neq n \Rightarrow m < n$
$\forall(s:\alpha \rightarrow \text{bool})(t:\alpha \rightarrow \text{bool})(u:\alpha \rightarrow \text{bool}). s \subset t \wedge t \subset u \Rightarrow s \subset u$
$\forall(s:\alpha \rightarrow \text{bool})(t:\alpha \rightarrow \text{bool}). \text{FINITE } s \wedge \text{FINITE } t \Rightarrow \text{CARD } (s \cup t) = \text{CARD } s + \text{CARD } t - \text{CARD } (s \cap t)$
$\forall(s:\alpha \rightarrow \text{bool}). \mathbb{U}(:\alpha) \subseteq s \Leftrightarrow s = \mathbb{U}(:\alpha)$
$\forall(v:\alpha)(\text{rows}:(\alpha \rightarrow \beta \text{ option}) \text{ list})(p:\text{bool})(\text{infos}:\text{bool list}). \text{LENGTH } (\text{SND } (\text{STRONGEST_REDUNDANT_ROWS_INFO_AUX } v \text{ rows } p \text{ infos})) = \text{LENGTH } \text{rows} + \text{LENGTH } \text{infos}$
$\text{LIST_REL } (R:\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool})(xs:\alpha \text{ list})((h:\beta)::(t:\beta \text{ list})) \Leftrightarrow \exists(h':\alpha)(t':\alpha \text{ list}). xs = h' :: t' \wedge R h' h \wedge \text{LIST_REL } R t' t$
$(\forall(x:\alpha)(y:\alpha). (P:\alpha \rightarrow \text{bool}) x \wedge (R:\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) x y \Rightarrow P y) \Rightarrow \forall(x:\alpha)(y:\alpha). P x \wedge R^{\diamond} x y \Rightarrow P y$
$((p:\text{bool}) \Leftrightarrow \text{if } (q:\text{bool}) \text{ then } (r:\text{bool}) \text{ else } (s:\text{bool})) \Leftrightarrow (p \vee q \vee \neg s) \wedge (p \vee \neg r \vee \neg s) \wedge (\neg q \vee r \vee \neg p) \wedge (q \vee s \vee \neg p)$
$\forall(s:\alpha \rightarrow \text{bool})(x:\alpha). x \in s \Leftrightarrow \exists(t:\alpha \rightarrow \text{bool}). s = x \text{ INSERT } t \wedge x \notin t$
$\text{PMATCH_ROW_REDUNDANT } (v:\alpha)((r:\alpha \rightarrow \beta \text{ option})::(rs:(\alpha \rightarrow \beta \text{ option}) \text{ list}))(0:\text{num}) \Leftrightarrow r v = (\text{NONE}:\beta \text{ option})$
$\forall(s:\alpha \rightarrow \text{bool})(t:\alpha \rightarrow \text{bool}). \text{DISJOINT } t (s \text{ DIFF } t) \wedge \text{DISJOINT } (s \text{ DIFF } t) t$
$\forall(f:\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool})(s:\alpha \rightarrow \text{bool})(y:\beta). y \in \text{BIGUNION } (\text{IMAGE } f s) \Leftrightarrow \exists(x:\alpha). x \in s \wedge y \in f x$
$(\forall(e:\alpha). \text{LIST_ELEM_COUNT } e ([]:\alpha \text{ list}) = (0:\text{num})) \wedge (\forall(e:\beta)(l1:\beta \text{ list})(l2:\beta \text{ list}). \text{LIST_ELEM_COUNT } e (l1 ++ l2) = \text{LIST_ELEM_COUNT } e l1 + \text{LIST_ELEM_COUNT } e l2) \wedge (\forall(e:\gamma)(h:\gamma)(l:\gamma \text{ list}). h = e \Rightarrow \text{LIST_ELEM_COUNT } e (h :: l) = \text{SUC } (\text{LIST_ELEM_COUNT } e l)) \wedge \forall(e:\delta)(h:\delta)(l:\delta \text{ list}). h \neq e \Rightarrow \text{LIST_ELEM_COUNT } e (h :: l) = \text{LIST_ELEM_COUNT } e l$
$\forall(s:\alpha \rightarrow \text{bool})(t:\alpha \rightarrow \text{bool})(x:\alpha). (s \cap t) x \Leftrightarrow x \in s \wedge x \in t$
$\forall(P:\alpha \rightarrow \text{bool})(l1:\alpha \text{ list})(l2:\alpha \text{ list}). \text{EXISTS } P (l1 ++ l2) \Leftrightarrow \text{EXISTS } P l1 \vee \text{EXISTS } P l2$
$\forall(ls:\alpha \text{ list})(f:\alpha \# \alpha \rightarrow \beta). \text{MAP } f (\text{ZIP } (ls, ls)) = \text{MAP } (\lambda(x:\alpha). f(x, x)) ls$
$\text{MAP } (f:\alpha \rightarrow \beta)(l:\alpha \text{ list}) = (h:\beta)::(t:\beta \text{ list}) \Leftrightarrow \exists(x0:\alpha)(t0:\alpha \text{ list}). l = x0 :: t0 \wedge h = f x0 \wedge t = \text{MAP } f t0$
$\forall(R:\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{symmetric } R \Rightarrow \text{SC } R = R$
$\forall(l1:\alpha \text{ list})(l2:\alpha \text{ list}). \text{SHORTLEX } (R:\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) l1 l2 \Rightarrow \text{LENGTH } l1 \leq \text{LENGTH } l2$
$\forall(f:\beta \rightarrow \alpha \rightarrow \beta)(e:\beta)(x:\alpha)(l:\alpha \text{ list}). \text{FOLDL } f e (\text{SNOC } x l) = f (\text{FOLDL } f e l) x$
$\forall(P:(\alpha \rightarrow \text{bool}) \rightarrow \text{bool}). P (\emptyset:\alpha \rightarrow \text{bool}) \wedge (\forall(s:\alpha \rightarrow \text{bool}). \text{FINITE } s \wedge P s \Rightarrow \forall(e:\alpha). e \notin s \Rightarrow P (e \text{ INSERT } s)) \Rightarrow \forall(s:\alpha \rightarrow \text{bool}). \text{FINITE } s \Rightarrow P s$
$\forall(s:\alpha \rightarrow \text{bool}). \text{FINITE } s \Rightarrow \text{FINITE } (\text{REST } s)$

$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{FINITE } s \Rightarrow \exists(f : \text{num} \rightarrow \alpha) (b : \text{num}). \text{BIJ } f (\text{count } b) s$
$\forall(P : \alpha \rightarrow \text{bool}) (l1 : \alpha \text{ list}) (l2 : \alpha \text{ list}). \text{EVERY } P l1 \Rightarrow \text{dropWhile } P (l1 ++ l2) = \text{dropWhile } P l2$
$(\text{OPTION_IGNORE_BIND } (m1 : \alpha \text{ option}) (m2 : \beta \text{ option}) = (\text{NONE} : \beta \text{ option}) \Leftrightarrow m1 = (\text{NONE} : \alpha \text{ option}) \vee m2 = (\text{NONE} : \beta \text{ option})) \wedge (\text{OPTION_IGNORE_BIND } m1 m2 = \text{SOME } (y : \beta) \Leftrightarrow \exists(x : \alpha). m1 = \text{SOME } x \wedge m2 = \text{SOME } y)$
$\forall(P : \alpha \rightarrow \text{bool}) (l : \alpha \text{ list}). \text{EVERY } P l \Leftrightarrow \neg \text{EXISTS } (\lambda(x : \alpha). \neg P x) l$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}). s = \mathbb{U}(\alpha) \Rightarrow \forall(v : \alpha). v \in s$
$\forall(n : \text{num}). \text{SUC } (m : \text{num}) = n \Rightarrow m < n$
$((\text{if } (P : \text{bool}) \text{ then } \text{SOME } (x : \alpha) \text{ else } (\text{NONE} : \alpha \text{ option})) = (\text{NONE} : \alpha \text{ option}) \Leftrightarrow \neg P) \wedge ((\text{if } P \text{ then } (\text{NONE} : \alpha \text{ option}) \text{ else } \text{SOME } x) = (\text{NONE} : \alpha \text{ option}) \Leftrightarrow P) \wedge ((\text{if } P \text{ then } \text{SOME } x \text{ else } (\text{NONE} : \alpha \text{ option})) = \text{SOME } (y : \alpha) \Leftrightarrow P \wedge x = y) \wedge ((\text{if } P \text{ then } (\text{NONE} : \alpha \text{ option}) \text{ else } \text{SOME } x) = \text{SOME } y \Leftrightarrow \neg P \wedge x = y)$
$(\text{some}(x : \text{bool}). x) = \text{SOME } T$
$\text{REDUNDANT_ROWS_INFOS_CONJ } ([] : \text{bool list}) ([] : \text{bool list}) = ([] : \text{bool list}) \wedge \text{REDUNDANT_ROWS_INFOS_CONJ } ((i1 : \text{bool}) :: (is1 : \text{bool list})) ((i2 : \text{bool}) :: (is2 : \text{bool list})) = (i1 \wedge i2) :: \text{REDUNDANT_ROWS_INFOS_CONJ } is1 is2$
$\forall(l : \text{num list list}). \text{SUM } (\text{FLAT } l) = \text{SUM } (\text{MAP } \text{SUM } l)$
$\forall(x : \alpha \text{ recspace}) (y : \alpha \text{ recspace}). \text{dest_rec } x = \text{dest_rec } y \Leftrightarrow x = y$
$((R1 : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) \text{ LEX } (R2 : \beta \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool})) ((a : \alpha), (b : \beta)) ((c : \alpha), (d : \beta)) \Leftrightarrow R1 a c \vee a = c \wedge R2 b d$
$(\forall(l : \alpha \text{ list}). ([] : \alpha \text{ list}) \leqslant l \Leftrightarrow T) \wedge (\forall(x : \alpha) (l : \alpha \text{ list}). x :: l \leqslant ([] : \alpha \text{ list}) \Leftrightarrow F) \wedge \forall(x1 : \alpha) (l1 : \alpha \text{ list}) (x2 : \alpha) (l2 : \alpha \text{ list}). x2 :: l2 \leqslant x1 :: l1 \Leftrightarrow x1 = x2 \wedge l2 \leqslant l1$
$\forall(n : \text{num}) (l : \alpha \text{ list}). n \leq \text{LENGTH } l \Rightarrow \text{DROP } n (\text{REVERSE } l) = \text{REVERSE } (\text{BUTLASTN } n l)$
$\forall(l : \alpha \text{ list}) (f : \alpha \rightarrow \beta) (x : \beta). \text{MEM } x (\text{MAP } f l) \Leftrightarrow \exists(y : \alpha). x = f y \wedge \text{MEM } y l$
$\forall(f : \alpha \rightarrow \beta) (s : \beta \rightarrow \text{bool}) (t : \beta \rightarrow \text{bool}). s \subseteq t \Rightarrow \text{PREIMAGE } f s \subseteq \text{PREIMAGE } f t$
$\text{PROD_ALL } (P : \alpha \rightarrow \text{bool}) (Q : \beta \rightarrow \text{bool}) ((x : \alpha), (y : \beta)) \Leftrightarrow P x \wedge Q y$
$\forall(R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) (x : \alpha) (y : \alpha). R^+ x y \Rightarrow R^\diamond x y$
$\forall(l2 : \alpha \text{ list}) (l1 : \alpha \text{ list}). \text{BUTLASTN } (\text{LENGTH } l2) (l1 ++ l2) = l1$
$\forall(l : \alpha \text{ list}). \text{LENGTH } l = \text{FOLDL } (\lambda(x : \alpha) (l' : \text{num}). \text{SUC } l') (0 : \text{num}) l$
$\forall(n : \text{num}) (l : \alpha \text{ list}). n \leq \text{LENGTH } l \Rightarrow \text{LASTN } n l = \text{DROP } (\text{LENGTH } l - n) l$
$\forall(t : \text{bool}). F \vee t \Leftrightarrow t$
$\forall(f : \alpha \rightarrow \beta) (s : \beta \rightarrow \text{bool}). \text{IMAGE } f (\text{PREIMAGE } f s) \subseteq s$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \alpha \rightarrow \text{bool}). s \subset t \Leftrightarrow s \subseteq t \wedge \exists(y : \alpha). y \in t \wedge y \notin s$
$(R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool})^+ (x : \alpha) (z : \alpha) \Leftrightarrow R x z \vee \exists(y : \alpha). R x y \wedge R^+ y z$
$\forall(m : \text{num}) (n : \text{num}) (l : \alpha \text{ list}). m \leq n \wedge n \leq \text{LENGTH } l \Rightarrow \text{BUTLASTN } m (\text{LASTN } n l) = \text{LASTN } (n - m) (\text{BUTLASTN } m l)$
$\forall(f : \alpha \rightarrow \beta) (P : \alpha \rightarrow \text{bool}) (Q : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}). f \in \text{DFUNSET } P Q \Leftrightarrow \forall(x : \alpha). x \in P \Rightarrow f x \in Q x$
$(\forall(x : \alpha). \text{MEM } x ([] : \alpha \text{ list}) \Leftrightarrow F) \wedge \forall(x : \alpha) (h : \alpha) (t : \alpha \text{ list}). \text{MEM } x (h :: t) \Leftrightarrow x = h \vee \text{MEM } x t$
$\forall(x : \alpha) (s : \alpha \rightarrow \text{bool}). x \notin s \Leftrightarrow s \text{ DELETE } x = s$
$((\text{INL } (a : \alpha) : \alpha + \beta) \in (A : \alpha \rightarrow \text{bool}) \sqcup (B : \beta \rightarrow \text{bool}) \Leftrightarrow a \in A) \wedge ((\text{INR } (b : \beta) : \alpha + \beta) \in A \sqcup B \Leftrightarrow b \in B)$
$\text{WF } (\lambda(x : \text{num}) (y : \text{num}). y = \text{SUC } x)$
$\forall(L : \text{num list}) (n : \text{num}). \text{SUM_ACC } L n = \text{SUM } L + n$
$\text{INFINITE } \mathbb{U}(\alpha) \Leftrightarrow \forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{FINITE } s \Rightarrow s \subset \mathbb{U}(\alpha)$

$\forall(ls : \alpha \text{ list list}). \text{FLAT } ls = ([] : \alpha \text{ list}) \Leftrightarrow \text{EVERY } (\$= ([] : \alpha \text{ list})) ls$
$\forall(f : \alpha \rightarrow \beta). (\forall(s : \beta \rightarrow \text{bool}). \text{INJ } f (\emptyset : \alpha \rightarrow \text{bool}) s) \wedge \forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{INJ } f s (\emptyset : \beta \rightarrow \text{bool}) \Leftrightarrow s = (\emptyset : \alpha \rightarrow \text{bool})$
$\forall(l : \alpha \text{ list}) (f : \alpha \rightarrow \beta). (\text{MAP } f l = ([] : \beta \text{ list}) \Leftrightarrow l = ([] : \alpha \text{ list})) \wedge (([] : \beta \text{ list}) = \text{MAP } f l \Leftrightarrow l = ([] : \alpha \text{ list}))$
$\forall(l : \text{num list}). \text{SUM } l = \text{FOLDL } \$+ (0 : \text{num}) l$
$\forall(R : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}) (l1 : \alpha \text{ list}) (l2 : \beta \text{ list}) (n : \text{num}). \text{LIST_REL } R l1 l2 \Rightarrow \text{LIST_REL } R (\text{DROP } n l1) (\text{DROP } n l2)$
$(\text{some}(x : \alpha). F) = (\text{NONE} : \alpha \text{ option})$
$\forall(f : \alpha \rightarrow \beta) (l1 : \alpha \text{ list}) (l2 : \alpha \text{ list}). \text{MAP } f (l1 ++ l2) = \text{MAP } f l1 ++ \text{MAP } f l2$
$\forall(g : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \alpha) (f : \beta \rightarrow \alpha \rightarrow \alpha). \text{FCOMM } g f \Rightarrow \forall(e : \alpha). \text{LEFT_ID } g e \Rightarrow \forall(l1 : \beta \text{ list}) (l2 : \beta \text{ list}). \text{FOLDL } f e (l1 ++ l2) = g (\text{FOLDL } f e l1) (\text{FOLDL } f e l2)$
$\emptyset (x : \alpha) \Leftrightarrow F$
$\forall(R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{WeakLinearOrder } R \Leftrightarrow \text{WeakOrder } R \wedge \forall(a : \alpha) (b : \alpha). R a b \vee R b a$
$\forall(R : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}) (R' : \gamma \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}). (R \circ_r R')^T = R'^T \circ_r R^T$
$\forall(x : \alpha) (l : \alpha \text{ list}). x :: l = [x] ++ l$
$\forall(f : \alpha \rightarrow \beta) (l : \alpha \text{ list}). \text{MAP } f l = \text{FOLDL } (\lambda(x : \alpha) (l' : \beta \text{ list}). f x :: l') ([] : \beta \text{ list}) l$
$\forall(x : \alpha). x \in \mathbb{U}(:\alpha)$
$\mathbb{U}(:\alpha + \beta) = \mathbb{U}(:\alpha) \sqcup \mathbb{U}(:\beta)$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (t : \alpha \rightarrow \text{bool}) (g : \alpha \rightarrow \text{bool}). (s \text{ DIFF } t) \cap g = s \cap g \text{ DIFF } t$
$\forall(Q : \text{num} \rightarrow \text{bool}) (P : \text{num} \rightarrow \text{bool}). (\exists(n : \text{num}). P n) \wedge (\forall(n : \text{num}). (\forall(m : \text{num}). m < n \Rightarrow \neg P m) \wedge P n \Rightarrow Q n) \Rightarrow Q (\$LEAST P)$
$\forall(xs : \alpha \text{ list}). \text{FILTER } (\lambda(x : \alpha). F) xs = ([] : \alpha \text{ list})$
$\forall(f : \alpha \rightarrow \beta) (x : \alpha) (s : \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{IMAGE } f (x \text{ INSERT } s) = f x \text{ INSERT IMAGE } f s$
$\forall(l1 : \alpha \text{ list}) (l2 : \alpha \text{ list}). \text{TAKE}(\text{LENGTH } l1) (l1 ++ l2) = l1$
$\forall(l : \alpha \text{ list list}). \text{FLAT } l = \text{FOLDL } (\$++ : \alpha \text{ list} \rightarrow \alpha \text{ list} \rightarrow \alpha \text{ list}) ([] : \alpha \text{ list}) l$
$(\neg \text{LLEX } (R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) ([] : \alpha \text{ list}) ([] : \alpha \text{ list}) \wedge \neg \text{LLEX } R ((h1 : \alpha) :: (t1 : \alpha \text{ list})) ([] : \alpha \text{ list})) \wedge \text{LLEX } R ([] : \alpha \text{ list}) ((h2 : \alpha) :: (t2 : \alpha \text{ list})) \wedge (\text{LLEX } R (h1 :: t1) (h2 :: t2) \Leftrightarrow R h1 h2 \vee h1 = h2 \wedge \text{LLEX } R t1 t2)$
$\forall(l : \alpha \text{ list}). l ++ ([] : \alpha \text{ list}) = l$
$\forall(s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (f : \alpha \rightarrow \beta). f \in \text{FUNSET } s (\emptyset : \beta \rightarrow \text{bool}) \Leftrightarrow s = (\emptyset : \alpha \rightarrow \text{bool})$
$\forall(b : \text{bool}). b \Rightarrow (b \Leftrightarrow T)$
$\forall(l : \alpha \text{ list}) (x : \alpha). \text{ELL} (0 : \text{num}) (\text{SNOC } x l) = x$
$\forall(ls : \alpha \text{ list}). ls \neq ([] : \alpha \text{ list}) \Rightarrow \text{MAP } (f : \alpha \rightarrow \beta) (\text{FRONT } ls) = \text{FRONT } (\text{MAP } f ls)$
$\forall(n : \text{num}). (0 : \text{num}) < \text{SUC } n$
$\text{IMAGE } (f : \beta \rightarrow \alpha) (s : \beta \rightarrow \text{bool}) = \{(z : \alpha)\} \Leftrightarrow s \neq (\emptyset : \beta \rightarrow \text{bool}) \wedge \forall(x : \beta). x \in s \Rightarrow f x = z$
$\forall(f : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \beta) (e : \beta) (l : \alpha \text{ list}). \text{FOLDL } f e l = \text{FOLDL } (\lambda(x : \beta) (y : \alpha). f y x) e (\text{REVERSE } l)$
$\forall(l1 : \alpha \text{ list}) (l2 : \alpha \text{ list}) (a : \alpha). \text{IS_SUFFIX } l1 l2 \Rightarrow \text{IS_SUFFIX } (a :: l1) l2$
$\forall(x : \alpha) (P : \alpha \rightarrow \text{bool}). x \in P \Leftrightarrow P x$
$\forall(R : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}). \text{StrongOrder } R \Rightarrow \text{Order } R$
$\forall(n : \text{num}) (l : \alpha \text{ list}). n < \text{LENGTH } l \Rightarrow \text{MEM } (\text{EL } n l) l$
$\forall(x : \alpha) (y : \alpha) (P : \alpha \rightarrow \text{bool}). x \in y \text{ INSERT } P \Leftrightarrow x = y \vee x \neq y \wedge x \in P$
$\text{OWHILE } (G : \alpha \rightarrow \text{bool}) (f : \alpha \rightarrow \alpha) (s : \alpha) = \text{SOME } (s' : \alpha) \Rightarrow \neg G s'$

$\text{symmetric } (R1 : \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{bool}) \wedge \text{symmetric } (R2 : \beta \rightarrow \beta \rightarrow \text{bool}) \Rightarrow \text{symmetric } (R1 \text{ LEX } R2)$

$\forall (P : \alpha \rightarrow \text{bool}) (l : \alpha \text{ list}). \text{PREFIX } P l \leqslant l$

$\forall (s : \alpha \rightarrow \text{bool}) (f : \alpha \rightarrow \beta). (\exists (t : \beta \rightarrow \text{bool}). \text{INJ } f s t) \Rightarrow \text{BIJ } f s (\text{IMAGE } f s)$

$\forall (s : \alpha \rightarrow \text{bool}). s \text{ DIFF } \mathbb{U}(\alpha) = (\emptyset : \alpha \rightarrow \text{bool})$

$\forall (t : \text{bool}). t \wedge t \Leftrightarrow t$

$(\exists (x : \alpha). x \in (s : \alpha \rightarrow \text{bool})) \wedge (\forall (x : \alpha). x \in s \Rightarrow (P : \alpha \rightarrow \text{bool}) x) \Rightarrow P (\text{CHOICE } s)$